



m/ua

Tabellæ restaurantes Kunke

℞ amygdal dul
amygd recent pin - - - - a ℥I
cinnam exquisit - - - - - ℥I
cardamomi minoris - - - - - ℥ß
antimon crud hongar. subtil pulv. - - ℥IIIß
sacch candi. in aq ros et cinnam solut ℔IIII


fiant ex arte tabellæ quarum pondus ℥I
prosunt in febrib putri. in scabie cum tumoribus et
ulceribus infirmitatibus post variolas. gonhorreis
inveteratis præsertim in convulsionibus et convulsivis
guttæ nervos retrahentibus affectibus

SEBASTIANI VAILLANT,

Academiae Regiae Scientiarum Socii, & Plantarum in Horto Regio Parisino Demonstratoris,

BOTANICON PARISIENSE.

Operis majoris prodituri prodromus.



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud PETRUM VANDER Aa,

Bibliopolam & Typographum Academiæ, ut & Urbis.

M DCC XXIII.



REI HERBARIAE STUDIOSIS

H. BOERHAAVE S.

SEbaſtianus Vaillant, *hujus autor libelli, eam ſuis quidem meritis famam in cognitione ſtirpium comparavit, ut pares Illi multos haud reperias. Teſtantur id praeclara viri opera, quae actis Academiae regiae ſcientiarum inſerenda curavit. Anxia quippe diligentia, ſummaque ſimul prudentia, adhibitis, characteres plantarum ex luſtrata harum fabrica con-*

ſtituit, unde certa deinde genera illarum feliciſſime ibidem definit. Neque minus dilucet in illis doctrina accurata Botanices, ex lectione attentiſſima auctorum, acri cum judicio repetita, duntaxat comparanda. Ut ſperare licuiſſet a tanto Artifice ultimam noſtrae diſciplinae caſtigationem, crebro nimis in multis uſque perturbatae. Sed neque mirabile ſit cuiquam, cur adeo excelluerit in hac ſcientia Vaillantius. *Proprium enim ad hanc ingenium benigna Illi dederat natura, quod acerrima Ipſe diligentia perfecit. Utriſque vero ſingularis adſpiravit, fauſta noſtro, aliis ſæpe iniquior, opportunitas.* Tournefortio *namque praeceptore uſus, elementa ex Eo vera ſcientiae, imo & abſolutae fere artis perfectionem,*

nem, vel a puero hausit, plures per annos Magni Viri indefessus auditor. Quis autem inter sacerdotes Floræ Tournefortio *clarior? Dein, quoque praesidium insigne habuit rerum suarum & columen, eximium dominum* Fagon, REGIS CHRISTIANISSIMI *Archiatrorum Comitem. De quo quidem ambiguum, quid prius solitis Bonorum laudibus dicas, an summam totius rei herbariae peritiam, an profusam generosi pectoris ad promovenda illius commoda liberalitatem. Talibus fretus quidni proficeret? Qui huic uni totum se dedens, sine ullius remissione temporis, absque occasionis ullo neglectu, in ipso degens habitansque instructissimo plantarum Regio horto, fruebatur universo*

commercio herbario, quod per omnes orbis plagas colendum jusserat summus, & immortalis inde famae, artium Fautor liberalium, LUDOVICUS DECIMUS QUARTUS. *Mediocris itaque nihil hoc a Viro exspectandum. Industriam tamen omnem applicuit potissimum, atque exercuit quam fervidissime, investigando, observando, suis in locis natalibus stirpes, quae sponte naturae circa* Lutetias *nascuntur. Incubuit quippe huic labori ab anno* 1696. *usque in Martium* 1722. *Toto quidem tanti decursu temporis in eo occupatus semper; nullum praetereuns unquam, cujus plantas haud excuteret, angulum; vias, agros, valles, montes, hortos, nemora, stagna, paludes,*

ludes, flumina, ripas, fossas, puteos, undequaque lustrans. Contigit ergo, crebro ut detegeret maximi quae Tournefortii *intentissimos oculos effugerant: ideoque in eximio ejus super his libro edito indigenarum titulo carent. Tot itineribus peregrè susceptis, tot alia sustinens negotia, distractus ab hoc opere, otia non nanciscebatur ad haec idonea* Tournefortius. Vaillantius *vero hoc agens, & unum quidem, potuit, debuitque novas jungere iis, quas Praeceptor prius laboriose invenerat. Omnes igitur illas, ibidem loci indigenas, labore summo, ingenti in folio volumine descripsit; uniuscujusque recens repertae natalem locum adjunxit topographice; tempus*

 flo-

florendi, & perficiendi semina, nomen proprium, synonyma certa, omnibus fere adscripsit; observationes circa partium fabricam pulcherrimas creberrime immiscuit, interspersis largiter in auctorum optimos notis criticis. Hisce itaque opus perfecit maximae quidem in botanice utilitatis. Cui tandem ne deesset quidquam, impetravit a nobili pictore Regio, Claudio Aubriet, *ut exercitatissimam commodaret dexteram plantis delineandis, harumque partibus minutissimis, dirigente in naturæ contemplationem mente* Vaillantiana *oculos, & manum eximii Artificis. Prorsus ut credere fas sit, non prostare usquam de stirpibus veras magis, & artificiosas tabulas. Utique, fieri ut natum est, pro-*

proprium amavit hoc, & conſummatum opus. Ratio muneris mei fortunato dederat a multis mihi annis commercia Botanica inſigni cum Viro exercere ſedulo, magno meo bono: Namque res ea Horto Academico, & ſaepe mihi, profuit. Ita accidit, ut per literas XV. Maji anno 1721. a me, nec opinante, ſerio flagitaverit, ſuſciperem curam evulgandi operis. Quod interim ut obtineret, certius, conciliatore utebatur ſummae apud me auctoritatis, Gulielmo Sherardo, quem in arte dictatorem agnoſco, in Amicis inter primos colo. Natum ita me profiteor, vix ut queam amicorum votis negare quidquam, aut praeſtanda Illis officia ſubterfugere. Parui ergo voluntati horum: ea potiſſima de cauſa,

quod aeger, & ex lento dudum morbo languens, ſcriberet idoneas ſibi eſſe, cur ita ardenter vellet, rationes; quas mihi ſiluit. Redemi tum proprio meo, eoque haud mediocri, & repraeſentato, aere tabulas omnes pictas, quae ad opus pertinebant. Librum ipſum cum illis accepi. Ubi recenſueram, cum principe ſculptorum noſtri aevi Jacobo Wandelaar *ſtatim tranſegi de pretio, quod ſane ingens eſt, aeri ut incideret incomparabiles tabulas. Et harum paratae equidem jam multae ſunt; ſed quum plurimae ſint hae futurae, atque interim quaeſita ubique, & in* Veſaliano *jam occupatiſſima opere, dextera Artificis ſatis ex voto properare nequeat, nondum abſolutae. Ego vero*

arti

arti Aubriettianae, *curiſque cari (heu quondam!) Amici, nolim praeſtari in caelando niſi manum perfectiſſimam. Simul perfectae erunt tabulae, prodibit, ſuis cum ornamentis, Liber in folio. In quo una Auctori mens ſupplementa ſcribere* Tournefortiano *operi, criſin in Auctores modeſte exercere, ſynonyma conciliare, certas generum notas definire. Quae utique omnia quanti uſus, tantae molis. Laudo fortunas meas, qui fruor jam quotidie cari mei hoſpitis* Sherardi *dulcibus alloquiis! Opus una illud recenſuimus poſtquam, autor mihi eſt dudum ſponte ita inſtituenti, ut libellum ecce hunc prodromum majoris evulgarem operis. hunc autor ſecum ſemper aſſuetus ſumere, quoties prodibat herba-*

batum. Praefixi plantarum nominibus asteriſci prætervisſas Tournefortio, *Illi vero inventas, additaſque, ſtirpes denotabunt. Valete!* Lugd. Batav. 17$\frac{1}{8}$23.



BO-

BOTANICON PARISIENSE.

A

* ABies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. J. R. H. 585. *Abies conis deorsum spectantibus*, Raji Hist. 2. 1396. *Picea major* 1. *sive Abies rubra*, Pin. 493. *Gall.* Pece *où* Pesse.

* —— tenuiore folio, fructu deorsum inflexo majore albido. Cimel. Reg.

1. Abrotanum campestre cauliculis albicantibus. Pin. 136. *Artemisia tenuifolia Dod. Pempt.* 33.

2. —— Campestre, cauliculis rubentibus. Pin. 136.

Acanthium. vid. Carduus.

1. Acer campestre & minus. Pin. 401.

* —— campestre & minus fructu rubente. *Acer campestre & minus pericarpio externè purpureo.* H. Cath. Suppl. alt. 4.

2. Acer montanum, candidum, Pin. 430.

* —— montanum candidum, fructu rubente.

3. —— Platanoides. Munting. Hist. 55.

1. Acetoſa pratenſis. C. B. Pin. 114.
* —— pratenſis, flore albo. H. R. Par.
* —— ſemine vidua. H. R. Par.
*2. —— Sylvatica, ſubincana & villoſa.
*3. —— criſpa. Hiſt. Oxon. 2. 582.
4. —— arvenſis lanceolata. Pin. 114.
* —— arvenſis lanceolata, ſemine vidua.
* —— arvenſis, minima, non lanceolata. Pin. 114.
* —— Eadem, ſemine vidua.
* —— minor, erecta, lobis multifidis. Bocc. Muſ. 2. 164.
5. —— lanceolata, anguſtifolia, repens. Pin. 114.
Acinos, vid. Clinopodium.
1. Agaricus pedis Equini facie. J. R. H. 562.
* 2. —— Lichenis facie J. R. H. 562.
* 3. —— foliatus, cornua Damæ referens. Comment. A R. Scient. 89.
* 4. —— præcox, albogilvus, criſtatus. J. R. H.
1. Agrimonia officinarum. J. R. H. 301. *Eupatorium veterum ſive Agrimonia*. Pin. 321.
2. —— odorata Cam. Hort.
1. Alcea vulgaris, major. Pin. 316. Alcea Fuchſ. Icon. 80.

* Al-

* Alcea vulg. major, foliis magis dissectis. *Herba Simeonis* Brunsf. 2. 76. Ic.

*2. —— amplissimo folio laciniato. J. B. 2. 1067.

*3. —— folio rotundo laciniato. Pin. 316.

4. —— hirsuta. Pin. 317.

1. Alchimilla montana, minima Col. 1. 46. *Percepier Anglorum quibusdam.* J. B. 3. *part.* 2. 74. alchimilla vulgaris pie de lion vulneraire

2. —— Linariæ folio, calice florum albo. J. R. H. 509.

* —— Linariæ folio, calice florum subluteo. J. R. H. *Anthyllis montana Lugd.* 2. 1150.

*4. —— Gramineo folio, majore flore. J. R. H. 508.

5. —— supina, Gramineo folio, minore flore. J. R. H. 508.

* —— erecta, Gramineo folio, minore flore. J. R. H. *Knawel Germanorum.*

1. Alga fluviatilis graminea, longissimo folio. J. R. H. 569.

*2. —— viridis, capillaceo folio. Pin. 364. *Conferva Plinii Lob. Ic.* 2. 257.

*3. —— fontalis trichodes. Pin. 364. *Conferva trichodes vel Trichomanes aquaticum. Lugd.*

*4. —— viridis, brevioribus setis, *Conferva minor, ramosa*, H. Oxon. 3. Icon. Sect. 15. Tab. 4.

1. Alkekengi officinarum. J. R. H. 151.

* Alkekengi Officinarum foliis variegatis.

Alliaria, vid. Hesperis.

1. Allium sylvestre, latifolium. Pin. 74.

*. 2. —— Sylvestre amplicarpon, foliis porraceis, floribus & nucleis purpureis. Raji. Synops. 230. allium sativum - alexitere

*** Allium latifolium luteum J.R.H. *Jard. de S. Clou.*

Cepæ species.

3. Allium montanum bicorne, flore obsoletiore. Pin. 75.

4. —— montanum, capite rotundo. Pin. 75.

* 5. —— Juncifolium, bicorne, luteum. Pin. 75.

6. —— Sylvestre tenuifolium. Lob. Ic. 156. *Cepa Juncifolia minor, purpurascens. J. R.H.* 383.

verd 1. Alnus rotundifolia, glutinosa, viridis. Pin. 428. aune resol

1. Alsinastrum Gallii folio. J.R. H. 244. *& Alsinastrum Gratiolæ folio.* J.R.H.

* 2. —— Serpillifolium, fl. albo tetrapetalo.

* 3. —— Serpillifolium, fl. roseo, tripetalo.

A 5. petales entieres.

1. Alsine Plantaginis folio. J.B. 3. 363.

2. Al-

2. Alſine minor multicaulis. Pin. 250.
3. —— tenuifolia. J.B. 3. 364.
4. —— Arenaria dicta. Cat. Hort. Amſtel. 16.
*5. —— ſaxatilis & multiflora, capillaceo folio. J.R.H. 243.
*6. —— ſaxatilis Juniperi folio. *Lychnis ſaxatilis, pumila Juniperi folio.* J.R.H. 339.
7. —— ſpergula dicta major. Pin. 251.
8. —— ſpergulæ facie minor. Pin. 251.
*9. —— ſegetalis, Gramineo folio, glabro, multiflora. Raji Hiſt. 3. 500.
10. —— verna glabra, floribus umbellatis albis. J.R.H.
*11. —— tenuifolia, pediculis florum longiſſimis.
*12. —— Spergulæ facie minima, ſeminibus marginatis J.R.H. 244.

A 4. Petales entieres.

1. —— verna glabra. Bot. Monſp.
2. —— minima, fl. fugaci. J. R. H. 240.

A 5. Petales échancrées en cœur.

1. —— altiſſima nemorum. Pin. 250. & *Alſine maxima, Solanifolia, Mentz.*

*. 2. Alſine Hyperici folio, D. Vaillant. J. R. H. 242.

3. —— pratenſis, Gramineo folio ampliore. J R. H.

4. —— pratenſis, Gramineo folio anguſtiore. J. R. H.

* —— Eadem pulveriflora.

5. refrig —— media. Pin. 250. morgeline ou mouron

* —— media acutiori minori folio criſpo. H. Cathol.

*6. —— qui Caryophyllus holoſteus arvenſis medius. Raji Synopſ. 207. *au tour des Lacunes entre S. Clair & Rouſſigni. & entre Gentillis & Arcueil dans la praierie.*

* 1. Alſinoides annua, verna. i. e *Alſineformis paludoſa, tricarpos, floſculis albis inapertis* Pluk. Phytogr. Tab. 7 fig. 5.

emolli. Althæa Dioſcoridis & Plinii. Pin. 315.

1. Alyſſon incanum, luteum, Serpilli folio majus & minus. J. R H. 217.

2. aperit —— perenne, montanum, incanum J. R. H. 217.

3. —— vulg. Polygoni folio, caule nudo. J. R. H. 217.

* —— vulg. Polygoni folio, inciſo, caule nudo. *Burſa paſtoris minor, loculo oblongo, foliis laciniatis.* C. B. Pin. 108.

Myagri species.

4. Alysson segetum, foliis auriculatis acutis. J. R. H. 217. *Myagrum sylvestre Pin. 109. & non pas Myagrum sativum Pin. comme le veut Mr. Tournefort.*

1. Ammi perenne. Moris. Umb. 22.

2. Ammi majus. Pin. 159.

*. —— majus foliis plurimum incisis & nonnihil crispis. Pin. 159.

1. Anacampseros purpurea. J. B. 3. 682.

1. Anagallis phœniceo flore. Pin. 252.

* —— phœniceo flore foliis ternis.

*. —— phœnicea mas, foliis amplioribus ex adverso quaternis. Pluk. Almag. Bot. 29.

*. —— flore pleno, phœniceo.

2. —— cæruleo flore. Pin. 252.

*3. —— quæ Alsine palustris minima, flosculis albis, fructu Coriandri exiguo. Mentz. Pug. Tab. 7.

1. Anemonoides lutea.
2. —— alba.
3. —— purpurea.
*4. —— trifolia.

} *voyez* Ranunculus.

1. Androsæmum maximum, frutescens. Pin. 280.

1. Angelica sylvest. minor, sive erratica. Pin. 155.

2. —— pratensis, Apii folio, J. R. H. 313.

anguria citrulus
dicta pastaque
melon deau
refrig

* 3. Angelica pratensis, Apii folio, altera. J.R.H. *a Helincourt.*

aperit 1. Anonis spinosa, flore purpureo. Pin. 389. arrete boeuf, bugrande

*. —— spinosa, flore pallide purpureo.

*. —— spinosa, flore albo. Pin. 389.

* 2. —— spinosa, fruticosa, erecta, flore purpureo.

* —— spinosa, fruticosa, erecta, flore pallido.

3, aperit —— viscosa, spinis carens, lutea major. Pin. 389.

—— non spinosa, fl. luteo variegato. Pin.

4. —— flore luteo parvo. H. R. Par.

1. Antirrhinum arvense majus. Pin. 202.

* 2. —— vulgare J.B. *majus alterum fol. longiore. C. B. Pin.*

1. Anthyllis, vid. Alchimilla n. 2.

Antoniana vulg. latifolia. vid. Chamænerion. n°. 5.

aperit 1. Aparine vulgaris. Pin. 334. grateron, rieble

* 2. —— vulgaris, semine minori. J. R. H. 114.

* 3. —— semine lævi. H. R. Par. & Park.

* 4. —— palustris minor, Parisiensis flore albo. J.R. H. 114.

* 5. —— minima. Bot. Monsp.

6. A-

6. Aparine latifolia humilior, montana. J.R.H. 114.

Aſperulæ ſpecies.

7. —— ſupina, pumila, fl. cæruleo. J.R.H. 114. *Aſperula hexaphyllos, purpurea.* Pin. 334.

1. Aphaca. Lob. Ic. 70.

1. Apium paluſtre & Apium officin. Pin. 154.

1. Aquifolium ſive Agrifolium vulgo. J.B.

1. Aquilegia ſylveſtris. Pin. flore cæruleo & puniceo. C.B.

Arenarià J.B. *vid. Alſine.* n°. 4.

1. Ariſtolochia Clematitis recta. Pin. 307.

Armeria. vid. Caryophyllus n°. 4.

* 1. Artemiſia vulg. major. Pin. 137. *fl. albicante.*

. —— vulg. major, Pin. 137. *fl. purpuraſcente.*

1. Arum vulgare non maculatum. Pin. 195.

* —— Idem folio ſubrotundo. H. R Par.

2. ------ maculatum, maculis nigris. Pin. 195.

* ------ Idem folio ſubrotundo. H.R.Par.

3. Arum maculatum, maculis candidis. Pin.

*1. Arundo vulg. paluſtris. J. B. 2. 485. *vulg. ſive Phragmites Dioſcoridis & Theophraſti. Pin.* 17.

2. ------ ſylvatica, elatior, panicula molli candida & ſerici modo lucens. Hiſt. Oxon. 3. *Gramen arundinaceum, paniculâ molli ſpadicea, majus.* Pin. 7.

1. Aſarum Dod. Pempt. 358. Pin.

1. Aſclepias albo flore. Pin. 303.

* —— albo flore, foliis variegatis.

2. ----- anguſtifolia, fl. flaveſcente. H. R. Par.

*3. ---- non ſcriptum foliis nigris, in ſummo hiſpidis. Corn. 220.

1. Aſparagus ſativa. Pin. 489.

1. Aſperugo vulgaris. J.R.H. 135.

1. Aſperula hexaphyllos purpurea. Pin. *Aparine ſupina, pumila, fl. cæruleo. J.R.H.* 114.

*2. ------ cærulea, arvenſis. Pin. 334. *Gallium arvenſe, flore cæruleo. J. R. H.* 115

1. Aſplenium ſive Ceterac. J. B. 3. 749.

1. Aſter arvenſis, cæruleus, acris. J.R. H. 481.

*2. ----- luteo flore, aliis Conyzæ ſpecies. Cam. Epit. 907. a *Fontainebleau.*

3. A-

3. Aster montanus, luteus, salicis folio glabro. Pin.

4. ------ pratensis, autumnalis, Conyzæ folio. J. R. H. *petite aunee ou conise des prez. Bech.*

5. ------ incanus, Verbasci folio, villosus. J. R. H.

6. ------ palustris, luteus, folio longiori lanuginoso. J. R. H. 483.

7. ------ palustris, parvo flore globoso. J. R. H.

8. ------ omnium maximus, Helenium dictus. J. R. H. *Aunee*

1. Atractylis lutea. Pin. *vide Cnicus.*

1. Astragalus luteus, perennis, procumbens, vulg. sive sylvestris. 8. Hist. Ox. 2. 107. *reglisse sauvage*

*2. ----- Monspessulanus. J. B. 2. 338.

1. Atriplex folio hastato seu deltoide. H. R. Blef. *atriplex hortensis arroche, belle dame, follette*

2. ----- angusto oblongo folio. Pin. 119.

. ----- angustissimo & longissimo folio. H. L. Bat.

1. Avena vulg. sive alba. Pin. 28,

2. ------ nigra. Pin. 28.

* 3. ----- sylvest. pilosa, aristis recurvis. Hist. Oxon. 3. 209.

Bal-

B.

1. BAllote Matth. 825.
*. B —— flore albo. J.R.H.
* 1. Balſamina lutea ſive noli me tangere. Pin.
* 1. Bedeguar officinis perperam. Pin. 483.
1. Belladona, Cluſ. Pann. 508.
1. Bellis ſylveſt. minor. Pin. 261. *petalis albis.*
* —— ſylveſt. minor, petalis ex candido rubris. Pin. 261.
* —— ſylveſt. minor, petalis ex albo & rubro mixtis. Pin. 261. *Bellis ſylv. minor, fl. mixto. Eyſt.*
* —— ſylveſt. minor, duplici ſemi floſculorum ſerie in flore.
* —— ſylveſt. minor, petalis intus rubris in ambitu albis. Pin. 261.
1. Berberis dumetorum. Pin. 458.
1. Betonica purpurea. Pin. 235.
* —— flore incarnato. Volck. 69.
* —— alba. Pin. 235.
2. —— arvenſis annua, fl. ex albo flaveſcente. J.R.H. 203. *ſideritis arvenſis latifolia glabra. Pin.*
1. Betula, Dod. 839. *virgulis pendulis Mentz. Ind. 47.*
*. —— virgulis erectis.
1. Bidens folio non diſſecto. Cæſalp. 488.

2. Bi-

2. Bidens foliis tripartito divisis. Cæsalp. caule flavescente. cupatoire femelle batarde, erubit.

*. —— foliis tripartito divisis, caule purpurascente.

1. Blattaria lutea, folio longo laciniato. Pin. herbe aux mites

2. —— alba. Pin.

1. Blitum rubrum, minus. Pin. 118. *Amaranthus sylvest. & vulgaris. Hist. Par.*

2. —— sylvestre spicatum. J R. H. 507.

*. —— sylv. spicatum foliis ex albo & viridi variegatis. J. R. H. blitum album majus blette emolli

*1. Boletus esculentus, rugosus albicans, quasi fuligine infectus. J. R. H. 561.

* —— esculentus rugosus, fulvus. J. R. H. 561.

*2. —— nigricans, capitulo fastigiato.

*3. —— flavicans, capitulo foliato.

4. —— phalloides. J. R. H. 561.

1. Brunella major, folio non dissecto. Pin. 260.

* —— major, fol. non dissecto, fl. purpurascente. H. R. Par.

*. —— major, fol. non dissecto, fl. carneo. Hist. Ox. 3. 363.

*. —— major, fol. non dissecto fl. albo. Pin. 261.

2. —— cæruleo magno flore. Pin. 261.

*. —— purpureo magno flore.

*. Bru-

bistorta major radice minus intorta ...

Borrago ... Brassica capitata rubra choux rouge Bech. Brassica mar... vide convolvu... Brassica capitata alba choux pom... Bech.

*. Brunella flore magno carneo. Hort. Edinb.

*3. ——- laciniata fl. magno, cæruleo. J.B.

*. ——- laciniata, fl. magno purpureo, J.B.

*. ——- laciniata, fl. magno leucophæo.

*4. ——- Verbenulæ folio; flore cæruleo.

*. ——- Verbenulæ folio, fl. purpurascente.

5. ——- folio laciniato, fl. purpureo. Pin.

*. ——- fol. laciniato fl. cæruleo.

*. ——- fol. laciniato fl. roseo. H. R. Par.

*. ——- fol laciniato, fl. cinereo. Pin.

. ——- fol. laciniato, fl. albo. H. R. Par.

1. Bryonia aspera sive alba, baccis rubris. Pin. couleuvree ou vigne blanche purgative

*. ——- Cucumeris folio. Bryonia Tabern. Ic. 893.

Bech 1. Buglossum angustifolium, majus. Pin.

2. ——- sylvestre, minus. Pin. 250. Bech

*. ——- sylvest. minus, fl. albo.

3. ——- arvense annuum, Lithospermi folio. J. R. H.

*. ——- Idem, flore cæruleo purpurascente.

4. Bu-

4. Bugloſſum anguſtifolium ſemine echinato. J. R. H.

1. Bugula. Dodon. 135. *fl. violaceo. Broſſ.* 38. Bugle ou petite consoude

*. ——- flore cæruleſcente.

*. ——- flore albo. Broſſ 38. *fl. cinereo, vel albo. J. R. H.*

*. ——- fl. ſuaverubente.

2. ——- ſylveſtris, villoſa, fl. cæruleo. J. R. H. 209.

*. ——- Ead. fl. dilutè cæruleo.

——- Ead. fl. ſuaverubente. J. R. H. 209.

*. ——- Ead. fl. cinereo.

——- Ead. fl. albo. J. R. H. 209.

1. Bulbocaſtanum majus folio Apii. Pin. terre noix

1. Buplevrum fol. ſubrotundo, ſ. vulgatiſſimum. Pin. oreille de lievre perce feuille

*2. ——- anguſtiſſimo folio. Pin. 278.

3. ——- perfoliatum rotundifolium, annuum J. R. H.

1. Burſa paſtoris major, fol. non ſinuato. Pin.

* ——- Eadem, folio ſinuato. Pin.

* ——- paſtoris, eleganti folio, inſtar Coronopi repentis. Cam. Epit. 32.

* ——- paſtoris media. Pin. 108.

1. Butomus Cæſalp. 553.

* ——- flore albo. J. R. H. 271.

1. Buxus arboreſcens. Pin. 471.

Ca-

C

cakile maritima angustiore folio antiscor

1. CAlamintha magno flore, vulgaris. J.B.3.part.2.328.

2. ~~cephal~~ —— vulgaris, exiguo flore. Pin. 229.

*3. —— Pulegii odore, five nepeta. Pin. 228.

Chamæcissi species.

4. —— humilior, folio rotundiore. J. R.H.194. *Hedera terrestris vulgaris. Pin.* 306. Lierre terrestre, terrete, herbe de s. Jean. Beck.

* —— humilior, fol. rotundiore, fl. purpureo. J.R.H.

*5. —— humilior, fol. rotundiore, minor & elegantior. J.R.H.194.

* —— Eadem flore purpureo.

*6. —— major, hirsutior. *Hedera terrestris, montana.* Pin. 306.

Calcitrapa. vid. Carduus stellatus, n°. 8.

1. Caltha arvensis. Pin. 276. soucy bister

1. Campanula minor, rotundifolia, vulgaris, Pin. 93.

*. —— minor, rotundifolia, vulg. fl. cinereo.

*. —— minor, rotundifolia, vulg. fl. candido. Pin.

2. —— hortensis, rapunculi radice. Pin.

3. Cam-

3. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & aſperior. Pin. 94.

—— Eadem fl. dilutè purpureo. Pin. 94.

* —— Eadem, fl. candido. Pin. 94.

4. —— pratenſis, fl. conglomerato. Pin. 94.

—— Eadem flore albo. H. R. Par.

* —— pratenſis, floribus ſingularibus, per caulem ſparſis. Pin. 94.

5. —— Perſicæ folio. Cluſ. Hiſt. 171.

—— Perſicæ folio, fl. albo. Eyſt.

6 —— radice eſculenta, fl. cæruleo. H. L. Bat.

—— radice eſculenta, fl. candicante. H. L. Bat.

Speculi veneris ſpecies.

7. —— arvenſis, erecta. H. L. Bat.

* —— arvenſis, erecta, fl. Janthino dilutiore.

* —— arvenſis, erecta, fl. albo. H. L. Bat.

8. —— arvenſis, procumbens. J. R. H. *eſt Campanula arvenſis minor, ſiliquâ ampliori.* J. H. R.

* —— arvenſis, procumbens, fl. Janthino dilutiore.

Camphorata annua glabra. vid. Chenopodium. nº. 11.

B *1. Can-

1. Cannabis ſativa. Pin. 320.
* —— erratica. Pin. 320.
1. Caprifolium Germanicum. Dod. 411.
* —— non perfoliatum, fol. ſinuatis. J. R. H. 608.
1. Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente. J. R. H. 224.
— —— pratenſis, magno fl. albo. J. R. H.
* —— pratenſis, fl. minore purpuraſcente.
* —— pratenſis, fl. minore albo.
* 2. —— pratenſis, flore majore, elatior. J. R. H.
* 1. Cardiaca, J, B. 2. 320.
1. Carduus albis maculis notatus, vulgaris. Pin. 381. *Silybum albis maculis notatum, fl. purpureo.* Act. Ac. R. Sc.

Onopordon.

2. —— tomentoſus Acanthi folio, vulgaris. J. R. H. 441. *Onopordon vulgare, flore purpureo.* Act. Ac. R. S. *Acanthium vulg. fl. purpureo.* Tabern. Ic.
* —— Idem fl. ſuaverubente. *Onopordon vulgare flore ſuaverubente.* Act. Ac. R. Sc.
* —— totus viridis, Acanthi folio, vulgaris.
3. —— Carduus nutans. J. B. 3. 56.
* —— nutans, fl. ſuaverubente.
— —— nutans, fl. albo. J. B.

Eriocephalus.

4. —— lanceolatus latifolius. Pin. 385.

4. — lan-

4. —— lanceolatus latifolius, fl. albo. H. R. Par.

5. —— capite rotundo, tomentoſo. Pin. 382.

Carduus.

6. —— caule criſpo. J. B. 3. 59.

* —— caule criſpo, fl. ſuaverubente.

7. —— Acanthoides. J. B. 3. 56.

8. —— ſtellatus, ſive Calcitrapa. J. B. 3. 89. *Calcitrapa officinarum, flore purpuraſcente.* Act. Ac. R. S.

* —— Idem fl. intenſe purpureo. J. R. H. 440. *Calcitrapa offic. flore intenſe purpureo.* Act. Ac. R. S.

* —— Idem fl. ſuaverubente. J. R. H. 440. *Calcitrapa officinar. fl. ſuaverubente.* Act. Ac. R. Sc.

* —— Idem fl. albo, H. R. Par. *Calcitrapa officinarum flore albo.* Act. Ac. R. S.

* —— Idem multiflorus, capitulo longiore. *Calcitrapa multiflora capitulo longo gracili brevibus aculeis munito.* Act. Ac. R. Sc.

9. —— ſtellatus fol. integris ſerratis. Bot. Monſp.

10. —— ſtellatus, luteus, foliis Cyani. Pin.

1. Carlina ſylveſt. vulgaris Cluſ. Hiſt. 157.

1. Carpinus. Dod. 841.

1. Carui Cæſalp. 290.

*2. —— fol. tenuiſſimis Aſphodeli radice. J. R. H.

1. Caryophyllata vulgaris. Pin. 321.

1. Caryophyllus montanus 1. Tabern. Ic.
287. *Caryophyllus sylv. vulg. latifolius*. Pin.
* —— montanus fl. incarnato.
* —— montanus albus Tabern. Ic. 288.
Caryophyllus sylv. vulg. angustifolius. Pin.
*2. —— simplex, supinus latifolius. Pin.
208. caryophyllus altilis major cord.
* —— Idem flore rubro dilutiori.
3. —— sylvest. prolifer. Pin. 209.
* —— sylvest. prolifer, fl. albo. J. R. H.
333.

Armoriæ species.

4. —— barbatus, sylvestris. Pin. 209.
febri 1. Cassida palust. vulgatior, fl. cæruleo.
J. R. H. tertianaria ou centauree bleue
* —— palust. vulgatior, fl. albo. J. R. H.
2. —— palust. minima, fl. purpurascente.
J. R. H.
astr. 1. Castanea Dod. *sylvest. quæ peculiariter Castanea*. Pin. 419.
herbe au chat histor. 1. Cataria major & vulgaris. J. R. H. 202.
aperi. 1. Caucalis arvensis echinata, magno flore. Pin.
2. —— arvensis, echinata, latifolia. Pin.
—— Eadem, fl. albo. J. R. H.
...altis fructu ni...ricante micro... ...string 3. —— arvensis, echinata, parvo flore & fructu. Pin.
febri 1. Centaurium minus. Pin. 278.
* —— Idem flore dilutè purpurascente.

* Cen-

* Centaurium minus flore albo. Pin.

2. --- minus, purpureum, minimum. H.R. Bleſ. Centaurium majus folio in plures lacinias diviso hepatiq

*3. --- minus, ramoſiſſimum, fl. purpureo.

* --- minus, ramoſiſſimum, fl. purpuraſcente.

* --- minus, ramoſiſſimum, fl. albo.

*4. --- paluſtre, luteum, minimum. Raji Hiſt.

5. --- luteum perfoliatum. Pin.

1. Cepa tenuifolia ſphærocephalos, purpuraſcens. J. H. R. 383. *que Mr. Tournefort indique pro l'Allium montanum, capite rotundo.* Pin. 75. cepa vulgaris fl. et tunicis candidis vel purpurascentib oignon commun

2. --- montana, bicornis, fl. obſoletiore. J.R.H.

*3. --- bicornis, fl. luteo. *Allium Juncifolium bicorne, luteum.* Pin. 75.

4. --- ſylveſtris, tenuifolia, prolifera. Hiſt. Par. *Allium ſylv. tenuifolium.* Lob. Ic. 156.

1. Ceraſus ſylveſtris, amara, Mahaleb putata. J. B. cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli bois de sainte lucie resol

*2. ~~4~~ rep. --- ſativa, fructu rotundo, rubro & acido. J.R.H. 625.

*3. --- ſativa, fructu majori. J. R. H. *Griotier.*

*4. --- major, fr. magno cordato. Raji Hiſt. *Bigarotier.*

* 5. Cerasus fructu aquoso. J. R. H. *Guinier.*

* 6. ---- sylvest. fr. nigro. J. B. *Merisier.*

* 1. Ceratophyllon læve, aquis immersum. *Hydroceratophyllum folio lævi octo cornibus armato.*

* 2. ---- asperum, aquis immersum. *Equisetum sub aquâ repens, foliis bifurcis.* Flor. Pruss. *Hydroceratophyllum folio aspero quatuor cornibus armato.* Act. Ac. R. Sc. Par. ann. 1719. pag. 16.

1. Chærophyllum sylv. seminibus brevibus, hirsutis. J. R. H. 314.

2. ---- sylvest. perenne, Cicutæ folio. J. R. H.

* 3. ---- sylvest. alterum, geniculis tumentibus. H. R. Par.

* 1. Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro. Pin.

* 1. Chamæcissus vulgaris, purpureus.
* ---- vulgaris, cæruleus.
* 2. ---- minor, purpureus.
* ---- minor, cæruleus.
* 3. ---- major, hirsutior.
} vide Calamintha.

1. Chamædrys minor, repens. Pin. 248.

* ---- Eadem flore albo & rubello in eadem planta.

* ---- Eadem flore purpureo pallido J. B.

* Cha-

* Chamædrys fl. niveo. *Chamædrys minor repens, fl. niveo.* Pin. 248.

2. --- laciniatis foliis. Lob. Ic. 385.

* --- laciniatis foliis, fl. albo. Corn. 224.

3. diaphor --- fruticosa sylvest. Melissæ folio. J. R. H. 205. faux scordium sauge des bois

4. diaphor --- palustris, canescens, seu scordium officin. J. R. H. 205. scordium chamarras ou germandree deau chamaelea tricoccos purg.

* 1. Chamælinum vulgare. *Polygonum minimum, sive Millegrana minima.* Pin. 282.

2. --- vulgare, fl. albo pentapetalo. *Linum pratense, flosculis exiguis.* Pin. 214.

* 1. Chamæmelum nobile sive Leucanthemum odoratius. Pin. 135.

2. carminat --- vulgare, Leucanthemum Dioscoridis. Pin. *majus fol. tenuissimo, caule rubente.* H. R. Monsp.

------ Idem, fl. pleno. *majus folio tenuissimo, caule rubro, fl. pleno.* J. R. H.

3. carminat --- fœtidum. Pin. 135. maroute

* --- fœtidum, semiflosculis fistulosis.

* --- fœtidum, flore pleno. J. R. H. 494.

* 4. --- inodorum. C. B. Pin. 135.

1. Chamænerion villosum, magno fl. purpureo. J. R. H. 303.

2. --- villosum, majus, parvo flore. J. R. H.

3. Chamænerion glabrum, majus. J. R. H.
* --- Idem, foliis ternis.
4. --- glabrum, minus. J. R. H. 303.
5. --- latifolium vulgare. J. R. H. 302. vid. *Antoniana*. p. 8.
1. Chamæpytis lutea vulg. ſive fol. trifido. Pin. 249.
1. Chelidonium majus vulgare. Pin. 144.
2. --- majus foliis quernis. Pin.
1. Chenopodium Betæ folia. J. R. H. 506.
2. --- fœtidum. J. R. H. 506.
3. --- anguſtifolium, laciniatum, minus. J. R. H. 506.
4. --- Chenopodium ſylveſtre, alterum. *Atriplex. Atriplex ſylveſtris altera.* Pin. 119. *& non pas Atriplex ſylv. fol. ſinuato candicante.* Pin. *comme Monſr. Tournefort le veut.*
* --- Idem comâ purpuraſcente. *Chenopodium folio laciniato, comâ purpuraſcente.* J. R. H.
*5. --- ſylveſtre, Opuli folio.
*6. --- ſpicatum, fol. triangulari dentato. An? Blito Pes Anſerinus dicto ſimilis Atriplex vulg. ſinuata ſpicata D. Plot. Hiſt. Ox. Raji Synopſ. 64. *autour des eaux.*
7. --- Pes Anſerinus 1. Taber. Ic. *autour des eaux.*
8. --- Pes Anſerinus 2. Taber. Ic. *dans les Jardins.*
*9. --- Stramonii folio. *Blitum ſive A-triplex*

triplex Pes Anſerinus dicta Stramonii acutiore folio, ramoſum. Pluk. Mantiſſ. 32.

10. Chenopodium folio triangulo. J. R. H. 506.

11. --- annuum, humifuſum, fol. breviori & capillaceo. J. R. H. 506. *Camphoratæ ſpecies.*

1. Chondrilla Juncea, viſcoſa, arvenſis, quæ 1. Dioſcoridis. Pin. 130.

2. --- Sonchi folio, fl. luteo palleſcente. J. R. H.

*3. --- Hieracii folio annua. J. R. H. 475.

*1. Chriſtophoriana vulgaris, noſtras, racemoſa & ramoſa. Hiſt. Ox. 2. 8.

1. Chryſanthemum ſegetum. Lob. Ic.

* --- ſegetum noſtras, folio glauco multiſciſſo, majus, fl. minore. Pluk. Almag. Bot.

* --- ſegetum noſtras, Calendulæ folio glauco neque ſecto, neque ſerrato. Pluk. Almag. Bot.

1. Cichorium ſylveſt. ſive officinarum. Pin. 125.

* --- Idem flore pallidè cæruleo.

----- ſylveſtre, fl. roſeo. Pin. 126.

----- ſylveſtre, flore albo. Pin. 126.

* --- ſylveſtre platicaulon.

* --- ſylveſtre, folio prorſus integro. Pin. 125.

B 5 * Ci-

* Cichorium ſylveſtre folio maculato. *a feuille tachée de couleur de ſang.*

* --- ſylveſt. ſemifloſculis fimbriatis. *Cichorium ſativum florum ſemifloſculis laciniatis.* J. R. H. 473.

1. Cicuta major. Pin. 160.

* --- caule non maculato, ſeminibus cinereis. Raji Hiſt.

2. --- minor, Petroſelino ſimilis. Pin.

1. Circæa Lutetiana. Lob. Ic. 260.

1. Cirſium acaulon, fl. purpureo. J. R. H.

* --- acaulon, fl. dilutè purpuraſcente.

* --- acaulon, flore albo.

2. --- Anglicum Lob. Ic. *majus ſingulari capitulo magno, vel incanum variè diſſectum.* Pin.

3. --- pratenſe, polycephalon vulgare. J. R. H.

* --- Idem flore albo.

4. --- arvenſe ſonchi folio, radice repente, flore purpuraſcente. J. R. H. 448.

----- Idem fl. albo. J. R. H.

----- Idem caule tuberoſo. J. R. H.

* --- Idem capite prolifero. Act. Ac. R. Sc. 1718. p. 159.

1. Ciſtus Ledon, foliis Thymi. Pin. 467. vid. *Helianthemum.* nº. 6.

*1. Clandeſtina flore ſubcæruleo. J. R. H. 652.

*1. Clavaria militaris, crocea.

*2. Cla-

*2. Clavaria alba, piſtilli forma.
*3. --- Ophiogloſſoides, nigra.
1. Clematitis ſylveſtris, latifolia. Pin. 300.
----- ſylveſt. latifolia, foliis non inciſis. J. R. H.
1. Clinopodium Origano ſimile. Pin. 225.
----- Origano ſimile, fl. albo. Pin. 225.
2. --- Arvenſe, Ocimi facie, fol. anguſtioribus hirſutiſſimis. Pin. 225.
* --- Idem, flore carneo.
----- arvenſe, Ocimi facie, fol. anguſtioribus hirſutiſſimis, floribus albis. Pin. 225.
* --- foliis anguſtioribus penè lævibus. Pin. 225.
* --- arvenſe, Ocimi facie, foliis latioribus. Pin. 225.
1. Clymenum Pariſienſe, fl. cæruleo. J.R.H.
1. Cnicus cæruleus, humilis & mitior. J. R. H. 451.
2. --- Atractylis lutea dictus. H. L. Bat.
3. --- pratenſis, Acanthi folio, fl. flaveſcente. J. R. H.
---- Idem, fl. purpureo. J. R. H.
* --- pratenſis, foliis inferioribus integris, ſuperioribus laciniatis. *a Villeroy.*
1. Colchicum commune. Pin. 67.
*1. Colutea veſicaria. Pin. 396.
* ---- veſicaria, veſiculis rubentibus. I. B.
*1. Conferva Plinii. Lob. Ic. 257.
*2. Con-

*2. Conferva trichodes vel Trichomanes aquaticum. Lugd.

*3. --- minor, ramosa. Hist. Oxon. 3. Sect. 15. Tab. 4.

*4. --- reticulata. Raji Hist. app. 1852.

grand liseron 1. Convolvulus major, albus. Pin. 294.

ou lizet purgatif resolv 2. --- minor, arvensis. Pin. *flore roseo.* petit lizet ou liseron

* --- Idem fl. purpureo, radiis albis picto. Pin. con. maritimus nostras rotundi folius mor. histor. soldanelle ou chou marin. purg.

---- Idem fl. candido. Pin.

---- Idem fl. albo, cum purpureo umbilico. Pin.

---- Idem fl. albo, punicantibus lineis asperso. Pin. convol. vel scammonia syriaca purgat.

* --- Idem fl. albo, multifido.

1. Conyza major, vulgaris. Pin. 265. bihe

2. --- Linariæ folio. J.R.H. 455.

*1. Corallina fluviatilis non ramosa. *Equisetum sive Hippuris exigua, fluviatilis petræa, nuda, Virginensis.* Pluk. Phytogr.

*2. --- pinguis, ramosa, viridis.

1. Corallo-Fungus flavus. *Coralloides flava.* J.B.

2. ------- albidus. *Coralloides albida.* J.R.H. 564.

3. ------- dilutè purpurascens. *Coralloides dilute purpurascens.* J. R. H.

*4. ------- candidissimus. *a la piece de Suisse.*

5. ------- digitatus niger. *Agaricus digi-*

digitatus niger. J. R. H. 562.

*6. Corallo-Fungus, digitatus niger, apicibus albidis. *Agaricus digitatus niger, apicibus albidis.* J. R. H.

*7. -------- argenteus, Omenti formâ, *an Fungus ramosus candidus?* Pin.

*8. -------- Ornithopodioides, croceus.

*9. -------- qui Fungus niger compressus variè divaricatus & implexus inter lignum & corticem. Raji Synops. 333.

1. Coralloides corniculis candidissimis. J. R. H.

2. --- corniculis rufescentibus. J. R. H. 565.

3. --- cornua Cervi referens, corniculis brevioribus. J. R. H. 565.

------ cornua Cervi referens, corniculis longioribus. J. R. H. 565.

------ aspera corniculis tenuioribus bifurcatis. Hist. Par. 423.

------ glabra, corniculis tenuioribus bifurcatis. Hist. Par. 423.

------ cornua cervi referens, corniculis aduncis. *Lichen pyxidatus corniculis aduncis.* Hist. Par. 483.

*4. --- tubulosa, ramulis crassioribus. *Corallina montana, tubulosa, ramulis crassioribus.* Raji Synops. 332.

*1. Coriandrum majus. Pin. 158.

1. Cor-

1. Cornus Hortensis, mas. Pin. 447.
2. --- fœmina. Pin. 447. vid. *Sanguen.*
1. Coronilla herbacea, fl. vario. J. R. H.
* ---- herbacea, fl. albo.
----- herbacea, fl. vario pleno. D. Vaillant. J. R. H. 650.
2. --- minima. J. R. H. 650. *Ferrum Equinum Gallicum siliquis in summitate.* C. B. Pin. 349. *Item Polygala major Massiliotica.* Ejusd. Ibid.
1. Coronopus hortensis. Pin. 190.
1. Corylus sylvestris. Pin. 418.
Cracca, vid. *Vicia.*
1. Cratægus fol. subrotundo, serrato. J. R. H.
* --- fol. subrotundo, serrato & laciniato.
2. --- folio laciniato. J. R. H. 633. *Alizier.*
3. --- fructu nigro. *Mespilus folio rotundiori, fructu nigro subdulci.* J. R. H. 642. *Amelanchier.*
1. Cruciata hirsuta. Pin. 335.
2. --- palustris, alba. J. R. H. 115.
----- minima. J. R. H.
* 3. --- glauca angustifolia. *a Chailly.*
* 4. --- quæ Rubia erecta quadrifolia. J. B. 3. 717. *a St. Maur. Mr. d'Isnard.*
1. Cucubalus Plinii. Lugd. 1429.
* 1. Cupressus fusa sive mas. Pluk. Almag.
* 2. --- fastigiata fœmina. Pluk. Almag.
* 1. Cu-

Cucurbita longa folio molli flore albo courge calebasse, refrig

*1. Cuſcuta major. Pin. 219. epithim Barbe de moine

2. hepatiq minor. J. R. H. 652.

* ------ minor, aurea, fl. albo.

1. Cyanus ſegetum, fl. cœruleo. Pin. 373.

* ophthal ſegetum, flore albo. Pin. bluet aubifoin casselunettes

* --- ſegetum, fl. dilutè Janthino. Pin. *Gris de Lin.* cydonia fructu breviore rotundiore coignassier astring

* --- ſegetum, fl. incarnato. Eyſt.

* --- hortenſis, atro purpuraſcente flore. H. R. Par. cyclamen orbiculato folio interne purpurascente pain de pourceau, purg.

1. Cynogloſſum majus vulgare. Pin. 257.

* --- Idem fl. albo. C. B. Pin. 257.

*2. --- Creticum, latifolium, fœtidum. Pin. Langue de chien

Cynoſorchis. vid. *Orchis.*

1. Cyperoides latifolium, ſpicâ rufa, ſ. caule triangulo. J. R. H. 524.

2. --- ſpicâ pendula breviore. J. R. H.

*3. --- ſpicâ pendulâ longiore & anguſtiore. J. R. H.

4. --- polyſtachion lanuginoſum. J. R. H.

5. --- polyſtachion, ſpicis teretibus erectis. J. R. H.

6. --- veſicarium, glabrum, ſpicâ pendulâ longiore. J. R. H.

7. --- veſicarium, humile, locuſtis rarioribus. J. R. H.

8. --- ſpicis parvis longè diſtantibus. J. R. H.

9. Cy-

9. Cyperoides minus, ſpicis denſiorib. J. R.H. *Gramen Caryophyllatæ foliis, ſpicâ di-vulſâ.* Pin. 3.

10. --- paluſtre, aculeatum, capitulo breviore. J. R. H.

11. --- nigro-luteum vernum, majus. J. R. H.

a. 12. --- nigro-luteum vernum, minus. J. R. H.

b.* 12. -- quod Gram. Cyperoides tenuifolium ſpicis ad ſummum caulem ſeſſilibus globulorum æmulis. Pluk. *voyez le* 8. *Scirpoides de ce Catalog.*

* 13. --- ſylvarum tenuius ſpicatum. J. R. H.

* 14. --- polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus prope ſummitatem caulis. J. R. H. 530.

* 15. --- latifolium, ſpicâ ſpadiceo viridi, majus. J.R. H. 529.

* 16. --- ſylvarum, ſpicâ variâ. *Gramen Caryophyllatum, montanum, ſpicâ variâ.* Pin.

* 17. --- auguſtifolium, ſpicis ſeſſilibus in foliorum alis. J. R. H.

* 18. --- quod Gram. Cyperoides majus præcox, ſpicis turgidis teretibus flaveſcentibus. H. Ox. 3.

* 1. Cyperus odoratus radice longâ, ſive Cyperus officin. Pin. 14.

* 2. Cy-

*2. Cyperus minimus, paniculâ ſparſâ, flaveſcente. J.R.H.

3. —— minimus, paniculâ ſparſâ, nigricante. J.R.H.

4. —— Gramineus. J.B.

5. —— vulgatior paniculâ ſparſâ. J.R.H.

1. Cytiſo-Geniſta ſcoparia, vulg. fl. luteo. J.R.H.

—— —— ſcoparia, vulg. fl. albo. J.R.H.

D.

1. DAmaſonium ſtellatum. Lugd. 1059.

*2. —— radiculas emittens, ex geniculis. *Ranunculus paluſt. foliis gramineis, & ſubrotundis.* Petit. Epiſt. pag. 57.

3. —— ampliore folio, paniculatum. *Ranunculus paluſt. Plantaginis folio ampliore.* J.R.H.

4. —— paniculatum, anguſtiore folio. *Ranunculus paluſt. Plantaginis folio, anguſtiore.* J.R.H.

5. —— umbellatum, auguſtiſſimo folio. *Ranunculus aquat. Plantaginis folio anguſtiſſimo.* J.R.H.

1. Daucus vulgaris. Cluſ. Hiſt.

* —— vulg, umbellâ rubente.

2. —— annuus, minor, florib. albis. J.R.H.

Daucus annuus, minor, florib. rubentib. J.R.H.

*.3. —— ſegetum, minor. *Caucalis ſegetum minor, Anthriſco hiſpido ſimilis.* Rajii Hiſt.

4. —— annuus, ad nodos, floridus. J.R.H.

1. Delphinium ſegetum fl. cæruleo. J. R. H.

* —— ſegetum, fl. albo. J.R.H.

* —— ſegetum, fl. dilutius rubente. J. R. H.

* Delphinium elatius, fl. pleno variegatum. Swert. 9.

1. Dens leonis latiore folio. Pin. 126.

* —— ampliſſimo folio. J.R.H. 468.

2. —— —— anguſtiore folio. Pin.

3. —— —— tenuiſſimo folio. Pin. *autour de l'arc de triomphe & dans les allées qui conduiſent a Vincennes.*

*4. —— —— pumilus, ſaxatilis aſper, radice fibroſa. Hiſt. Ox. 3. Icon. Tab. 7. Sect. 7. n°. 13.

*5. —— foliis minimis hirſutis, & aſperis. J.R.H. 469. *Sur la Butte Montbauron.*

*6. —— foliis hirſutis & aſperis. H.R. Monſp. *ſur la Butte de Seve.*

7. —— qui Piloſella officinarum. J. R. H.

H. *Piloſella major, repens, hirſuta.* B. Pin.

*8. Dens Leonis, qui piloſella folio minus villoſo. J. R. H.

*1. Dentaria heptaphyllos, baccifera. C. B. P. 322. *a Conches.*

Digitalis purpurea. J. B.

* ——— fl. dilutè carneo. Hiſt. Ox. 2.

——— flore magno candido. J. B. 2.

2. ——— major lutea, vel pallida, parvo flore. Pin.

1. Dipſacus ſylveſtris aut Virga paſtoris, major. Pin. 385.

1. Doronicum, Plantaginis folio. Pin.

E.

* ECHINOPUS major. J. B. *entre Erreux & Conches.*

1. Echium vulgare. Pin. 254.

* ——— vulg. fl. ex purpura rubente. Pin.

* ——— vulg. fl. albo. H. Edinb.

* ——— vulg. platicaulon. Pin.

* ——— vulg. paniculâ criſpâ.

1. Elatine folio ſubrotundo. Pin. 252.

2. ——— fol. acuminato, in baſi auriculato, fl. luteo. Pin. 253.

3. ——— fol. acuminato, fl. cæruleo. Pin. 253.

*4. ——— Hederaceo folio glabro, ſive Cymbalaria vulgaris.

1. Elichryſum montan. fl. rotundiore ſubpurpureo. J. R. H. 458.

* —— montanum fl. rotundiore ſuave-rubente. J. R. H.

* —— montan. fl. rotundiore variegato. J. R. H.

—— montan. fl. rotundiore candido. J. R. H.

2. —— montanum, longiore & folio & flore purpureo. J. R. H. 453.

* —— montanum longiore & fol. & flore albo. J. R. H.

3. —— ſpicatum, J. R. H. 453.

4. —— ſylveſtre, latifolium, capitulis conglobatis. Pin.

5. —— aquaticum ramoſum, minus, capitulis foliatis. J. R. H. 452.

1. Enteroides paluſtris. vid. *Fucus*.

1. Equiſetum paluſtre, longioribus ſetis. Pin. 15.

*.2. —— paluſtre, brevioribus Setis. Pin.

* 3. —— pratenſe, longiſſimis Setis. Pin.

4. —— paluſtre majus. Tab. Icon. 252.

* 5. —— arvenſe longioribus ſetis. Pin.

*6. —— foliis nudum, ramoſum. Pin.

7. —— foliis nudum, non ramoſum, ſeu junceum. Pin. 16.

*8. E-

*8. Equisetum nudum lævius nostras, Raji Synops. 42. *Je croy que celle cy est la 4. naissante.*

9. —— palustre, brevioribus foliis, polyspermon. Pin. vid. *Limnopeuce.*

1. Erica vulgaris glabra. Pin. 485. bruyere

—— vulg. glabra, fl. albo. Pin.

2. —— Myricæ folio, hirsuta. Pin.

3. —— humilis, cortice cinereo, arbuti flore. Pin.

* —— Ead. arbuti flore Janthino dilutiore.

—— Ead. arbuti flore albo. H. R. Par.

* —— Ead. arbuti flore carneo dilutiore.

* —— Ead. Amaranthoides, flore vidua.

*4. —— Brabantica, folio Coris hirsuto, quaterno. J. B. 1. 358.

* —— Eadem, flore albo. J. B.

*5. —— major scoparia, foliis deciduis Pin.

1. Eruca tenuifolia, perennis, fl. luteo. J. B. roquette

* —— Ead. fl. viridi seu abortivo.

*2. —— minimo flore, Monspel. J.B. 2. 862.

3. —— sylvest. minor, lutea, Bursæ pastoris folio. Pin.

*4. Eruca ſylveſt. major, lutea, caule aſpero. Pin.

*5. —— procumbens, alba, ſiliquis ſingularibus in foliorum alis.

*6. —— quod ſiſymbrium Erucæ folio aſpero, flore luteo. J. R. H.

*1. Ervum verum. Cam. Hort.

1. Eryngium vulgare. Pin, 386.

1. Eryſimum vulgare. Pin. 100.

*2. —— fol. ſubincanis, ſiliquis breviſſimis. Par. Bat.

3. —— latifolium, majus, glabrum. Pin.

1. Evonymus vulg. granis rubentibus. Pin.

1. Eupatorium Cannabinum. Pin.

* —— Cannabinum, florib. albis. Flor. Bat. 26.

1. Euphraſia officinarum. Pin. *parvo flore.* *Euphraſia minor*. Broſſæi. 52.

2. —— major. Broſſ. 52. *minus ramoſa, flore ex cæruleo purpuraſcente*. Eyſt.

——— major, fl. albo. *Euphraſia ramoſa pratenſis, fl. albo*. Eyſt.

F.

*1. FAba minor, ſ. Equina. Pin. 338.

*2. —— major, vulgaris. Adv. Lob.

1. Fagopyrum vulgare, erectum. J. R. H. 511.

* Fagopyrum vulg.erectum, flore rubente.

2. —— vulg. ſcandens. J.R.H.

1. Fagus. Dod. Pempt. 832.

1. Ferrum Equinum Germanicum, ſiliquis in ſummitate. Pin. 449. Item *Ferro equino Gallico affinis.* Ejuſd. ibid.

1. Feſtuca, vid. Gramen n°. 72.

1. Filago ſeu Impia. Dod. Pempt. 66.

* 2. —— ſeu Impia capitulis lanuginoſis. *Gnaphalium minus latioribus foliis.* Pin. 263.

3. —— altera, Dod, Pempt. 67.

4. —— vulg. tenuiſſimo folio, erecta. J.R.H. 454.

* 5. —— minor. Ger. Emac. 641.

* 1. Filicula fontana, major, ſive Adiantum album Filicis folio. Pin. 358.

* 2. —— regia, Fumariæ pinnulis.

3. —— quæ Adiantum nigrum officin. pinnulis obtuſioribus. J.R.H. 542.

1. Filipendula vulg. an Molon Plinii. Pin.

non ramoſa.

1. Filix minor non ramoſa. J. B. *minor paluſtris.* Raji Hiſt. 146.

2. —— non ramoſa, dentata. Pin. 358. *maſ. non ramoſa, latifolia, dentata.* J.R.H.

3. —— mollis ſive glabra, vulgari mari non ramoſæ accedens. J.B. 3.708.

ramosa.

*4. Filix mas ramosa, pinnulis dentatis, Ger. Emac. 1129.

*5. —— montana, ramosa, minor, argutè denticulata: Raji Syn. 49. *Alpina Myrrhidis facie. Filix tenuissime secta ex Balon.* J.B. 3. 739.

* —— non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissimè dentatis. Pin. 358.

6. —— ramosa, minor, pinnulis dentatis. Pin.

7. hepatica ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. Pin. filix femina

* —— ramosa, major, pinnulis obtusis undulatis. J.R.H.

* —— ramosa major, pinnulis obtusis ramulis bifurcatis.

1. Fluvialis Pisana, fol. denticulatis. J.B. 3.779.

*2. —— foliis angustis dentatis. *Fluvialis species angusto brevique folio, undequaque spinis infesta.* H. Cath. 241.

*3. —— Gramineo folio, polycarpos. *Potamogeiton similis, Graminifolia ramosa, & ad genicula polyceratos.* Pluk. Almag.

1. Fœniculum sylv. elatius, Ferulæ folio longiori. J.R.H. 311.

2. Fœ-

2. Fœniculum ſylv. perenne, Ferulæ folio breviori. J.R.H *fœni. hortuosum vel sceli massilien. fœniculi folio crassum*

*3. *aperit* —— annuum, umbellâ contractâ oblongâ. J.R.H. *fœniculum dulce majore albo semine. aperit*

4. —— minimum, patulum. J.R.H.

*5. —— annuum, Tragoſelini odore, umbellâ albâ.

* —— Idem umbellâ rubente.

*6. *fenouil* —— vulgare Germanicum C. B. Pin. 147.

*1. Fœnum græcum ſativum. Pin. 348.

2. —— —— ſylveſtre, alterum, polyceration. Pin.

*1. Fragaria vulgaris Pin. 326. *fructu rubro vulgaris.* Broſſ. *fraisier aperit*

* ——- vulg. fr. albo. Pin

*2. —— fructu parvi Pruni magnitudine. Pin.

*3. —— ſterilis ampliſſimo folio & flore.

4. ——- ſterilis. Pin.

*5. —— ſterilis incana. H.R.Par.

Fragariaſtrum. vid. Fragaria n°. 4. & 5.

1. Frangula. Dod. Pempt. 784. *aulne noir bourgene purg. ... dictame blanc*

1. Fraxinus excelſior. Pin. 416. *frene*

*1. Fucus fontanus, pinguis, corniculatus viridis.

2. —— tubuloſus inteſtinorum formâ. J.R.H.

3. Fucus fluviatilis, aculeatus, undulatus. J.R.H.

1. Fumaria officin. & Dioſcoridis, flore purpureo. Pin. 143.

* —— Eadem flore palleſcente. Pin.

* —— Ead. flore albo. Pin.

2. —— major, floribus dilute purpureis. Bot. Monſp.

*3. —— lobis anguſtioribus floribus alatis.

4. —— foliis tenuiſſimis, floribus albis. Pin.

4. —— minor, tenuifolia, caulibus ſurrectis, flore hilari purpurâ rubente. Pin. 143.

*5. —— ſegmentis longis, anguſtis, rarius diſpoſitis.

1. Fungoides infundibuli formâ ſemine fœtum. J.R.H. 560.

*2. —— infundibuli formâ, ſemine fœtum, internè ſtriatum, externe hirſutum.

*3. —— nigricans Cornucopiæ formâ.

*4. —— fuſcum, Acetabuli formà, externe ramificatum.

*5 —— maximum & multiplex, aurantii coloris, ad baſim rugoſum. *au Jardin. Royal.*

1. Fungus pileolo lato & rotundo, livido. Pin.

2. —— pileolo lato orbiculari, candicante. Pin.

3. albus, acris. Pin. 371.

4 —— pileolo rotundiori Mouceron dictus. J. R. H.

5. —— angulosus & velut in lacinias sectus. Pin.

6. Aurantii coloris capitulo in conum abeunte. J. R. H.

7. —— albus pileolo inverso. J. R. H.

8. Fungi lutei perniciosi, sub Pinu habitantes. J. B. 3. 832.

9. Fungus pileolo lato longissimo pediculo variegato. Pin. 371.

10. Fungus Clypeiformis, major. Pin. 373.

11. —— Clypeiformis, minor. Pin.

12. —— albus splendens, ex uno pediculo multiplex. J. R. H.

13. —— perniciosus ex eodem pediculo multiplex. J. R. H.

14. —— porosus, magnus, crassus. J. B. 3. 833.

15. —— porosus, magnus, crassus, purpurascens. J. R. H.

G.

* 1. Gale florifera.

* —— fructifera.

* —— frutex odoratus ſeptentrionalium. J. B. 1. part. 2. 225.

1. Galeopſis procerior, fœtida ſpicata. J.R.H. 185.

2. —— procerior, caliculis aculeatis, fl. purpuraſcente. J.R.H.

* —— Eadem, flore variegato.

* —— Eadem, florib. candidis. J.R.H.

* 3. —— altera, caliculis aculeatis, fl. flaveſcente. J.R.H.

* —— Ead. flore purpuraſcente.

4. —— patula ſegetum, fl. purpuraſcente. J.R.H.

* —— Ead. fl. dilutiſſimè purpuraſcente.

* 5 —— Alpina, Betonicæ folio, fl. variegato. J.R.H.

—— paluſtris Betonicæ folio, fl. va- [illegible] J.R.H.

—— ſive Urtica iners, fl. luteo. J.B. 3 [illegible]

—— lutea, amplioribus foliis maculatis. J.R.H.

Gallium album, vulgare. J.R.H. [illegible]

* Gal-

* Gallium Album, vulgare, incanum & villoſum.

* ——- vulgare, flore luteolo.

*2. —— album, minus. *Mollugo montana, minor, Gallio albo ſimilis.* Raji Hiſt. 1.482.

3. ——- luteum. Pin. 335.

*4. —— arvenſe, fl. cæruleo. J. R. H. *Aſperulæ ſpecies.*

*5. —— Pariſienſe, tenuifolium, fl. atro-purpureo J. R. H vid. *Aparine.* n°. 5.

1. Geniſta tinctoria, Germanica. Pin. 395.

* ——- tinctoria Germanica, anguſtifolia.

2. ——- ramoſa, foliis Hyperici. Pin.

1. Geniſta ſpartium majus brevioribus aculeis. J. R. H.

2. —— —— majus longioribus aculeis. J. R. H.

3. —— —— minus Anglicum. J. R. H.

1. Geniſtella herbacea, ſive Chamæſpartium. J. B.

1. Gentiana cruciata. Pin. 188.

2. ——- anguſtifolia, autumnalis, major. Pin.

*3. —— pratenſis, flore lanuginoſo. Pin.

?4. —— Alpina pumila, Centaurii minoris folio. Pin.

Geranioides. vid. *Geranium.* n°. 8.

1. Ge-

ashwir 1. Geranium ſanguineum, maximo flore Pin. *bec de grue, pie de pigeon*

2. ashwin —— folio Malvæ rotundo. Pin.

* 3. —— Columbinum villoſum, petalis purpureis bifidis. *Columbinum minus, majori flore & foliis florum bifidis.* Bot. Monſp.

* —— Idem, petalis albis bifidis.

* 4. —— Columbinum, diſſectis foliis, pediculis florum longiſſimis. Raji Hiſt. 1059.

* —— Idem floribus incarnatis.

* 5. —— Columbinum, majus foliis imis longis uſque ad pediculum diviſis. Hiſt. Ox.

* 6. —— Columbinum majus flore minore cæruleo. Raji Hiſt.

* —— Idem fl. purpureo.

ashwin 7. *herbe a robert* —— Robertianum 1. viride. Pin.

* —— Robertianum, 1. rubens. Pin.

—— Robertianum, fl. albo. H. R. Bleſ.

8. —— Cicutæ folio, minus & ſupinum. Pin.

—— Idem, fl. albo. Pin.

d? —— fol. Malvæ rotundo, fl. majori cæruleo. Pin.

d? —— Columbinum, tenuis laciniatum. Pin. *C'eſt le* n°. 4.

d? —— Columbinum minus majori flore & foliis florum bifidis. Bot. Monſp. *C'eſt le* n°. 3.

d. Ge-

d. Geranium Columbinum majus fol. te-
uiter diſſectis, foliis florum bifidis. Bot.
Monſp.

*9. —- lucidum, ſaxatile. C.B. Pin.
18.

1. Glaucium flore luteo. J.R.H.

1. Glaux altera ſubrotundo folio. Bocc.
Muſ. *paluſt. fl. ſtriato clauſo foliis Portulacæ.*
J.R.H.

1. Globularia vulgaris. J.R.H. 467.

Gr. *Loliaceum.*

1. Gramen Loliaceum, ſpicâ longiore,
riſtas habens. Pin. 9.

* ——- Loliaceum, ſpicâ longiore, ſine
riſtis. Pin. 9.

2. —— Loliaceum, anguſtiore folio &
ſpicâ. Pin. 9.

* ——- Idem ariſtis donatum. J.R.H.
516.

* ——- Loliaceum, majus ſpicis longius
diſtantibus J.R.H.

* ——- Loliaceum, paniculâ multiplici
& ſpicatâ. J.R.H.

* ——- Loliaceum, ſpicis brevibus & la-
tiorib. compreſſis. J.R.H.

3. ——- Loliaceum corniculatum, ſpicis
glabris. J.R.H.

*4. —— Loliaceum, corniculatum, ſpi-
cis villoſis. J.R.H.

*5. Gra-

*5. Gramen Loliaceum, foliis & ſpicâ te-
nuiſſimis. Hiſt. Ox.

6. ——- minimum Dalechampii. Lug.
424.

Gr. Triticea.

8. chiendent ——- Loliaceum rad. repente ſ. Gram.
offic. J.R.H. aperit

* ——- Idem ariſtis longioribus donatum.
J.R.H.

*9. —— anguſtifolium, ſpicâ Tritici mu-
ticæ ſimili. Pin.

* —— —— Idem ariſtis longiorib. do-
natum.

*10. — Loliaceum fibroſa radice ariſtis
donatum. J.R.H.

11. —— minimum fol. Junceis, panicula
unam partem ſpectante. J.R.H.

Gr. Secalina.

12. —— ſpicatum, vulgare, ſecalinum. J.
R.H.

13. —— ſpicatum, ſecalinum, minus.
J.R.H.

14. —— ſpicâ, ſecalina. Pin.

Gr. Phalaroides.

15. —— ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ lon-
gioribus villis donatâ. J.R.H. 520.

16. Gra-

16. Gramen aquaticum, geniculatum, ſpicatum. Pin.

17. --- cum cauda muris purpuraſcente. J. B.

* ---- cum cauda muris vireſcente.

Gr. Typhoides.

18. --- Typhoides maximum, ſpicâ longiſſimâ. Pin.

19. --- Typhoides, aſperum primum. Pin.

20. --- nodoſum, ſpicâ parvâ, ſive nodoſum tertium. Pin.

Gram. ſpicâ ſimplici ſingulari. &c.

*21. Gramen ſpicatum locuſtis echinatis. J. R. H.

22. ---- ſpicatum, glumis criſtatis. J. R. H. 519.

*23. --- ſpicatum, glumis variis. J. R. H. 519.

24. ---- ſpicatum, ſpicâ purpuro argenteâ molli. J. R. H.

*25. --- parvum præcox, ſpicâ laxa caneſcente. Raji Cat. Angl. 150. Pluk. Phyt. Tab. 33. fig. 9.

26. ---- ſpicatum, Junci facie, Lithoſpermi ſemine. J. R. H.

27. Gramen pratenſe, ſpicâ flaveſcente. Pin.

28. ---- ſpicatum, ariſtis pinnatis. J. R. H.

*29. --- Avenaceum montanum, ſpicâ ſimplici ariſtis recurvis. Raji Synopſ. 262.

d. ---- pratenſe, ſpicâ purpurea ex utriculo abeunte vel Gram. folio ſpicam amplexante. Pin.

d. ---- ſpicatum, anguſtifolium, montanum. Pin. *c'eſt une eſpece de Cyperoides.*

Gram. dactylon.

30. pié de poule ---- dactylon radice repente, ſive officinarum. J. R. H. aperit

*31. --- dactylon anguſtifolium ſpicis villoſis. Pin. 8.

32. ---- dactylon folio latiore. Pin. 8.

* ----- dactylon fol. latiore, ſpicis nigris disjunctis.

Gram. Miliaceum.

33. ---- ſylvaticum paniculâ miliaceâ. Pin. 8.

34. ---- pratenſe, paniculatum, altiſſimum, locuſtis parvis ſplendentibus, non ariſtatis. J. R. H.

* ----- Idem paniculâ flaveſcente.

* Gra-

* Gramen, idem ſoboliferum.

*35. --- caninum, ſupinum, minus. Pin. 1.

* ----- caninum, ſupinum, paniculatum, folio varians. Pin. 1.

* ----- paluſtre, paniculâ ſpecioſâ. Pin.

36. ---- montanum, panicula, ſpadicea delicatiore. Pin. 3.

* ----- Idem, ſoboliferum.

37. ---- pratenſe paniculatum, molle. Pin. 2.

* ----- pratenſe paniculat. molle, album.

*38. --- caninum, paniculatum, molle. Raji Hiſt.

39. --- Arundinaceum, aceroſâ glumâ noſtras. Park.

* ---- Idem glumis albicantibus.

*40. --- Junceum Dalechampii. Lugd.

*41. --- Avenaceum, locuſtis rarioribus. Pin.

*42. --- ſerotinum, arvenſe, ſpicâ laxâ pyramidali. Raji Hiſt.

Gram. panicul. locuſtis ſimpl. & ariſt.

43. --- capillatum, paniculis rubentibus. J. B.

------- Idem viridantibus. J. B.

*44. --- paniculatum, minimum, molle. Bot. Monſp.

*45. Gramen capillatum, paniculis longioribus & anguſtioribus.

46. ---- nemorum paniculis albis, capillaceo folio. Pin. 7.

47. ---- Avenaceum pratenſe, elatius, panicula flaveſcente, locuſtis parvis. Raji Hiſt.

*48. --- Avenaceum elatius, jubâ longâ ſplendente. Raji.

49. ---- nodoſum, Avenaceâ paniculâ. Pin. 2.

*50. --- Avenaceum glabrum, paniculâ purpuro argenteâ ſplendente. Raji Syn. 192.

*51. --- Avenaceum, paniculâ purpuro argentea ſplendente. Raji Hiſt. *hirſutum eſt.*

Gr. panicul. locuſtis ſquam. non ariſt.

52. ---- Avenaceum, parvum, procumbens, paniculis non ariſtatis. Raji Hiſt.

53. ---- paniculatum aquaticum, miliaceum. J. R. H. 521.

54. --- paniculatum autumnale, paniculâ anguſtiore, ex viridi nigricante. J. R. H. 521.

----- paniculatum autumnale, paniculâ ampliore, ex viridi nigricante. J. R. H.

55. --- pratenſe, paniculatum, majus latiore folio. Poa Theoph. Pin.

56. Gra-

56. Gramen pratenſe, paniculatum, majus, anguſtiore folio. Pin. 3.

* ---- Idem cum ſpongiolis.

57. --- pratenſe, paniculatum, minus, album. Pin.

----- pratenſe, paniculatum, minus, rubrum. Pin.

58. --- pratenſe, paniculatum, medium. Pin.

* 59. -- paniculatum, rad. repente, culmo cumpreſſo. An Gramen caninum vineale. Pin. 1.

60. --- arvenſe, paniculâ criſpa. Pin.

61. --- Xerampelinum, Miliaceâ prætenui ramoſaque ſparſa paniculâ, ſive Xerampelino congener arvenſe, æſtivum, Gramen minutiſſimo ſemine. Lob. Ill.

62. --- ſpicatum, folio aſpero. Pin.

* ---- ſpicatum, fol. aſpero, ſpicâ albâ.

63. --- aquaticum paniculatum, latifolium. Pin.

64. --- paniculatum elatius, ſpicis longis, muticis ſquamoſis. Raji Hiſt. 522.

65. --- paniculatum aquaticum, fluitans. J. R. H.

66. --- capillatum, locuſtis pennatis, non ariſtatis. Raji.

67. --- paniculis elegantiſſimis ſive Eragroſtis majus. Pin.

*68. Gramen paniculis elegantissimis, minimum. J. R. H.

69. --- minus vulgare, panicula rigidâ. J. R. H.

70. --- tremulum, majus, panicula spadiceâ. Pin.

------ tremulum, majus. Pin. *locustis candicantibus.*

71. --- tremulum, minus, panicula parvâ. Pin.

Festuca.

72. --- quod Festuca Avenaceâ, sterilis, elatior. Pin. 9.

73. --- quod Festuca Avenaceâ, sterilis, humilior. Pin. *vel potius Festuca graminea glumis vacuis.* C. B.

74. --- Avenaceum dumetorum, paniculâ sparsâ. Raji Hist.

*75. -- Avenaceum glabrum, paniculâ è spicis strigosis composita aristis tenuissimis. Raji Hist.

*76. -- quod Festuca pratensis lanuginosa. Pin. 10.

*---- Idem fol. latioribus.

*77. -- Avenaceum, minus, fol. inferioribus capillaceis, superioribus verò latioribus. J. R. H.

78. --- pratense, paniculâ duriore, laxa,

xa, unam præcipuè partem ſpectante. Raji.

* 79. -- paniculatum, Bromoides, minus, paniculis ariſtatis unam partem ſpectantibus. Raji.

80. --- murorum ſpicâ longiſſimâ. Ger.

81. --- gros Montbelgard. J. B. 2. 438.

* 82. -- Avenaceum, locuſtis amplioribus candicantibus, glabris & ariſtatis. J. R. H. ann.

83. --- Avenaceum locuſtis villoſis, craſſioribus. J. R. H.

* 84. -- Bromoides ſegetum, latiore paniculâ. Park. 1149. ann. *Feſtuca graminea effuſa juba.* C. B.

1. Gratiola Centauroides. Pin. 279. *Digitalis minima, Gratiola dicta.* Mor. Hiſt. purg.

refr 1. Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſâ ſylveſtris. Pin. 455. groseliers blanc epineux

2. cord. alex --- non ſpinoſa, fructu nigro majore. Pin. groiselier a fruit noir, cassis, ou poivrier

3. --- multiplici acino, ſive non ſpinoſa, hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. Pin.

guajacana faux guaiac : astrin
gujava astring

H.

harmala : rue sauvage . histor.

* 1. Hedera arborea. Pin. 305. lierre deterst

* --- major ſterilis. Pin.

Hedera terreſtris, vid. *Calamintha.* nº. 4.

hedisarum clypeatum f... suavite vul... ute sainfoi... d'espagne ...

bu pec Helianthemum vulg. fl. luteo. J. B.

* ---- vulg. fl. dilutiore. J. R. H. 248.

fleur du soleil herbe d'or

 *2. He-

*2. Helianthemum Majoranæ folio, capitulis valdè hirſutis.

3. --- foliis majoribus fl. albo. J. B.

4. --- tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum ſparſum. J. B.

5. --- flore maculoſo. Col. 2. 77.

6. --- foliis Thymi floribus umbellatis. J. R. H.

detersif 1. Heliotropium majus. Dioſcoridis. Pin. 253. herbe aux verrues

----- majus autumnale, Jaſmini odore. J. R. H.

1. Helleborine latifolia, montana. Pin.

2. --- paluſtris noſtras. Raji Hiſt. 1231.

3. fol. [illegible] --- flore albo, vel Damaſonium montanum, latifolium. Pin. 187.

4. --- montana anguſtifolia, purpuraſcens. Pin.

*5. -- fol. prælongis, anguſtis, floribus candidis, an prioris varietas?

purgat 1. Helleborus niger, fœtidus. Pin. 185. pied de griffon

1. Hepatica petræa ſtellata. 2. *Tabern. Ic. Lichen petræus ſtellatus.* Pin.

*2. --- petræa umbellata. 3. *Tabern. Ic. Lichen petræus umbellatus.* Pin.

*3. --- officin. 1. *Tabern. Ic. Lichen petræus latifolius, ſive Hepatica fontana.* Pin.

*4. --- pileata & ſtellata. *Lichen petræus cauliculo pileolum ſuſtinente.* Pin. *a Jouy.*

*5. --- paluſtris, lobis criſtatis. *a Meudon.*

*6. He-

*6. Hepatica paluſt. bifurcata, lobis bre-
vioribus carinatis.

*7. --- paluſt. dichotoma, ſegmentis
oblongis & anguſtis.

*8. --- arborea, globuligera.

*9. --- ſaxatilis, undalata, ſeminifera.

*10. --- quæ Lichen ſive Hepatica lu-
nulata Epiphyllocarpos. 7. Raji Hiſt. 125.

*1. Hepaticoides hepaticæ facie. *Lichen
petræus cauliculo calceato.* Pin. 362.

2. ---- Polytrichi facie. *Muſcus nummu-
lariæ foliis ſubrotundis densè poſitis.* J. R. H.

*3. --- Polytrichi facie, foliis bifidis,
major. *Muſcus pennatus, fol. ſubrotundis, bi-
fidis major.* J. R. H.

4. ---- albeſcens, foliis pennatis. *Mu-
ſcus nummulariæ folio, fructu pediculo carente.*
J. R. H.

*5. --- foliis ſubrotundis ſquamatim in-
cumbentibus major. *Muſcus ſquamoſus fol.
ſubrotundis denſiſſimis.* J. R. H. 554.

6. ---- fol. ſubrotundis, ſquamatim in-
cumbentibus minor. *Muſcus ſaxatilis num-
mulariæ folio minor.* J. R. H. 555. hermodactylus folio quadrangulo inst. h. purg.

1. Herba Paris. Dodon. raisin de renard

1. Herniaria glabra. J. B. herniole, turquete

2. --- hirſuta. J. B.

*1. Heſperis hortenſis. Pin. fl. purpureo.

* ---- Eadem, fl. candido. Pin. julienne

2. --- Allium redolens. Mor. Hiſt. alliaire

D 5 3. He-

3. Heſperis Leucoji folio ſerrato, ſiliqu quadrangulâ. J. R. H. 223. vel potius *Leu coium luteum, ſylveſt. Hieracifolium*. Pin. 20

*1. Hieracium quod Piloſella major re pens, minus hirſuta. Pin.

Bech. 2. pulmonaire ---- murorum, folio piloſiſſimo. Pi

3. ---- murorum, laciniatum minus piloſum. Pin.

*4. --- murorum laciniatum, minus piloſum, folio anguſtiore. Pin.

5. ---- fruticoſum, latifolium, hirſu tum. Pin.

6. ---- fruticoſum, latifolium, folii dentatis, glabrum. Pin.

7. ---- fruticoſum, anguſtifolium, ma- jus. Pin.

*8. --- minus Dioſcoridis. Tabern. Ic 181.

9. ---- Chondrillæ folio glabro, radi- ce ſucciſa, majus. Pin. 127.

------ Chondrillæ folio glabrum. Pin.

------ foliis Coronopi. Pin.

10. --- hirſutum, luteum. J. B.

11. --- Erucæ folium, hirſutum. J. B.

12. --- aſperum, majori flore in limi- tibus agrorum. J. B.

13. --- Echioides capitulis Cardui Be- nedicti. Pin.

14. --- minus Dentis Leonis folio ob- longo glabro. Pin.

15. Hie-

15. Hieracium foliis Cichorii ſylveſtris, odore Caſtorei. Bot. Monſp. *Senecio hirſutus.* Pin. amygdalas amaras olen herbe a l'epervier hister.

16. --- Dentis Leonis folio obtuſo majus. Pin.

17. --- Alpinum, latifolium hirſutum, incanum, flore magno. Pin.

----- Idem maculatum. Pin.

*1. Hippocaſtanum vulgare. J.R.H. maronier dinde

1. Hippuris qui Equiſetum fœtidum ſub aqua repens. Pin. 16.

*2. --- qui Equiſetum fragile majus ſubcinereum aquis immerſum. Hiſt. Ox. 3.621.

*3. --- qui Equiſetum, ſive Hippuris lacuſtris foliis manſu arenoſis Geſnero. Pluk. Phyt.

*4. --- qui Equiſetum, ſive Hippuris muſcoſus, cauliculis ſpinulis crebrius exaſperatis, ſub aquis repens, Sherardi Hiſt. Ox. 3. 621.

*5. --- foliis non articuloſis, longioribus & lucidis.

*6. --- breviſſimis & tenuiſſimis ſetis, polyſpermos.

*1. Hordeum diſtichum. J. B.

*2. --- diſtichum ſpicâ breviore & latiore granis confertis. Raji Hiſt.

*3. --- polyſtichum. J. B. *Eſpeaute.*

*4. --- hexaſtichum pulchrum. J. B.

*1. Horminum ſylveſtre Lavendulæ flore. Pin.

1. Hya-

1. Hyacinthus oblongo flore, cæruleus major. Pin.

------ Anglicus cinericeus. Eyſt.

*----- non ſcriptus, fl. candido. Dodon.

vuln. dp. ter 1. Hydrocotyle vulgaris. J. R. H. 328. *emelle d'eau*

1. Hydropiper. Fuchſ. Hiſt. 843. vid. *Perſicaria.*

* ---- Idem fl. albo.

hyperoon latiore folio somnifer somn. 1. Hyoſcyamus vulgaris vel niger. Pin. 169. *jusquiame - hennebane*

vuln. aper. 1. Hypericum vulgare. Pin. 279.

2. ---- Aſcyrum dictum, caule quadrangulo. J. B. *mille pertuis*

* ---- Idem variegatum.

*3. --- perforatum caule quadrangulo, fl. minore.

4. ---- Elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. J. B.

5. ---- minus erectum. Pin.

6. ---- minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. Pin.

*7. --- paluſtre ſupinum, tomentoſum. J. R. H.

8. ---- villoſum, erectum, caule rotundo. J. R. H.

Hypochæris. vid. *Hieracium.* nº. 7.

hyssopus off. caerulea seu spicata ...

1. Ja-

I.

1. Jacea nigra pratenſis, latifolia. Pin.
* --- Eadem floribus carneis. Hiſt. Ox.
* --- Eadem flore albo. J. R. H.
* --- coronata, purpureis floribus.
* --- coronata, carneis floribus.
* --- coronata, albis floribus.
* --- coronata, purpurea, floſculis te-
uiſſime diſſectis.
2. --- cum ſquamis cilii inſtar piloſis.
B.
3. --- latifolia capite hirſuto. Pin.
* --- latifolia diſſecta, capite hirſuto.
4. --- ſupina, incana, purpurea.
* --- ſupina, incana, coronata, pur-
urea.
5. --- vulg. laciniata, fl. purpureo. J.
. H.
* --- vulg. laciniata, fl. carneo.
* --- vulg. laciniata, fl. albo. J. R. H.
6. --- nemorenſis, quæ ſerratula vul-
). J. R. H.
----- Eadem fl. albo. J. R. H.
* --- nemorenſis altiſſima, Perſicæ fo-
). J. R. H.
1. Jacobæa vulg. laciniata. Pin. 131.
* --- altiſſima, Luſitanica, tenuiſſimè
ciniata. J. R. H.

*2. Ja-

*2. Jacobæa Senecionis folio, perenn
Raji Hist.

3. ---- latifolia palustris, sive aquatic
Raji Hist.

4. ---- Pannonica 1. Clus. Hist.

5. ---- quæ Senecio minor, latiore fo-
lio sive montana. Pin. 131. *que Mr. Tourn.
indique pour la Jacobæa Senecionis folio.* H. L.
Bl.

6. ---- foliis Ferulaceis, flore minor
J. R. H.

Foliis integris.

7. ---- palustris altissima, foliis serr-
tis. J. R. H.

8. ---- montana lanuginosa, angust-
folia non laciniata. Pin.

*1. Iberis latiore folio. Pin. vid. *Lepidium*

1. Imperatoria pratensis major. J. R. H.

1. Iris palustris lutea. Tabern. Icon.

* --- Eadem fol. glaucis brevibus. H.
L. Bat.

*2. --- fœtidissima, seu Xyris. J. R. H.

*3. -- hortensis, latifolia. Pin.

1. Isatis sylvestris vel angustifolia. Pin.

1. Juncago palustris & vulgaris. J. R. H.

1. Juncus lævis panicula non sparsâ. Pin.

2. ---- lævis panicula sparsâ major. Pin.

*3. --- acutus, panicula sparsâ. Pin.

*4. Jun

*4. Juncus foliatus, minimus. J. B.
*5. --- foliatus minor, floribus per ra-
os ſparſis.
6. ---- parvus cum pericarpiis rotun-
s. J. B. *quoad Iconem.*
*7. --- parvus cum pericarpiis rotundis.
B. *quoad deſcriptionem.*
8. ---- paluſtris humilior, erectus. J.
.. H.
*9. --- parvus repens, capſulis trian-
ularibus. *Gram. Junceum minimum, capſulis*
iangularibus. R. Hiſt. 1317.
* ---- parvus repens, capitulis folia-
:is. *Gram. Junceum minimum paniculis folia-*
is. H. Ox.
10. --- fol. articuloſis, floribus umbel-
tis. J. R. H.
------ Idem cum utriculis. J. R. H.
------ nemoroſus, folio articuloſo. J.
.. H.
*11. --- paluſtris, glaber, floribus al-
is. *Gramen Cyperoides paluſtre Leucanthe-*
um. R. Hiſt.

Juncus villoſus.

12. ---- nemoroſus latifolius, major.
R. H.
13. ---- villoſus capitulis Pſyllii. J.R.H.
*14. --- villoſus capitulis globoſis. *Gra-*
men

men hirsutum capitulis globosis. Hist. Ox.

*15. Juncus villosus, paniculâ compact
Gramen hirsutum, elatius, paniculâ Junce compactâ. Raji Synops.

*16. --- villosus, latifolius maximu
Gramen Luzulæ maximum. J. B. 2. lib. 1
pag. 493.

1. Juniperus vulgaris fruticosâ. Pin.

* --- fœmina, Volck. 234. florifera.

Kali spinosum foliis longioribus et angustioribus deterit

K.

Keiri officinarum. vid. *Leucoium.*

* --- officin. fol. canescentibus.

* --- fol. dentatis, siliquâ quadrangul
vid. *Hesperis.* Ketmia vesicaria vulgaris emoll

----- annua parvo flore. vid. *Turritis.*

Knawel, vid. *Alchimilla.* n°. 5.

Lacryma job. operit

L.

1. Lactuca sylvestris costâ spinosâ. Pin

* --- sylvestris costâ spinosâ. fo
minus laciniatis. *Lactuca sylv. non laciniata* Raji Synops. 70. lactuca romana longa dulcis laitue romaine

2. --- sylvestris angusto laciniato folio
Bot. Monsp. Lactuca sativa

3. --- perennis humilior, fl. cæruleo
J. R. H.

----- Eadem fl. albo. J. R. H.

La-

Lagopus, vid. Trifolium.

hiv. 1. Lamium vulg. album ſ. Archangelica albo. Park. ortie morte ou ortie blanche

* —— Idem fl. dilutè carneo.

2. —— annuum vulgare, rubrum. Hiſt. x.

* —— annuum, vulgare, album.

*3. —— rubrum minus foliis profundè inciſis. Raji.

4. —— folio caulem ambiente minus. n.

1. Lampſana. Dodon.

* —— maculis nigris aſperſa.

2. —— caule aphyllo. *Hieracium minus io ſubrotundo*. Pin.

1. Lapathum folio acuto criſpo. Pin.

2. —— folio acuto plano. Pin. aperit

3. patience —— aquaticum, folio cubitali. Pin.

*4. aperit —— hortenſe, folio oblongo ſ. ſecundum Dioſcorid. Pin. lap. folio rotundo alpinum J.B. rapontic patience de montagne fausse rhubarbe

5. —— minimum. Pin.

6. —— anthoxanthon. J.B.

7. —— folio minus acuto. Pin.

8. —— pulchrum Bononienſe ſinuatum. B. Lapathum folio acuto rubente sang de dragon astringent

1. Bardane Lappa major, Arctium Dioſcor. Pin. glouteron

* —— ſive Bardana major, fl. albo. iſt. Ox.

*2. —— major montana, capitulis tomentoſis, ſive Arctium Dioſcor. Pin.

Larix folio deciduo conifera, meleze purg.

*3. Lappa major, capite maximo, glabr a Hieres.

*1. Laſerpitium foliis latioribus lobat Mor. Umb. 29.

*1. Lathyrus ſativus, flore fructuque a bo. Pin. 343. gesse resol

* —— ſativus fl. purpureo. Pin.

2. —— ſylveſtris, major. Pin.

*3. —— anguſtifolius, ſiliquâ hirſut Pin.

4. —— arvenſis repens, tuberoſ Pin.

*5. —— anguſtiſſimo folio, ſemine ang loſo. H.R. Par.

Lavandula spic aspic ou nard cephal

6. —— ſylveſtris luteus, foliis Vici Pin. Laserpitium foliis latioribus lobati ou faux tarbith. purg.

Laureola. vid. Thymelæa. n°. 2.

Laurus cephal

resol *1. Lens vulgaris. Pin. 346.

*2. —— major. Pin.

1. Lentibularia vulgaris. Hiſt. Par.

*2. —— minor. *Millefolium paluſt galericulatum, minus fl. minore.* Pluk.

Lentiscus vulgaris erbin.

refrig 1. Lenticula paluſtris, vulgaris. Pin.

*2. —— paluſtris, major. Cat. Lug Bat. lentille deau ou de marais

3. —— aquatica triſulca. Pin.

antiscorbut 1. Lepidium latifolium. Pin. passe rage

* 2. antiscorbut Gramineo folio, ſive Iber J.R.H. *Iberis latiore folio. Pin.*

vulnera 1. Leucanthemum vulgare. J.R.H. grande paquette marguerite

leucant. canariense foliis chrysanthemi piretri sapor pyreth ... * Le

* Leucanthemum vulg. caule villis cane-
cente. J.R.H.
1. Leucoium luteum, vulgare. Pin. *giroflier ou violier jaune*
* ——— petræum lignoſius, folio rigido
aneſcente vulgatiſſimum. Pluk. Almag. Bot.
1. Lichen pyxidatus, major. J.R.H.
* ——— pyidatus major, rugoſus.
——— pyxidatus, minor. J.R.H.
* ——— pyxidatus, verticillatus proli-
er. *lichen petræus latifolius sive hepatica fontana hepatique*
——— pyxidatus oris coccineis & tu-
entibus. J.R.H.
——— pyxidatus acetabulorum oris fu-
is & tumentibus. J.R.H.
——— pyxidatus teres, acetabulis mi-
oribus repandis. J.R.H.
——— pyxidatus non ramoſus, acetabulis
mbriatis. J.R.H.
——— pyxidatus ramoſus acetabulis fim-
iatis. J.H.R.
——— pyxidatus prolifer. J.R.H.

Lichen pulmonarius.

2. ——— pyxidatus Endiviæ criſpæ folio,
olifer, acetabulorum oris criſpis. J. R.
.
3. ——— cinereus arboreus, marginibus
oſis, major. *Lichen cinereus, latifolius, a-
leatus umbilicis nigricantibus.* J.R.H.

•4. Lichen cinereus arboreus marginibu pilosis, minor.

5. —— cinereus, vulgatissimus cornu Damæ referens. *Muscus arboreus, ramosu* J.B.

* —— cinereus angustior, scutis i marginibus segmentorum.

6. —— pyxidatus Damæ cornu divis râ acetabulorum oris crispis. J.R.H.

* —— cinereus, latifolius ramosus. R.H.

—— cinereus, Lactucæ folio. Elen Bot.

*7. —— terrestris, angustior, ramosis mus fuscus.

Lich. pulmon. repens, Hepaticæ facie.

8. —— arboreus seu pulmonaria arbo rea. J.B.

9. —— pulmonarius, saxatilis, digit tus. *Lichen terrestris cinereus.* Raji Hi

10. Lichen pulmonarius, saxatilis max mus.

11. —— arboreus subtus nigricans. Hi Ox.

12. —— crustæ modo arboribus adn scens, tenuiter divisus. J.R.H.

13. —— nigricans omphalodes. J.R.H

14. L

14. Lichen Dioſcoridis & Plinii 2. co-
ɔre cinereo. Col. 1.

15 —— Dioſcor. & Plinii 2. colore fla-
eſcente. Col. 1.

16 ——- cruſtæ modo arboribus adna-
ens, pullus. J. R. H.

* 17 —— cruſtaceus, leproſus ſcutis nigri-
ıntibus

* 18. —— cruſtaceus, leproſus, ſcutis ci-
ereis.

* 19. —— cruſtaceus albeſcens, ſcutis fa-
naceis. Petiv.

20. ——- cruſtaceus, cinereus, ſcutis
rrugineis.

* 21. —— terreſt. leproſus cinereus, ſcutis
gricantibus.

22. —— pulmonarius ſaxatilis cinereo-
ſcus minimus. J. R. H.

23. ——- cruſtæ modo ſaxis adnaſcens,
rrucoſus, cinereus, & veluti deuſtus. J.
. H.

24. ——- cinereus, vulg. capillaceo fo-
ɔ, minor. J. R. H.

Lichenoides, vide Lichen.

1. Liguſtrum. J. B.

* ——— foliis è luteo variegatis. J.
. H.

* 1. Lilac Matthioli.

* ——— flore ſaturaté purpureo. J. R.

* Lilac flore albo. J.R.H.

Liliago. vid. *Lilium Convallium*.

1. Lilium convallium album. Pin. 304.

* —— —— anguſtifolium. Raji Sy-nopſ.

2. —— —— minus. Pin. 304. *Unifolium* Dod.

1. Limnopeuce. Cord. Hiſt. 150. *Equiſe-tum paluſtre brevioribus foliis, polyſpermo*: Pin.

1. Limodorum Auſtriacum. Cluſ. Pann.

1. Linagroſtis paniculâ ampliore, J. R. H.

2. —— paniculâ minore. J.R.H.

*3. —— ſpica ſingulari, alopecuroide. *Juncus capitulo lanuginoſo*: ſive *Schænolagure* C.B. Pin. 12.

1. Linaria vulgaris lutea, fl. majore. Pin.

* —— flore majore luteo pallido, albo. Pin. 212.

*2. —— erecta, fl. albido lineis purpu-reis ſtriato. *eſt Linaria erecta, fl. majore ... dore obſoletè cæruleo, rictu flaveſcente*. H.R. Par.

3. —— minor repens & inodora. H.R. Par. an *Linaria capillaceo folio odora*. Pin. *Eſt Linaria mont. odorata, flore cinericeo* Broſ. 67. *Linoſyris purpuro cærulea*. Corn. Enchir. Bot. Pariſ. 221.

* Li

* Linaria flore albo.
4. —— pumila ſupina, lutea. Pin.
* —— pumila ſupina, pallide lutea.
—— pumila ſupina, fl. albido. H. Pa-
iſ.
5. —— annua purpuro violacea calcari-
us longis fol. imis rotundioribus Bot.
Monſp.
6. —— pumila vulgatior, arvenſis. J.
.. H.
*. 7. —— hederaceo folio glabro, ſeu Cym-
alaria vulgaris. J. R. H.
8. —— ſegetum, nummulariæ folio vil-
ſo. J. R. H.
9. —— ſegetum, nummulariæ folio,
ırito & villoſo fl. luteo. J. R. H.
10. —— ſegetum, nummulariæ fol. au-
:o & villoſo, fl. cæruleo. J. R. H.
* Lingua cervina officinarum. Pin.
* —— —— multifido folio. Pin.
* —— —— Hemionitidis vulg. facie.
* 1. Linum ſativum. Pin.
2. —— ſylveſtre anguſtifolium, floribus
ute purpuraſcentibus vel carneis. Pin. & *naria capillaceo folio altera.* Pin. 213.
3. —— pratenſe, floſculis exiguis. Pin.
* 4. —— minimum. *Polygonum minimum*, ſi- *Millegrana minima.* Pin.
1. Lithoſpermum, majus, erectum. Pin.
* 2. —— arvenſe medium. *Alſine Myoſotis*,

E 4 ſive

ſive *Auricula muris*, Lob. Ic. 461.

3. ——— arvenſe minus. J.R.H.

——— arvenſe minus floribus luteis, ve luteo cæruleis. J.R.H.

4. ——- paluſtre minus. J.R.H. fl. cæ ruleo.

* ——— Idem fl. albo cæruleſcente.

* ——- Idem fl. rubello & cæruleo in ea dem planta.

hepatic. 1. Lonchitis aculeata major. J.R.H.

1. Lotus pratenſis, ſiliquoſus, luteu Pin. lotus pentaphyllos siliquosus villosus trefle hemor röthal resol

vuln. deters 2. ——- ſ. Melilotus pentaphyllos, m nor, glabra. Pin. lotier ou trefle sauvage jaune

3. ——- pentaphyllos, minor, glabra, fo longioribus & anguſtioribus Hort. Edinb

4. ——— pentaphyllos, fl. majore, lut ſplendente. Pin.

Lunaria major siliqua rotundiore Lunaire bulbonat medaille vulner aper

* 5. —— pentaphyllos major, hirſutie ca dicans. Pin. a *Fontainebleau*?

6. —— corniculata, hirſuta, min J.B.

Lupinus sativus flore albo resol

1. Lupulus fœmina. Pin. houblon

hepatiq mas. Lin.

febrif. 1. Luteola herba ſalicis folio. Pin. gaude

Lychnoides. vid. *Lychnis*.

vuln. deter 1. Lychnis ſylveſt. quæ ſaponaria vulg J.R.H. savoniere

* ——— Eadem fl. albo.

* ——- Eadem fl. pleno. J.R.H.

2. L

2. Lychnis montana viſcoſa, alba, latifolia. Pin.

3. ——— ſylveſtris alba, ſimplex. Pin.

* ——— ſylv. alba ſimplex, ſemine vidua.

4. ——— viſcoſa flore muſcoſo minor. H. L. Par.

* ——— Eadem ſemine vidua.

5. ——— viſcoſa. fl. muſcoſo. Pin. *Al. Hermitage S. Louis.*

6. ——— ſylveſtris, quæ Behem album vulgo. Pin.

* ——— Ead. fol. anguſtioribus & acutioribus. Pin.

* ——— Eadem fl. pleno. J. R. H.

*7. ——— ſylv. quæ Behem album vulgo, fol. hirſutis. Hort. Edinb.

8. ——— pratenſis, fl. laciniato ſimplici. H. Ox.

——— prat. fl. laciniato ſimplici ſuave-rubente. J. R. H.

* ——— prat. fl. laciniato, ſimplici albo. J. R. H.

* ——— prat. fl. laciniato pleno, amplo flore purpureo. J. R. H.

9. ——— ſegetum major. Pin.

* ——— ſegetum major, fl. dilutiore.

10. ——— ſylv. latifolia, caliculis turgidis ſtriatis. Pin.

——— Eadem anguſtifolia. Pin.

*11. — Lychnis hirſuta annua, fl. minore carneo. H. Ox.

* Lychnis eadem, fl. albo.

12. —— annua minima, fl. carneo, l[...]neis purpureis diſtincto. J.R.H.

13. —— ſegetum rubra, foliis perfolia[...]tæ. Pin.

* —— ſegetum, foliis perfoliatæ, f[...] albo. Joncq. Hort.

* 14. —— ſaxatilis, pumila, Juniperi fo[...]lio. J.R.H.

* 15. —— ſylveſt. viſcoſa, rubra, anguſti[...]folia. C. B. Pin.

1. Lycoperdon vulgare. J. R. H.

* 2. —— medium, cortice lacero. J. R.H.

* 3. —— niveum ſphæricum ſuperfici[...] in areolas adamantis inſtar diſſectas diſtri[...]buta. J.R.H.

* 4. —— è flavo vireſcens, ſquamatum.

* 5. —— pediculo longiori tumido donatum. J.R.H.

* 6. —— excipuli Chymici formâ. J. R.H.

7. —— minus & multiplex, ſphæricum. J.R.H.

8. —— minus & multiplex, ovatum. J.R.H.

9. —— Pariſienſe minimum pediculo donatum. J.R.H.

* 10. —— minus pediculo donatum.

11. Ly-

11. Lycoperdou veſicarium, ſtellatum. J.
R. H.

1. Lycopodium vulgare. *Muſcus terreſtris,*
lavatus. Pin.

* 2. —— Cupreſſi foliis. *Muſcus clavatus*
oliis Cupreſſi. Pin.

* 3. —— paluſtre, repens, clava ſin-
gulari.

1. Lycopus paluſtris, glaber. J. R. H.

—— paluſt. villoſus. J. R. H.

1. Lyſimachia lutea, major, quæ Dio-
ſcoridis. Pin. 245.

—— Eadem foliis ternis. Pin.

* —— Eadem foliis quaternis. Pin.

* —— Eadem foliis quinis. Pin.

2. —— humifuſa, fol. ſubrotundo acu-
minato, fl. luteo. J. R. H.

3. —— humifuſa fol. rotundiore, fl. lu-
eo. J. R. H.

4. —— Lyſimachia humifuſa folio rotun-
liore, flore purpuraſcente. J. R. H.

M.

1. MAlva vulg. fl. majore, fol. ſinuato.
J. B. *Malva ſylv. folio ſinuato.*
Pin.

* —— ſylveſt. fol. ſinuato, fl. albo. H.
Edinb.

2. —— vulg. fl. minore, fol. rotundo. J, B.

*1. Ma-

*1. Malus sylvest. fructu valdè acerb[o] J.R.H. malus sativa fructu subrotundo a viridi pallescente acido dulci pommier de renette. Bech.

mandragora fructu rotundo somnif *2. —— acido fructu, sylvestris. H.[L.] Par. *Mala sylvestria, rubra.* Pin.

1. Marrubiastrum vulgare. J R.H.

hister. 1. Marrubium album vulgare, Pin.

matricaria. histeri. —— album villosum. Pin.

mays granis aureis blé de turquie resol verd. *1. Medica major, erectior, florib[us] purpurascentibus. J.B. *Medica legitima.* Clu[s.] Hist. Luserne

* —— Eadem, floribus violaceis. J.[B.]

* —— Eadem, floribus ex violaceo [&] luteo mixtis. J.R.H.

* —— Eadem, flore albo cærulescen[-]te.

*2. —— orbiculata. J.B.

3. —— Arabica. Cam.

4. —— polycarpos, folio obtuso crena[-]to. J.R.H.

*5. —— hirsutâ echinis rigidioribus. J.B.

6. —— echinata, minima. J.B.

1. Medicago sylvest. floribus croceis. J.[B.] *Medica sylvest. floribus croceis.* J.B.

—— Ead. floribus è luteo pallescen[-]tibus.

—— Ead. floribus è cæruleo virescen[-]tibus.

—— Eadem, floribus, partim luteis[,] partim violaceis.

1. Me-

1. Melampyrum purpuraſcente comâ.
n.
2. —— luteum latifolium. Pin.
——— luteum, latifolium, fl. albo, la-
o inferiori duabus maculis luteis diſtincto.
. Pariſ.
3. —— criſtatum fl. albo & purpureo.
B.
1. Melilotus officin. Germaniæ. Pin.
—— Eadem, fl. albo. Pin.
2. —— ſiliquis longioribus acutis. J.
. H.
——— Ead. fl. albo.
3. —— capſulis reni ſimilibus in capi-
ılum congeſtis. J. R. H.
*1. Meliſſa hortenſis. Pin.
1. Meliſſophyllon verum. Fuchſ. Hiſt.
98. *Meliſſa humilis, latifolia, maximo flore*
urpuraſcente. J. R. H.
——— Idem fl. albo.
1. Mentha ſylveſtris, rotundiore folio.
Pin.
* —— Eadem purpureo flore. Bot.
Monſp.
2. —— ſylveſtris longiore folio. Pin.
*3. —— anguſtifolia ſpicata. Pin. *a Liſy.*
*4. —— ſylv. longioribus nigrioribus &
ninus incanis foliis. C. Pin. 227.

Pu-

Pulegii species.

4. Mentha rotundifolia, paluſtris, ſ. aquatica, major. Pin. beaume aquatique hister.

5. cephal —— arvenſis verticillata, hirſuta J.B. pouliot thim

*. —— Eadem fl. albo.

6. cephal —— aquatica, ſeu Pulegium vulgare. J.R.H. pouliot

* —— aquat. ſ. Pulegium vulg. fl. caneo.

* —— Eadem fl. albo. J.R.H.

Menthaſtrum.

antiscorbut 1. Menyanthes paluſtre, latifolium & triphyllum. J. R. H. trefle deau

———— paluſtre anguſtifolium & triphyllum. J.R.H.

emoll 1. Mercurialis teſticulata ſive mas Dioſcoridis & Plinii. Pin. foirolle

emolle —— ſpicata ſ. fœmina, Dioſcor. & Plinii. Pin.

2. —— montana teſticulata. Pin.

———— montana ſpicata. Pin.

astring 1. Meſpilus Germanica fol. Laurino non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris. Pin. neflier

2. astringent —— Apii folio ſylveſt. ſpinoſa, ſ. Oxyacantha. Pin. epine blanche, Aubepin

* 3. —— ſylveſt. fol. trifidis ſplendentibus. mespilus aculeatus amygdali folio buisson ardent astrin

4. —— fol. rotundiori, fr. nigro ſubdulci. J.R.H. Amelanchier

* 1. Mi-

meum foliis anethi; hister.

*. I. Milium ſemine luteo. Pin. 26. millet, mil
* —— Idem ſemine albo. Pin.
* —— Idem ſemine ſubluteo, locuſtis
ſphœniceis.
* —— Idem ſemine nigro. Pin.
I. Millefolium vulg. album. Pin.
* —— vulgare, purpureum, minus.
Pin. herbe au charpentier

Les plantes ſuivantes n'ont rien de commun avec celles de ce genre.

——— aquaticum cornutum. Pin. vid. *Ranunculus*. n°. 21.
* —— aquaticum ſ. viola aquatica caule nudo. Pin. vid. *Myriophyllum*.
* —— aquaticum umbellatum, Coriandri folio. Pin. 141.
I. Morſus Ranæ fol. circinnatis, floribus albis. Comment. A. R. Scient.
I. Moſchatellina foliis Fumariæ bulboſæ. J. B. herbe musquee
I. Muſcari arvenſe, latifolium, purpuraſcens. J. R. H. ail de chien racines brulantes caustiques font mourir les chiens
2. —— arvenſe, Juncifolium, cæruleum, minus. J. R. H.

moldavica melisse de moldavie. hister. molluca melisse de moluque. histe. molle vel lentiscus peru poivre d'amerique. momordica pomme de merveille, vul. de ... morus meurier. ...

Mu-

Muſcus apocarpos.

*1. Muſcus trichoides, acaulos, mino latifolius. Muſ. Petiv. 86.

*2. —— trichoides, minor, acaulos, c pillaceis foliis. Muſ. Petiv. 87.

3. —— ſquamoſus ſaxatilis, tortuoſus nodoſus. J. R. H.

* —— apocarpos hirſutus ſaxis adn ſcens, capitulis obſcure rubris. 10. Raji Hiſ 3. 40.

*4. —— apocarpos, arboribus adnaſce polyſpermos. 7. Raji Hiſt. 3. 39.

*5. —— apocarpos, arboreus, ramoſus Raji Hiſt. 3. 40.

*6. —— apocarpos, arboribus adnaſce minor. 9. Raji Hiſt. 3. 40.

8. —— Linariæ folio, major & criſpu J. R. H.

9. —— ſquamoſus fol. acutiſſimis in aqu naſcens. J. R. H.

A Vrnes droites, rondes, ou Ovales.

*10. —- capillaceus medius capitulis gl boſis. J. R. H.

11. —— parvus ſtellaris. Pin.

*12. —- capillaceus minimus, capitulis py riformibus turgidis. J. R. H.

*13. —- capillaceus, minimus muralis ſtel latus. J. R. H.

14. Mu

14. Muſcus capillaceus, omnium minimus. R. H.
*15. --- capillaris, humilis, gramini-lius, minor, capitulis oblongis erectis. 17. aji Hiſt. 3.
*16. --- capillaceus, minimus calyptrâ ngiſſimâ erectâ. J. R. H.
*17. --- coronatus minimus capillaceis liis, capitulis oblongis. Hiſt. Ox. 3.
*18. --- capillaris ſurculis erectis, fol. blongis, tenuiſſimis acutis cinctis. Raji Sy-pſ. 29.
*19. --- capill. capſulis pyriformib. e-ctis, in acumen deſinentibus.

a Coiffes velues.

*19. --- capillaceus, minimus, acaulos, lyptra ſtriatâ. J. R. H.
*20. --- qui Adiantum, aureum, mi-mum, pediculis brevibus fol. capillaceis. luſ. Petiv. 25.
21. ---- capillaceus, minor, calyptrâ mentoſa. J. R. H.
*22. --- Muſcus qui Adiantum pileolo lloſo, medium Raji.
*23. --- ramoſus, erectus, calyptrâ villoſa.
24. ---- qui Polytricum aureum majus. n.
* ----- coronatus humilis, rigidior &

humilior, capitulis longis, acutis ſeſſilib
erectis. Hiſt. Ox.

* Muſcus capillaceus ſtellatus, prolif
J. R. H.

a Vrnes inclineès.

25. ---- capillaceus ſericeus, Coridis
cie. J. R. H.

26. ---- capillaceus minimus, plumoſi
elegans. J. R. H.

27. ---- capillaceus major, pediculo
capitulo tenuioribus. J. R. H.

a Vrnes courbes & oblongues,

28. ---- capillaceus minor, capitu
longiori falcato. J. R. H.

29. ---- capillaceus, ramoſus minc
capitulo anguſtiſſimo. J. R. H.

*30 --- capillaris minor, capitulis er
ctis, vulgatiſſimus. Raji Synopſ. 28.

* ----- Idem foliis in pilum deſine
tibus.

*31. capillaris tectorum, denſis ceſpitib
capitulis oblongis, fol. in pilum oblongu
deſinentib. Raji Syn.

*32. --- capillaris, corniculis longiſ
mis incurvis. Raji Synopſ. 29.

à Urnes renverſeés.

*33. Muſcus capillaris, lanuginoſus mini-
ıs. J. R. H.
*34. --- argenteus, capitulis reflexis.
aji Synopſ.
*35. --- capillaceus minimus capitulo
ıtante, pediculo purpureo. J. R. H.
* 36. --- capillaceus major, capitulis
aſſioribus cylindraceis nutantibus. J. R. H.
* ----- capillaceus, major, ſtellatus.
. R. H.
*37. --- ſtellatus, latifolius, capitulo
ıgulari. *a Jouy.*
*38. --- denticulatus lucens fluviatilis,
ıximus ad ramulorum apices Adianti capi-
lis ornatus. Pluk. Almag.
*39. --- capillaceus, paluſt. flagellis lon-
ɔrib. bifurcatis. J. R. H.
40. ---- capillaceus, fol. rotundiore,
pſulâ oblongâ, incurvâ. J. R. H
*41. --- capillaceus, major, & elatior,
pitulis cylindraceis obtuſis nutantibus J.
. H.
42. ---- Polygoni folio. J. R. H.
43. ---- paluſt. fol. ſubrotundis. J. R. H.

Mouſſes ecailleuſes.

 *44. Mu-

*44. Muſcus, ſquamoſus minor, Myoſ
roides, capitulis incurvis.

*45. --- denticulatus minor, ſericeu
noſtras, capitulis Adianti. H. Ox.

*46. --- terreſtris, arborum ſtipitib
adnaſcens, major & erectior. Raji Hiſt. 3.4

47. ---- ſquamoſus, ramoſus erectus A
lopecuroides. J. R. H.

48. ---- ſquâmoſus dendroides, repe
J. R. H.

*49. --- terreſtris ſurculis Kali aut Ill
cebræ æmulis, fol. ſubrotundis ſquamatim i
cumbentibus. Raji Synopſ. 2. 37.

*50. --- ſquamoſus viticulis longiorib
glabris. J. R. H.

*51. --- aquaticus pileis acutis. Muſ. P
tiv. 74.

*52. --- trichoides, paluſtris, capitu
erectis, fol. reflexis. Raji Syn. 338.

*53. ---

54. ---- ſquamoſus major, ſive vulg
ris. J. R. H.

55. ---- ſquamoſus major, fol. ang
ſtioribus acutiſſimis. J. R. H.

56. ---- ſquamoſus ramoſus tenuior, c
pitulis incurvis. J. R. H.

57. ---- ſquamoſus ramoſus craſſior, c
pitulis incurvis. J. R. H.

*58. --- ſquamoſus, Cupreſſiformis.
R. H. 554.

59. M

59. Muſcus muralis repens, ſericeus fol. ›lendentib. Muſ. Petiv. 83.

*60. --- paluſtris, aureus, rigidiuſcul. ıpitulis incurvis.

*61. --- ramoſus paluſt. major, fol. embranaceis, acutis. Raji Synops.

62. ---- ſquamoſus erectus minimus. R. H.

*63. --- trichoides parvus, foliis Muſci ılgaris, capitulis longis acutis. Raji Synopſ.

*64. --- terreſtris, omnium minimus ıpitulis majuſculis, oblongis erectis. Raji ynopſ.

65. ---- capillaceus, denſiſſimus lanuinoſus. J. R. H.

*66. --- capillaris, lanugine caneſcens, ediculis tenuibus oblongis, capitulis in ıucrones longos recta ſurſum exporrectis. aji Syn.

67. ---- ſquamoſus paluſt. candicans, ıolliſſimus. J. R. H.

* ----- Idem, purpuraſcens, molliſſiıus.

68. ---- fluitans, foliis & flagellis lonis tenuibuſque. Raji Synopſ.

*69. --- erectus foliis reflexis. Raji. Syopſ.

70. ---- ſquamoſus Linariæ folio minor : criſpus Capitulis incurvis. J. R. H.

Mousses Tressees.

71. Muscus squamosus elatior, ramosus caulibus compressis. J. R. H.

72. ---- terrest. aureus, minor, clavisque brevioribus. Hist. Ox.

*73. --- squamosus denticulatus splendens, arboreus. J. R. H.

Muscus Taxiformis.

*75. --- pennatus, omnium minimus. J. R. H.

*76. --- pennatus capitulis Adianti. Raj. Syn.

77. ---- pennatus denticulatus, minor. *Muscus squamosus non ramosus major & minor capitulis incurvis.* J. R. H.

Muscus Filicinus.

78. ---- Filicinus, major. Pin. 360.

79. ---- Filicinus, minor. Pin.

80. ---- vulgaris pennatus major. Pin.

81. ---- vulgaris pennatus, minor. Pin.

82. ---- palustris Absinthii folio, insipidus. J. R. H.

*83. --- squamosus viticulis longissimis Abietinis. J. R. H.

*84. Mu-

*84. Muſcus paluſtris Abieti formis, foliis eflexis.

*85. --- terreſtris repens, ſubflavus foiolis criſpis minoribus ramuliſque denſius confertis. Hiſt. Ox.

Muſcus clavatus.

86. ---- terreſtris, clavatus. Pin.

*87. --- clavatus foliis Cupreſſi. Pin.

1. Muſcoides, qui Muſcus capillaceus miimus capitulo, minimo, pulverulento. J. R. H.

1. Myoſotis arvenſis, hirſuta, fl. majore. . R. H.

* ----- arvenſis Polygoni folio. J. R. H. *Perenn.*

2. ----- hirſuta, altera, viſcoſa. J. R. H. *nn.*

3. ----- arvenſis, hirſuta, parvo flore. . R. H. *Perenn.*

4. ----- hirſuta, minor. J. R. H.

1. Myagrum vel potius Camelina. vid. *Alyſſon*. n°. 4. *&* *Rapiſtrum*. n°. 2.

1. Myoſuros. J. B. vid. *Ranunculus*. n°. 4.

1. Myriophyllum aquaticum, minus. Cluſ. Hiſt. *Potamogeton floſculis ad foliorum nodos.* J. R. H.

2 ----- aquaticum, majus. *Potamogeton foliis pinnatis.* J. R. H.

1. Myrrhis annua, femine ftriato lævi Mor. Umb.

N.

Napus fylveftris. Pin. 95.
* --- Sativa, radice albâ. Pin.
* --- Sativa, radice nigrâ. Pin.
*1. Narciffo-leucoium.
*1. Narciffus fylv. pallidus calice luteo Pin.
1. Nafturtium fylveft. capfulis criftatis J. R. H.
2. --- petræum, foliis Burfæ paftori Pin.
*3. -- pumilum, vernum. Pin.
4. --- pumilum, fupinum, vernum. Bot. Monfp.
1. Nidus avis, Lugd. 1073.
1. Nigella arvenfis, cornuta. Pin.
1. Niffolia vulgaris. J R. H.
1. Noftoc cinifionum. Hift. Parif.
*2. --- quod Lichen terreftris minimu fufcus. Hift. Raji.
*3. --- nigricans, arboribus adnafcens
* ---- candicans, arboribus adnafcens
*4. --- flavicans arboribus adnafcens.
*5 --- granulofus coccineus, arboribu adnafcens.
Nummularia, vid. *Lyfimachia.*

*1. Nu

*1. Nux juglans ſive regia vulgaris. Pin.
*2. --- juglans, fructu perduro. J.R.H.
*3. --- juglans, fructu tenero & fragiputamine. J. R. H.
*4. --- juglans, fructu maximo. Pin.
1. Nymphæa alba major. Pin.
2. --- lutea major. Pin.
1. Nymphoides aquis innatans. J. R. H.
* ---- aquis innatans, fol. maculatis.

O.

1. Oenanthe aquatica. Pin. 162.
2. ---- ſive Filipendula aquatica, [al]tera. J. B.
*. 3. --- Apii folio. Pin.
1. Onobrychis foliis Viciæ. fr. echinato, [m]ajor. Pin. 350.
1. Ophioglossum vulgatum. Pin.
1. Ophris bifolia Pin.
* ---- trifolia. Pin.
*2. --- bifolia, bulboſa. Pin.
1. Opulus. Ruell. 281.

Orchis teſticulata abſque calcare.

1. Orchis Fucum referens, colore rubigioſo. Pin. 83.
*2. --- Eadem, flore ſubvirente. Pin.
3. ----- Fucum referens, major, foliolis

liolis ſuperioribus candidis & purpuraſcenti-
bus. Pin.

*4. Orchis ſerotina.

*5. --- Muſcæ corpus referens, mino[r]
& galea & alis herbidis. Pin.

*6. --- flore nudi hominis effigiem re[-]
præſentans, fæmina. Pin.

7. ---- ſpiralis, alba, odorata. J.B.

*8. --- ſpiralis, alba, odorata, longo
anguſtoque folio.

Orchis teſticulata, cum calcare.

*9. --- latifolia, hiante cucullo, ma-
jor. J.R.H. Item *Orchis galea & alis fere ci-
nereis.* J. B. 2. 755.

10. --- flore Simiam referens. Pin. fl.
purpureo.

* ----- Eadem, fl. dilute carneo.

* ----- Eadem fl. albo.

11. ---- militaris, major. J. R. H.

* ----- militaris, minor. J. R. H.

*12. --- militaris, pratenſis, humilior.
J. R. H.

13. ---- barbata, fœtida. J. B.

14. ---- odore Hirci minor. Pin.

* ----- Eadem fl. ſubviridi.

15. ---- morio fæmina. Pin.

* ----- morio fæmina, fl. roſeo. H. R.
Par.

* Or[chis]

* Orchis eadem fl. niveo & verſicolore.
. R. Par.
* ----- Eadem, fl. carneo. Raji Hiſt.
* ----- Ead. teſticulis ternis.
* ----- morio fæmina, parva.
16. ---- morio fæmina, procerior, ma-
ri flore. Hiſt. Pariſ. *Orchis anguſtifolia* Pin.
re intenſe purpureo.
* ----- Eadem flore dilutè purpureo.
* ----- Eadem ex albo & purpureo va-
gato.
* ----- Eadem fl. albo.
* ----- Eadem fl. albo cum alis varie-
tis.
* 17. --- teſticulata, anguſto folio ſero-
na.
* 18. cordialem --- morio mas, foliis maculatis.
n. satyrion
* ----- Ead. fl. roſeo.
* ----- Ead. fol. non maculatis. *Orchis*
ijor tota purpurea non maculata. J. B.
19. ---- alba bifolia, minor, calcari ob-
ngo. Pin.
* ----- trifolia major, & minor. Pin.
20. ---- militaris, montana, ſpica ru-
nte conglomerata. J. R. H. *a Fontainebleau.*

Orchis palmata.

21. ---- palmata, pratenſis, latifolia,
lon-

longis calcaribus. Pin. 85. Item *Orchis pal*
mata palustris latifolia. Ejusd.

* Orchis eadem fl. carneo. H. R. Monsp

* ----- Eadem fl. albo. H. R. Monsp

* ----- Ead. fl. suaverubente cum litu
ris purpureis.

22. ---- palmata, pratensis maculata
Pin.

* ----- Ead. fl. variegato. Pin.

* ----- Eadem, fl. albo. Pin.

23. ---- palmata minor, calcaribus ob
longis. Pin.

* ----- Eadem flore dilutiori.

24. ---- palmata, Batrachites. Pin

Mr. Tournefort indique les suivant.

? ----- palmata, palust. maculata. Pin

? ----- palmata, montana, maculata
Pin.

? ----- palmata, palust. tota rubra
Pin.

? ----- palmata, palust. latifolia. Pin
vid. no. 21.

? ----- palmata palust. tertia. Pin. *E*
ad. fl. suaverubente cum lituris purpureis. H
Paris.

persil de montagne

aperit 1. Oreoselinum Apii folio, majus. J. R. H.

2. aperit ----- Apii folio, minus. J. R. H.

cephal. 1. Origanum vulg. spontaneum. J. B.

* ----- Idem floribus ex candido ru
bentibus. origa. creticum latifol. tomentosum seu Dictamnus creticus aperit

* Ori

* Origanum floribus candidis.

1. Ornithogalum luteum. Pin. 71.

*2. ---- umbellatum medium, angustifolium. Pin.

3. ----- angustifolium, majus floribus x albo virescentibus. Pin.

4. ------ autumnale minus floribus cæruleis. J. R. H.

* ----- Idem flore dilutè purpureo. J. R. H.

* ----- Idem fl. albo.

1. Ornithopodium radice tuberculis nodoa. Pin. 350.

1. Orobanche major, Caryophyllum olens. Pin.

2. ----- major fœtidissima sylvæ Bononiensis. J. R. H. *Orobanche* Matth. Dod. &c.

*2. ---- majore flore. Pin. *Subcæruleo flore, sive ii.* Clus. Hist. 271.

4. ----- ramosa, floribus purpurascentibus. Pin.

* ----- ramosa, floribus cæruleis. Pin.

* ----- ramosa, floribus subalbidis. Pin.

*1. Orobanchoides nostras, fl. oblongo flavescente. Comment. A. R. Scient.

1. Orobus sylvaticus, fol. oblongis glabris. J. R. H. 393.

* ----- Idem fol. latis oblongis glabris.

* ----- Sylvaticus longis angustisque glabris foliis. *Forest de S. Germain.*

1. Os-

1. Oſmunda vulg. & paluſtris. J. R. H.

2. ---- foliis lunatis. J. R. H.

1. Oxys flore albo. J. R. H.

P.

1. Panicum vulg. ſpicâ ſimplici & aſper J. R. H. 515.

*2. --- vulg. ſpicâ ſimplici veſtibus non adhærente.

3. ---- vulg. ſpicâ ſimplici & mollior J. R. H.

*4. --- ſpica anguſta & interrupta. *a S Cir.*

5. ---- vulg. ſpicâ multiplici, aſperiu ſcula. J. R. H.

* ---- Idem ſpicâ multiplici longis ari ſtis circumvallatâ. J. R. H.

*6. --- Serotinum, arvenſe, ſpica pyra midata. J. R. H.

1. Papaver erraticum majus Rhœas Dio ſcoridi, Theophraſto, Plinio. Pin. 171. *Pa paver erraticum majus ſ. Rhœas fl. carneo.* H Edinb.

* ---- Idem flore albo. B. Pin.

*2 --- erraticum majus floribus minori bus abſque maculis.

3. ---- erraticum, capitulo longiſſimo glabro. J. R. H.

4. ---- erraticum, capite oblongo, hi ſpido. J. R. H. 5. Pa

5. Papaver erraticum, capite longiore spido. J. R. H.
1. Parietaria officinarum, & Dioſcorid. in.
2. ---- minor, Ocyimi folio. Pin.
1. Parnaſſia paluſt. & vulgaris. J. R. H.
*1. Paronychia paluſt. Serpillifolia. *Polynum parvum, fl. albo, verticillato.* J. B.
Paſſerina. vid. *Thymelæa.*
1. Paſtinaca ſylveſtris, latifolia. Pin.
1. Pedicularis pratenſis lutea, vel criſta lli. Pin.
2. ---- pratenſis, lutea, erectior, califloris hirſuto. J. R. H.
3. ---- ſerotina, purpuraſcente flore. R. H.
* ---- Eadem flore albo.
4. ---- pratenſis purpurea. Pin.
* ---- pratenſis, floribus carneis. Pin.
* ---- pratenſis, floribus candidis. Pin.
5. ---- paluſtris rubra elatior. Raji Hiſt.
* ---- paluſt. alba, elatior. Raji Synopſ. 162.
1. Pentaphylloides ſupinum. J. B. 2. 398.
2. ---- argenteum alatum, ſeu Potenla. J. R. H.
* ---- viride alatum, ſeu Potentilla.
3. ---- paluſtre, rubrum. J. R. H.
Peplis. vid. *Tithymalus.*
1. Periclymenum vid. *Caprifolium.*
1. Per-

1. Perſicaria mitis, non maculoſa. Pin. purpuraſcente.

* ---- Eadem fl. roſeo.

------ mitis, maculoſa. Pin.

------ mitis, floribus candidis. Pin.

------ mitis cum maculis ferrum Equ num referentibus. J. R. H.

*2. --- folio ſubtus incano. J. R. H.

* ---- Eadem fl. candido.

* ---- folio ſubrotundo, obtuſo, ſu tus incano.

3. --- anguſtifolia. Pin.

4. ---- minor. Pin.

5. ---- Perſicaria major, Lapathi folii calice floris purpureo. J. R. H.

* ---- Eadem fl. albo.

6. ---- Salicis folio, Potamogeton an guſtifolium dicta. Raji Hiſt.

7. ---- urens ſeu Hydropiper. Pin.

1. Pervinca vulg. anguſtifolia, fl. cærule J. R. H.

*2. ---- vulg. latifolia, fl. cæruleo. R. H.

Pes Anſerinus, vid. *Chenopodium*.

*1. Petalites major & vulgaris. Pin.

1. Peucedanum Gallicum, rarioribus brevioribus foliis. H. R. Par.

* ---- Idem fl. purpuraſcente. J. R. H

1. Phalangium parvo fl. non ramoſum. Pi

2. ---- parvo flore, ramoſum. Pin.

* Ph

* Phalaris major, ſemine albo. Pin. 28.
* Phaſeolus vulgaris. Lob. Icon. 59.
* 2. --- hortenſis, minor. J. R. H. 413.
1. Phellandrium. Dod. Pempt. 591.
Piloſella. vid. *Dens Leonis*. n°. 7.
* 1. Pilularia paluſtris, Juncifolia. *Grami-*
olia paluſtris, repens, vaſculis granorum Pi-
is æmulis. Raji Synopſ. 281.
* 1. Pimpinella ſanguiſorba, major. Pin.
2. ----- ſanguiſorba minor, hirſuta. Pin.
* ----- ſanguiſorba, minor, lævis. Pin.
1. Pinguicula Geſneri. J. B.
* 1. Pinus ſylv. vulg. Genevenſis. J. B.
2. ----- maritima, altera Matthioli. Pin.
* 1. Piſum arvenſe. Pin.
Plantaginella.
Plantago latifolia, ſinuata. Pin. 189.
* ----- quinquenervia latifolia, thyrſo
ioſo. Ambroſ. Phytol. 430. fig.
* 2. --- paluſtris, lanceolata, trinervia.
3. ----- latifolia, incana. Pin.
* ----- latifolia incana, ſpicâ albâ.
rt. Edinb.
4. ----- anguſtifolia, major. Pin.
* ----- anguſtifolia major, ſpica mul-
lici.
* ----- anguſtifolia, minor. Tabern.
n. 732.
. ----- paluſtris, gramineo folio mo-
thos, Pariſienſis. J. R. H.

1. Po-

polium montanum cephal
1. Polium Lavendulæ folio. Pin.
1. Polygala vulgaris, floribus cærule
Pin.
* ------ purpurea Tabern. Icon. 831.
* ------ vulg. fl. pallidè cæruleo & a
bo mixto.
------- alba Taber. Icon.
* ------ flore carneo. H. R. Par.
*2. --- minor vulg. fl. cæruleo.
* ------ Ead. fl. pallide cæruleo & al
mixto.
* ------ minor vulg. fl. purpureo. *On*
brychis. 2. rubro flore. Lugd. 490.
* ----- minor, vulg. fl. carneo.
* ----- minor, vulg. fl. albo. *Onobr*
chis. 2. flore albo. Lugd. 490.
*3. --- Buxi minoris folio, fl. cærule
* ----- Eadem fl. roſeo.
*4. --- minor, foliis circa radicem r
tundiuſculis floribus dilutæ cæruleis Fl
quaſimodogen. 40. *Eadem floribus purpur*
ſcentibus albis.
1. Polygonatum latifolium vulgare. P
* ----- Idem caulibus rubentibus. H.
Bat. sceau de salomon
2. ----- latifolium, maximum. Pin. 3
*3. --- latifolium, Ellebori albi foli
Hiſt. Ox.
4. ----- latifolium, fl. majore odoro. P
------- latifolium, fl. duplici odo
H. R. Par.
1. Pol

1. Polygonifolia vulgaris. *Polygoni vel Li-folia per terram sparsa, fl. scorpioides.* J. B.

1. Polygonum, latifolium, fl. candido. n. renouee trainasse

* ---- Idem flore rubente. Pin.

*2. --- brevi angustoque folio. Pin. *Po-gonum* 2. Tab. Icon. 833. *prioris varietas.*

3. ---- oblongo angusto folio. Pin. 3. ab. Icon.

Les suivant n'en ont pas le caractére.

* ---- minimum S. Millegrana mini-a. Pin. vid. *Chamælinum.*

----- muscosum, minimum. Bocc. vid. *dum.* no. 10.

* ---- parvum fl. albo verticillato. J. B. d. *Paronychia.*

----- Polygoni vel Linifolia. vid. *Po-gonifolia.*

1. Polypodium vulgare. Pin. [handwritten]

2. ---- angustifolium, folio vario. J. R. H.

1. Populago fl. majore. J. R. H.

----- flore minore. J. R. H.

1. Populus nigra. Pin. 429. [handwritten]

2. ---- tremula. Pin.

3. ---- alba, majoribus foliis. Pin. [handwritten]

4. ---- alba, minoribus foliis. Lob. I-on.

pourpier commune [handwritten]

*1. Portulaca angustifolia S. *sylvestr* Pin. portulaca latifolia sive sativa, vefrig.

1. Potamogeton rotundifolium. Pin.

2. ---- perfoliatum. Raji Synopſ. *fol latis ſplendentibus*. Pin.

*3. --- Alpinum, Plantaginis folio. R. H. *aquis immerſum fol. pellucido, lato, o longo, acuto*. Raji Synopſ. 61.

4. ---- longo ſerrato folio. Pin.

5. ---- ramoſum anguſtifolium. Pi fol. binis.

6. ---- fol. anguſtis & undulatis. J. R. H

*7. --- caule compreſſo, folio Grami nis canini. Raji Hiſt. 189.

*8. --- Millefolium ſeu foliis Gramine is, ramoſum. Raji Synopſ.

*9. --- puſillum Gramineo folio, cau le rotundo. Raji Hiſt. 190.

Potamogeton fol. pinnatis. J. R. H.

------ floſculis ad foliorum nodos. J R. H. vid. *Myriophyllum.*

Potamogeito affinis, Graminifolia aquati ca. Raji Hiſt. vid. *fluvialis.*

1. Primula veris pallido flore humilis. Cluſ Hiſt.

2. concon. cephal ---- odorata, fl. luteo ſimplici. J. B

*3. --- pallido flore elatior. Cluſ. Hiſt

1. Prunus ſylveſtris. Pin. purgatis.

* ---- foliis ex albo & viridi variegatis

* ---- ſylveſtris, glaucophyllos.

Pr: fructu parvo dulci atro cœruleo pet.t *2. Pru damas noir. prunga v. 96.

*2. Prunus ſylveſtris, fructu majore.
*3. --- ſylv. fructu rotundo, albo, ma-
re. pseudodictamnus verticillatus inodorus cephal
* Pſeudo-Acacia vulgaris. J. R. H. Bech
r. Pſyllium majus erectum. Pin. herbe aux puces
1. Ptarmica vulgaris, folio longo, ſerra-
, flore albo. J. B. herbe a eternuer. erth. ptarmica lutea suaveolens. itom.
Pulegium, vid. *Mentha*.
1. Pulmonaria folio non maculoſo. Cluſ.
ſt.
2. ---- foliis Echii : Lob. Ic. 586. ru-
nte cæruleo fl. Bech.
------ Eadem fl. albo. J. R. H.
------ rubro flore, foliis Echii. J. B.
------ anguſtifolia, cæruleo flore. J. B.
* ---- anguſtifolia, non maculoſa, fl.
ruleo. *Pulmonaria*, etiam Auſtriaca. Cluſ.
ſt. clxix. cum fig.
1. Pulſatilla folio craſſiore & majore flore.
n. coquelourde. erbi.
* ---- Eadem flore dilutiore. Pin. punica flore pl majore grenad.
------ fl. violaceo, duplici fimbriato. balauste asti
R. Par.
*1. Pyrola rotundifolia, major. Pin. *elle*
iſt a Auxois la Ferriere a ſix lieux de Paris.
rie l'herboriſte nous la ferra voir.
* 1. Pyrus ſylveſtris. Pin.
* 2. ---- ſativa. Pin.
* 3. --- ſativa, fol. tomentoſis & inca-

Q.

1. Quercus latifolia mas, quæ brevi pe-
diculo eſt. Pin. vulneraire astrin
* 2. --- latifolia fœmina. Pin.
3. ---- cum longo pediculo. Pin.
* ----- Ead. glande craſſiſſima.
4. ---- foliis molli lanugine pubeſcen-
tibus. Pin.
* Quercuum capitula ſquamata. J. B. 86.
astring 1. Quinquefolium majus repens. Pin.
2. ---- minus repens, luteum. Pin.
3. ---- folio argenteo. Pin.
4. ---- rectum, luteum. Pin.

R.

Ranunculus fol. oblongo.

1. Ranunculus montan. fol. Gramineo
Pin.
2. ----- longifolius, paluſtris, major.
Pin. ranunculus tridentatus vernus flore simplici coeruleo hepatica nobilis hepatique de ...
3. ---- longifolius, paluſtris, minor.
Pin.
* ----- paluſtris ſerratus. Pin.
* ----- longifolius paluſt. minor, flore
ſemipleno.

* 4. R

*4. Ranunculus Plantaginis folio, flo-
culis cauliculis adhærentibus.

Damasonii species.

§ ---- palustris, Plantaginis folio am-
liore. J. R. H.
§ ---- palustris, Plantaginis folio, an-
ustiore. J. R. H.
§ ---- palust. Plantaginis folio angu-
issimo. J. R. H.

Sagittæ species.

§ ---- palustris, folio sagittato, mino-
. J. R. H.
§* --- palustris, folio sagittato, angu-
iori. J. R. H.

Myosuros.

§ ---- Gramineo folio, flore caudato,
minibus in capitulum spicatum congestis.
R. H.

Ranunculus fol. dissecto.

5. ---- pratensis, erectus, acris. Pin.
* ----- pratensis, erectus acris, macu-
tus. Pin.

* Ranunculus polyanthemos, simplex Lob. Ic. 666.

* ---- montanus, lanuginosus foliis Ranunculi pratensis, repentis. C. B.

6. ---- arvensis, parvus, folio trifido Pin.

* ---- Idem, flore pleno.

7. ---- rectus foliis pallidioribus hirsutis. J. B.

8. ---- pratensis, erectus, dulcis. Pin.

* ---- Idem flore semipleno.

*9. --- pratensis, repens, hirsutus. Pin.

* ---- Idem fl. semipleno.

* deterit ---- pratensis, repens, hirsutus, foliis ex albo variis. H. R. Par.

10. deterit --- pratensis, radice verticilli modo rotunda. Pin. Cacinet grenouillete

* ---- Idem minor. Pin.

*11. -- Chærophyllos Asphodeli radice. Pin.

12. --- arvensis echinatus. Pin.

13. deterit --- palustris, Apii folio lævis. Pin.

? 14. -- palustris Apii folio lanuginosus. Pin. *Est la meme que sa* 6. *la* 7. *&* *la* 8.

15. --- nemorosus vel sylvaticus fol. rotundo. Pin.

Ranunculus fol. rotundo.

16. --- vernus rotundifolius, minor. R. H. vel [illegible] * Ra

[illegible]

* Ranunculus vernus, rotundifolius mi-
r, maculatus. J.R. H.
* ----- vernus rotundifolius minor,
lbifer.

Ranunculus trichophyllos.

17. --- arvensis, foliis Chamæmeli,
phœniceo. J. R. H.
18. --- Idem flore citrino. J. R. H.
18. --- arvensis fol. Chamæmeli fl. mi-
re atrorubente. J. R. H.

Ranunculoides.

19. --- aquaticus hederaceus, fl. albo
rvo. J. B.
20. --- aquaticus fol. rotundo & capil-
eo. Pin.
* ---- Idem flore pleno.
21. --- aquaticus capillaceus. Pin.
22. --- aquaticus albus, fluitans, Peuce-
ni foliis. H. L. Bat.
*23. -- aquaticus albus circinnatis tenuis-
ne divisis foliis, floribus ex alis longis pe-
culis innixis. Pluk. Phytogr.

Anemonoides.

24. --- nemorosus, luteus. Pin.
25. --- phragmites albus vernus. J. B.
------ phragmites, purpureus, vernus,
B.

 *26. Ra-

* 26. Ranunculus nemorosus, trifoli[...] H. L. Bat.

rapa sativa rotunda radice candida rave Bech.

* 1. Rapistrum folio glauco, sinuato, [...] albo. *Myagrum monospermum minus.* Pin.

2. ---- arvense, folio auriculato, ac[...]to. J. R. H.

raphanus. min. oblongus c Bp. [...] apert

1. Raphanistrum arvense, flore albo. [...] R. H.

2. ---- segetum, fl. luteo vel pallid[...] J. R. H.

* 3. --- flore purpureo, aut dilute vi[o]laceo. 4. Hist. Ox. 2. 266.

1. Rapunculus spicatus, albus. Pin.

* ---- spicatus flore flavescente. [...] R. H. raiponce

2. ---- folio oblongo, spica orbicula[ri] Pin.

3. ---- scabiosæ capitulo cæruleo. Pi[n.]

------ scabiosæ capitulo albo. Pin.

* 1. Rapuntium urens, Soloniense. H. [...] Bles.

1. Reseda vulgaris. Pin. herbe maure

rhabarbarum forte discor[...] r. h. rapontic purg

* ---- crispa gallica. Bocc. Rar. Plan[t.] 76.

* 2. --- minor, vulgaris. J. R. H.

1. Rhammus Catharticus. Pin. 478. pur[g]

Ricinus palme christ. purg

1. Ribes. vid. *Grossularia.*

1. Rosa sylvest. vulgaris, fl. odorato, in[]carnato. Pin.

* --- Eadem fl. albo.

* 2. Ro[...]

rosa moschata simplici flore rose muscade ou de damas, purg. C. B. P.

*2. Rosa sylvestris, foliis odoratis. Pin. incarn. eglantier rosier sauvage

*3. --- sylvestris, folio subtus villoso, albo. an prioris varietas.

*4. --- sylvestris, foliis carinatis, subs scabris. an Rosa campestris, repens, al.. Pin. rosa rubra multiplex rose de provins astrin

*5. --- sylvestris altera, flore albo, noras. Raji Hist. 1471. *Rosa arvensis, candi-*. C. B. Pin.

*6. --- campestris spinosissima, fl. albo loro. Pin.

*7. --- lutea simplex. Pin.

*8. --- alba vulgaris, major. Pin. rosmarinus cephal

*9. --- fructu hispido, oblongo, rubro.

1. Ros solis folio subrotundo. Pin. 357. Bech

*2. ---- folio oblongo. C. B. Pin. rubia tincto garence aper

1. Rubeola vulgò quadrifolia, lævis, floribus purpurascentibus. J. R. H. petite garence. ... squinancie

----- Eadem, floribus. albis. J. R. H.

1. Rubus vulgò, sive Rubus fructu nigro. Pin. ronce vulnerai. detersif

* --- Idem, fl. albo. H. R. Monsp.

* --- Idem, fl. albo semipleno.

2. --- repens, fructu cæsio. Pin.

3. --- Idæus spinosus. Pin. framboisier. ruscus latifol

1. Ruscus Myrtifolius, aculeatus. J. R. H. ... immaculata laurier alexan

1. Ruta muraria. Pin. sauve vie. Bech. ... aperit

*1. Ruta Hortensis, latifolia. Pin.

S.

Sabina folio tamarisci dios.
sabina folio cupressi. bristeriq.

1. Sagitta aquatica, minor, latifoli Pin.

*2. --- aquatica, minor, angustifoli Pin.

1. Salicaria vulg. purpurea, fol. oblongi J. R. H. fol. binis.

* ---- Eadem foliis ternis.

* ---- Eadem fol. alternatim dispositi

2. ---- Hyssopi folio latiore. J. R. H.

----- Eadem angustiore. J. R. H.

1. Salix vulg. alba, arborescens. Pin. flo rif. saule

----- Eadem fructifera.

2. --- vulgaris rubens. Pin.

3. --- sativa lutea, fol. crenato. Pin.

4. --- fol. Amygdalino, utrinque vi rente aurito. Pin.

5. --- fol. longissimo angustissimo, u trinque albido. Pin.

*6. --- Nerii folio, utrinque virente.

----- vulg. nigricans, fol. non serrato Pin.

7. --- platyphyllos, leucophlæos. Lugd 276.

8. --- latifolia rotunda. Pin.

----- folio ex rotunditate acuminato Pin. saule marceau

* Sa-

* Salix Capræa, folio oblongo, utrinque [vi]llofo.
* --- Ulmi minoris folio, rugofo & cre[n]ato.
* --- Ulmi minoris folio, rugofo non [cr]enato.
*9. -- fubrotundo argenteo folio. Pin.
*10.-- pumila anguftifolia, inferne la[n]uginofa. J. B. salvia ceph
*11.-- humilior, fol. anguftis fubcæru[lei]s ex adverfo binis. Raji Hift.
1. Sambucus fructu in umbellâ nigro. Pin.
2. --- humilis, five Ebulus. Pin. purg.
1. Samolus Valerandi. J. B. mouron d'eau saturein suriet ceph.
1. Sanguen, vid. *Cornus fœmina.* santolina foliis teretibus, stom. saururus frutescens foliis plantay.
1. Sanicula officinarum. Pin.
1. Saxifraxa rotundifolia, alba. Pin. aperit
2. ---- verna, annua, humilior. J. R. H. poivre long queue de lezard
[Sa]ponaria. vid. *Lychnis.* no. 1.
1. Scabiofa pratenfis, hirfuta, quæ offic. [...]n.
* ---- Eadem fol. ex luteo & viridi va[rie]gatis.
* ---- Eadem calice ampliffimo, ner[vo]fo & dentato.
* ---- major communior, fol. non la[cin]iato. J. B.
* ---- vulg. fl. pleno. Raji Cat. Angl.
* ---- pratenfis, hirfuta, prolifera.
[2]. ---- capitulo globofo, minor. Pin. fl. [...]ul.

* Sca-

* Scabiosa eadem fl. purpureo.

* ---- minor vulg. floribus carne[illegible] Hist. Ox.

* ---- minor, vulg. floribus candic[illegible] J. B.

* ---- minor, vulg. prolifera.

*3. ---- minor. 1. 2. 3. Tab. Icon. 1[illegible] & 161.

mors du diable 4. diaphac ---- folio integro, hirsuto. remors J. R.

------ fol. integro, glabro, fl. cæ[illegible] leo. J. R. H.

* ---- Eadem fl. incarnato. J. R. H.

* ---- folio integro fl. albo. J. R. H.

* ---- foliis imis integris, caulescen[illegible] bus incisis.

scammonia v. convolvulus 5. ---- quæ Dipsacus sylvestris capit[illegible] minore, vel Virga pastoris minor. Pin.

1. Scandix aiguille semine rostrato vulgaris. Pi[illegible]

*1. Scirpoides quod Gramen Cyperoi[illegible] palustre elatius, spicâ longiore, laxa. Raj[illegible]

scilla radice rubra *2. ---- quod Gramen Cyperoides spic[illegible] C B p ornithogalum maximum pluribus spicis brevioribus mollibus comp[illegible] sita. Ra. Syn.

3. ---- quod Gram. Cyperoides ex M[illegible] te Balon, spicâ divulsâ. J. B.

4. ---- quod Gram. Cyperoides ma[illegible] spicâ compacta. Pin.

*5. ---- quod Gram. Cyperoides spicat[illegible] minus, spicâ longâ divulsâ seu interru[illegible] Raji.

*6. S[illegible]

*6. Scirpoides, quod Gram. Cyperoides ſpitum minus ſpicâ divulſâ aculeata. Raji Syopſ. 269.

*7. ---- quod Gram. Cyperoides elegans, icâ compoſita, molli. Pluk.

*8. --- quod Gram. Cyperoides tenuifom, ſpicis ad ſummum caulem ſeſſilibus glolorum æmulis. Pluk. *C'eſt un vray Cyperoi-ſ.*

*9. --- quod Gram. Cyperoides miniım, ſeminibus deorſum reflexis puliciforibus. Raji Syn.

*10. -- quod Cyperoides anguſtifolium, icis ſeſſilibus in foliorum alis. J. R. H. Le Gramen nemoroſum ſpicâ molli rufeente. Pin. *que Mr. Tournefort range mal a pro-ſ avec le Chiendent, eſt de ce genre.*

1. Scirpus paluſtris, altiſſimus. J. R. H.

2. ---- omnium minimus capitulo breori. J. R. H.

*3. --- ſupinus, minimus capitulis conobatis, foliis rotundo teretibus. J. R. H.

4. ---- paluſtris, altiſſimus, foliis & caâ ſerratis. J. R. H. *Cyperi ſpecies.*

Typhulæ ſpecies.

5. ---- Equiſeti capitulo majori. J. . H.

*6. --- Equiſeti capitulo rotundiori.

7. Scir-

7. Scirpus Equiseti capitulo minori.. J..
H. *Item Scirpus omnium minimus capitulo la*
giori. J.R.H.

*8. --- qui Gramen junceum foliis
spicâ Junci minus. Pin.

*9. --- qui Gramen junceum clavatu
repens, foliolis & capitulis Psyllii. Hist. C

ophtal *1. Sclarea Tabern. Icon. 373. toute bonne crvale

*2. --- foliis profundè incisis. *Orva*
sylvestris quarta species. Dod. 293.

* ---- Eadem fl. dilutè cæruleo.

3. ophthl --- pratensis, fol. serratis, fl. cæru
leo. J. R. H.

* ---- Eadem fl. dilutè cæruleo.

----- Eadem fl. suaverubente. J. R. I

----- Eadem fl. albo. J. R. H.

Scordium. vid. *Chamedris.* no. 4.

1. Scorodonia, sive Salvia agrestis. Ge
Scordium alterum, sive Salvia agrestis. Pin.

Scorpius. vid. *Genista spartium.*

1. Scorzonera palustris pulveriflora. F
R. P. scorzonera latifolia sinuata diaph. coraiti

2. --- angustifolia prima. Pin. *a Fonta*
nebleau.

3. --- foliis laciniatis. J. R. H.

reso 1. Scrophularia nodosa, fœtida. Pin. fo
binis.

* --- Eadem fol. ternis.

* --- nodosa fœtida fol. utrinque acut

2. vasolo --- aquatica, major. Pin. herbe ...

*1. S

* 1. Secale hybernum vel majus.
n.
1. Sedum minus teretifolium, album.
n.
2. —— arvenſe, fl. rubente. Pin.
* 3. —— minimum flore tetrapetalo, ru-
nte.
4. —— Cepæa dictum. H. L. Bat.

Sedum luteum.

5. —— minus, luteum, folio acuto.
n.
6. —— minus luteum, ramulis inflexis.
n.
7. —— parvum acre, fl. luteo. J. B.
8. —— minimum luteum non acre. J.
B. 695.
—— minus lato & craſſo caule, Port-
dicum Belgarum. H. R. Par.
9. —— majus vulgare. Pin.
10. —— quod Polygonum minimum mu-
ſum. Bocc.
. Senecio minor, vulgaris. Pin.
. Serpillum latifolium hirſutum. Pin.
—— Idem flore albo.
. —— vulgare majus fl. purpureo.
—— Idem fl. dilutè carneo.
—— Idem fl. albo. Pin.

* Serpillum vulg. majus foliis ex albo ridique colore eleganter variegatis. H Ox. 3.

*2. —— vulgare majus, flore minore.

3. —— vulgare minus. Pin. fl. pur reo.

* —— Idem fl. purpureo. Pin.

* —— Idem fl. roſeo.

—— Idem, fl. candido. Pin.

—— Idem capitulis lanuginoſis. H

*4. —— ſaxatile hirſutum, Thymif um nanum, flore rubello. Bocc. Muſ. *Serpillum vulg. minus fol. acutioribus an ſtioribus.* Pin.

* —— Idem flore purpureo vel ru cundiſſimo.

* —— Idem fl. albo.

* —— Idem capitulis lanuginoſis.

5. —— foliis Citri odore. Pin.

Seſeli pratenſe, Silaus fortè Plin Pin.

vulnéraire 1. Sideritis hirſuta, procumbens. P 233. crapaudine

2. —— arvenſis, latifolia glabra. P

3. —— Alſine Trixaginis folio. P 233.

siliquastrum quai[...] § —— Quernofolio. Pin. vid. *Horn num.* [...]ier, arbre de judas [...]stringent

1. Sinapi ſativum Ger. Em. ſinapi ſiliq latiuſculâ glabrâ, ſemine rufo ſ. vulgare. B. sinapi rapi folio moutarde senevé. [...] 2.

2. Sinapi Apii folio. Pin. moutarde sauvage
3. —— arvenſe præcox ſemine nigro. iſt. Ox.
—— Idem, fol. integris. J.R.H.
* Siſon quod Amomum officinis noſtris. n. vid. *Sium* n°. 6.
1. Siſymbrium aquaticum. Matth. cresson deau
2. —— Erucæ folio glabro, fl. luteo. R.H. herbe de st. Barbe
3. —— aquaticum Raphani folio, ſiliquâ breviori. J.R.H. cresson a feuille de raifort
4. —— aquaticum fol. in profundas cinias diviſis, ſiliquâ breviori. J. R. .
5. —— paluſtre repens, Naſturtii folio. R.H. cresson a fleur jaune
*6. —— paluſtre, flore minimo.
7. —— annuum, Abſinthii minoris fo. J.R.H. talitron vel sophia chirurgorum
*8. —— Erucæ folio aſpero, flore luteo. R.H. *Erucæ ſpecies.*
1. Sium latifolium. Pin.
2. —— ſive Apium paluſtre, fol. oblons. Pin. berle ou ache deau
3. —— geniculis umbellatis. H. R. ir.
* —— foliorum conjugationibus laciatis. J. R. H.
*4. —— minimum. Raji Hiſt.
5. —— arvenſe ſive ſegetum. J.R.H.

*6. Sium aromaticum, Sison officinarum J.R. Herb. 208.

1. Smilax unifolia, humillima. J.B. H.

1. Smyrnium. Matth. 773.

1. Solanum officinarum, acinis nigrican tibus. Pin. 166.

* Idem foliis ex albo & viridi varieg tis.

2. —— officinarum, acinis punice Pin.

3. —— officinarum acinis luteis. Pin.

4. —— ſcandens ſeu Dulcamara. Pin

* —— Idem flore albo. Pin.

*1. Sonchus aſper non laciniatu Pin.

* —— aſper non laciniatus Dipſaci v Lactucæ foliis. Pin.

—— aſper laciniatus, folio Dentis Le nis. Pin.

* —— Idem flore intus albido ext purpuraſcente.

—— lævis laciniatus latifolius. Pin

* —— Idem flore intus albido, extus pu puraſcente.

—— lævis minor, paucioribus lac niis. Pin.

* —— ſubrotundo folio, noſtras, lævi ſimis ſpinulis circa foliorum oras exaſperat Pluk. Phytogr.

* So

* Sonchus repens, multis, Hieracium ma-
. J. B.
* ——— lævis paluſtris, altiſſimus. Raji
ſt.
*1. Sorbus ſativa. Pin. *sorbier arbr. vulg*
*2. aucuparia. J. B.
1. Sparganium non ramoſum. Pin.
2. ——— ramoſum. Pin.
Speculum Veneris. vid. *Campanula.* n°.

1. Sphondylium vulgare hirſutum. Pin.
* ——— Idem, fl. rubente. *berce fausse branche ursine*
2. ——— hirſutum, foliis anguſtioribus. *spinacia capsula seminis aculeata spinaci, emolli*
n.
——— hirſutum fol. anguſtioribus atro
rpureis. H. R. Monſp.
? ——— criſpum J. B. 3. part. 2. 163.
1. Stachys major Germanica. Pin. *epy fleuri. histor. vulg*
* ——— Eadem foliis ternis.
* ——— major Germanica, fl. albo.
n.
*2. ——— folio obſcure virente, fl. ferru-
neo. H. Ox. *Galeopſis Alpina, Betonicæ fo-*
, *flore variegato.* J. R. H.
1. Statice. Lugd.
*1. Stellaria quæ lenticula paluſtris bifo-
, fructu tetragono. Pin.
2. ——— quæ Alſine aquis innatans foliis
ngiuſculis. J. B.

*3. Stellaria quæ Lenticula paluſtris a-guſtifolia in apice diſſecto. Flor. Pruſſ.

*4. —— aquatica fol. longis tenuiſſim Raji Pluk. Almag. Bot.

Stæbe vid. Jacea.

*1. Stratiotes fluviatilis. Geſn. Ho 283. *Millefolium aquaticum, ſeu Viola aqu tica caule nudo.* Pin. *fl. purpuraſcente.*

* —— Ead. fl. albo.

1. Symphytum Conſolida major, fl re purpureo quæ mas. Pin.

—— Idem flore purpuro-cærul Pin.

—— Idem fl. albo, vel pallidè lu quæ fœmina. Pin.

* —— Idem flore luteo. Pin.

* —— Idem flore variegato. H. Bat.

T.

1. TAmnus racemoſa, fl. minore, lu palleſcente. J.R.H.

1. Tanacetum vulgare, luteum. Pin.

*1. Taxus. J.B.

1. Thalictrum majus ſiliquâ anguloſâ, ſ ſtriata. Pin. 336.

2. —— minus alterum, Pariſienſiu fol. craſſioribus & lucidis. H.R.Par.

3. Th

i. Thalictrum minus. Pin.
* —— montanum minus fol. latioribus. ji Syn.
1. Thlaspi vulgatius. J.B. cordial
2. —— arvense, siliquis latis. Pin.
3. —— arvense, perfoliatum, majus. n.
thlaspi allium redolens
*4. —— umbellatum, arvense, amarum. 3.
4 —— Idem flore subrubente.
* Thlaspidium arvense, fol. dentatis. *Thla-umbellatum, arvense amarum.* J.B.
* —— Idem flore subrubente.
1. Thymelæa Linariæ folio, vulgaris. R.H.
*2. —— Lauri folio, sempervirens, seu ureola mas. J.R.H. purg.
1. Thysselinum palustre. J.R.H.
*1. Tilia fœmina, folio majore. Pin. cephal
*2. —— fœmina, folio minore. Pin.
1. Tithymalus sylvaticus, lunato flo- Pin. 290.
* —— Idem fol. ex albo & viridi varie-is.
* —— foliis punctis croceis notatis.
2. —— palustris, fruticosus. Pin.
*3. —— Lithospermi majoris folio. Bot. onsp.
4. —— montanus, non acris. Pin.

*5. Tithymalus Myrsinites, fructu v[...]
rucæ simili. C. B. Pin.

*6. —— Amygdaloides latifolius. Tab[...]
con. 590.

7. —— Amygdaloides angustifoli[...]
Tab. Icon. *est Tithymalus foliis Pini forte D[...]*
scoridis Pityusa, C. B. P. purg.

8. —— Cyparissias. Pin. herbe a lait, purg[...]

—— Idem capitulo rubente. Pin.

* —— Idem fol. punctis croceis, no[...]
tis, major. Pin.

* —— Idem fol. punctis croceis, [...]
tatis, minor. Pin.

Tythymalus annuus.

*9. —— latifolius Cataputia dictus. H.
Bat. epurge catapuce purgat.

*10. —— arvensis, latifolius, Germa[...]
cus. Pin.

* —— Salicis folio tenuissime serrato
villoso. J.R H.

11. —— Helioscopius. Pin.

12. —— rotundis foliis non crenatis. H
Bat.

13. —— sive Esula exigua. Pin.

—— Idem foliis obtusis. Pin.

14. —— exiguus saxatilis. Pin.

1. Tordylium maximum. J.R.H.
tordylium narbonense [...] seseli [...] carminativ

1. T[...]

1. Tormentilla ſylveſtris. Pin.
* —— Eadem, flore pleno.
1. Tragopogon pratenſe, luteum, majus. Pin.
* 2. —— luteo-pallidum, calice barbato.
1. Tragoſelinum majus umbellâ candidâ. J.R.H.
2. —— alterum maj. J.R.H.
* 3. —— minus. J.R.H.
* —— Idem fl. rubente.
* Tribuloides vulgare, aquis innaſcens. J.R.H.
1. Trichomanes ſ. Polytrichum officin. Pin.
* —— minus & tenerius. Pin.
2. —— foliis eleganter inciſis. J.R.H.
1. Trifolium pratenſe purpureum. Pin.
* —— Idem dilutè purpureum.
* —— pratenſe vulgare, fl. albo. H Ox.
* —— Idem fl. ſuaverubente.
* —— pratenſe, fl. monopetalo breviore.
2. —— ſpicâ oblongâ rubrâ. Pin.
3. —— montanum, ſpicâ longiſſimâ rubente. C.B.Pin. 328.
4. —— montanum, album. Pin.

*5. Trifolium Lagopoides, fl. subluteo
H. R. Par.

6. —— pratense flore albo, minus
fœmina, glabrum. J. B.

* —— pratense, fl. carneo, minus
fœmina, glabrum. J. B. Pluk.

* —— pratense, capitulo folioso. Amb.
541.

*7. —— humifusum, glabrum, foliis ci-
liaribus.

*8. —— fragiferum. Clus. Hist.

—— fragiferum nostras, purpureum,
fol. oblongo. H. Ox.

—— Idem, fl. albo. H. Ox.

Trifolium annuum.

*9. —— Orientale altissimum, caule fi-
stuloso, flore albo. Coroll. J. R. H.

*10. —— semen sub terram condens. H. R.
Par.

*11. —— albo incarnatum, spicatum, s.
Lagopus maximus. J. B.

12. —— arvense humile, spicatum, s. La-
gopus. Pin. pié de lievre

*13. —— parvum, hirsutum, fl. parvo
dilute purpureo, in glomerulis oblongis, se-
mine magno. Raji.

*14. —— flosculis albis, in glomerulis ob-
lon-

ngis aſperis, cauliculis proxime adnatis. aji Syn.

Trifolium luteum.

15. Trifolium pratenſe, luteum, capitulo upuli vel agrarium. Pin.

* 16.—- pratenſe, luteo croceum. *An ifolium Lupulinum, alterum minus.* Raji n.

* 17.—-luteum, Lupulinum, minimum. Ox.

* 1. Triticum hybernum, ariſtis carens. n. *Triticum ſpicâ & granis albis.* Raji n. blé froment resolven

* 2.——- ariſtis carens, glumis pube- entibus.

* 3.——- ſpicâ & granis rubentibus. Raji n.

* 4.——- ariſtis longioribus ſpicâ albâ. n.

* 5.——- ariſtis circumvallatum, gra- s & ſpicâ rubentibus. Raji Syn. 244.

* 6.——- ſpicâ villoſâ quadratâ longiore, iſtis munitum. H. Ox.

* 7.——- ſpicâ villoſâ, quadratâ brevio- , & turgidiore. H. Ox.

* 8.——- æſtivum. Pin.

* 9.——- ſpicà multiplici. Pin.

* 1. Tu-

*1. Tubera, Matth.
1. Turritis. Lob. Icon. 220.
2. ——- minor. Bot. Monſp.
3. ——- foliis inferioribus Cichorace
cæteris Perfoliatæ. J.R.H.
4. ——- vulgaris, ramoſa. J.R.H.
5. Leucoji folio. J.R.H.
1. Tuſſilago vulgaris. Pin. pas d'ane, Bech,
1. Typha paluſtris, major. Pin.
* ——- paluſtris clava duplici.
*2. —— paluſtris clavâ gracili. Pin.
* ——- paluſtris, clava duplici g
cili.
Thyphoides. vid. *Gramen* n°. 18.
Typhula vid. ſcirpus n°. 5. &c.

V.

1. VAleriana ſylveſt. major. Pin. bister
2. ——- ſylveſt. major, altera folio
cido. H. R. Par.
3. ——- paluſtris, minor. Pin.
4. ——- aquatica minor, fl. minore. R
ji Hiſt.
* ——- Eadem fl. albo.
*5. —— rubra Pin.
* —— Eadem fl. carneo.
refriger 1. Valerianella arvenſis, præcox, hum
lis, ſemine compreſſo. Mor. Umb. bourse ... mache, Blanchette, poulle grasse, salade chanoine *2. V

2. Valerianella arvensis, serotina, altera, ne turgidiore. Mor. Umb.
——— arvensis serotina, foliis serratis. . H.
. ——— semine umbilicato, nudo, ro- lo. Mor. umb.
. ——— semine umbilicato, nudo, ob- go. Mor. Umb. veratrum, ellebore blanc purg.
. Verbascum mas, latifolium, luteum, verat[rum] flore subviridi caust. et corrodens
thapsus barb. bouillon blanc molene emoll
. ——— fœmina, fl. albo. Pin.
. emoll ——— fœmina, fl. luteo, magno.
.
.. ——— nigrum fl. ex luteo purpurascen- Pin.
. ——— ramosum perenne, Parisien- n. J. R. H.
. ——— pulverulentum fl. luteo parvo. 3.
. ——— Lychnitis, fl. albo parvo.
.
. Verbena communis cæruleo flore.
.
* ——— Ead. floribus albidis. Pin.
1. Veronica mas, supina & vulgatiss.
1. thé de l'europe vuln. aperit
* ——— Eadem floribus rubellis.
* ——— Eadem floribus candidis. Pin.
2. ——— spicata minor. Pin. veronique ep.

* Ve-

* Veronica eadem fl. cæruleo p
ſcente.

* —— Ead. flore albo. Pin.

3. —— ſpicata anguſtifolia. Pin.

4. vuln. oper —— ſupina, facie Teucrii prate
Lob. Ic. veronique des pres

5. vuln. oper —— minor, fol. imis rotundiori
Hiſt. Ox. veronique des bois

* —— Eadem flore obſolete purp
ſcente.

* —— Ead. foliis oblongis, fl. ca
leo.

6. —— pratenſis Serpillifolia. Pin.

* —— Eadem, fl. albo.

7. —— floſculis cauliculis adhærен
Hiſt. Ox.

*8. —— minima, Clinopodii minori
lio, Romana. Bocc. Muſ.

* —— Eadem flore purpuro ca
leo.

9. —— verna, trifido vel quinque
folio. J.R.H.

* —— verna folio integro, triangu
dentato.

10. —— floſculis pediculis oblongis i
dentibus, Chamædryos folio. H. Ox.

* —— Ead. flore cæruleo & albo mi

* —— Eadem Chamædryos folio al
no. H. L. Bat.

1. Veronica Cymbalariæ folio, verna.
R. H.
2. antiscorbut —— aquatica major, fol. subrotun-
H. Ox. beccabunga
antiscorbut —— Eadem minor. J.R.H.
3. —— aquatica, major, fol. oblongo.
Ox.
4. —— aquatica minor, fol. oblongo. verbena communis caerulea ophtal
R. H.
5. —— aquatica, angustiore folio. J.
H.
Viburnum. Matth. viorne
1. Vicia sativa, vulg. semine nigro.
n. vesse ... resol
* —— sativa, vulg. semine cinereo.
n.
* —— sativa, vulg. fl. suaveruben-

2. —— vulg. acutiore fol. sem. parvo
gro. Pin.
*3. —— semine rotundo nigro. Pin.
4. —— angustifolia purpuro violacea,
quâ, latâ glabra. Bot. Monsp.
*5. —— minima, præcox, Parisiensium.
R. Par.
*6. —— Sylvest. lutea, siliquâ hirsutâ.
n.
*7. —— segetum singularibus siliquis gla-
s. Pin.

*8. Vi-

*8. Vicia Lathyroides, purpuro cæ floribus Par. Bat. 242.

*9. —— sylvest. albâ, siliquâ hir

* —— minima cum siliquis gla J.R.H.

*10. —— sepium, fol. rotundiore ac semine maculato. Pin. *siliquis nigr. se binis.*

Vicia multiflora.

11. —— maxima dumetorum. Pin.

* —— Eadem, fl. albo.

12. —— multiflora. Pin.

* —— Ead. pallide cærulea.

* —— Ead. purpuro violacea, cu lis albicantibus.

* —— Ead. purpuroviolacea tota.

* —— Ead. fl. suaverubente.

* —— multiflora fl. purpuro viola minore.

*13. —— multiflora, purpuroviolac spica longissima. *Viciæ pulchrum ge multifolium, sive Galegæ species quibusdam* B. 2.

14. —— perennis incana, multifl Bot. Monsp.

*15. —— sylvest. incana, major & præ Parisiensis, fl. suaverubente. J.R.H.

*16.

*16. Vicia segetum, cum siliquis pluri-
; hirsutis. Pin.
1. Viola Martia purpurea, fl. simplici
oro. Pin. *emolli*
* —— Martia, alba. Pin.
2. —— Martia inodora, sylvest. fl. cæ-
eo. Pin.
* —— Eadem fl. pallido. Pin.
* —— Eadem fl. violaceo & albo mix-

*3. —— Martia major, hirsuta, inodo-
H. Ox. *an Viola Martia inodora, syl-
tris, fol. mucronatis oblongis & strictioribus.*
1.
4. —— Martia arborescens, purpurea.
1.
5. —— bicolor arvensis, fl. candido &
eo. Pin.
*8. —— palustris, rotundifolia, glabra.
st. Ox. 2. 475.
* —— Eadem, fl. cæruleo & luteo.
1.
* —— Eadem, fl. toto albo. Pin.
*6. —— tricolor, hortensis, repens, fl.
gro purpureo, & instar holoserici niten-
Pin.
*7. —— tricolor, hortensis, repens C.
Pin. 199.
1. Virga aurea vulg. latifolia. J. B.

2. Virga aurea minor, fol. glutinosi
graveolentibus. J.R.H.

3. —— —— Virginiana, annua.
205.

1. Viscum baccis albis. Pin.

* 1. Vitis sylvestris, Labrusca. Pin.

* 2. —— Vinifera. Pin.

1. Vitis Idæa fol. oblongis crenatis,
ctu nigricante. Pin.

1. Ulmaria. Clus. Hist.

* 1. Ulmus campestris & Theophr
Pin.

* 2. —— minor, folio angusto sca
Ger. Em.

* 3. —— folio glabro. Ger. E
1481.

* 4. —— folio latissimo scabro.
Emac.

1. Urtica urens, maxima. Pin.

* —— Eadem foliis ternis.

* —— Ead. caule rubente. Pin.

* —— urens, maxima foliis ex l
variegatis.

2. —— urens, minor. Pin.

3. —— urens, pilulas ferens, 1.
scoridis, semine Lini. Pin.

§ Ustilago Tritici.

§ —— Secales. Pin.

§ —— Hordei. Pin.

§ U

18 Ustilago Avenæ. Pin.
19 Vulneraria rustica. J. B.

X.

XAnthium, Dod. Pempt. 39.

FINIS.

CATALOGUS
[L]IBRORUM,
Qui novissime apud
[P]ETRUM VANDER Aa,
Prodierunt, aliornmque.

[Bo]erhaave Index Plantar. Horti L. Bat. 8.
— alter Index Plantarum Horti L. Bat. 4°. 2. voll.
[S]. Vaillant de Structura Florum, 4°.
[Sc]heuchzeri Itinera Alpina novem, 4°. 4. voll.
— Herbarium Diluvianum fol. Edit. Nov. *altera parte auctior.*
[Ico]nes Arborum, Fructuum, &c. 4°.
[Ma]gnol. Hortus Regius Monspeliensis, 8°.

Mo-

Morifoni, Hiftoria Plantarum, fol. 3. vo

Raji, Hiftoria Plantarum, fol. 3. voll.

Muntingii, Vera Herba Brittanica. 4°.

Tournefort, Inftitutiones rei Herbar 4°. 3. voll.

Plumier de filicibus Americanis, fol.

Barrelieri Plantæ., fol.

Hermanni Paradifus Batavus, 4°.

Pluknetii Phytographia, fol. 4. voll.

Commelini, Flora Malabarica, 8°.

Ferrarii Hefperides, fol.

Vaillant Difcours fur la ftructure de Fleur.

Anatomie des Plantes, par Grew, l'Ame Plantes, &c. 12.

Inftructions pour les Jardins, par Quinti 4. 2. voll.

Dictionaire des Drogues fimples, par Le ry, 4.

Hiftoire des Drogues, par Pomet, fol.


Les Plantes, dans le Voyage de Feuillée.

Plantes de l'Amerique, par Plumier, fol.

Oeconomie de la Campagne, par Liger 2 voll.

Theorie & pratique du Jardinage, 4.

Et plufieurs autres.



Purg | Emoll | Bechic | Sternut | Hister | Aperient | Sudor | Alexit | Cordial | Cephal | Vuln | Ast | Vuln deter | Refrig | Resol

Purg
cartham
Prunus
Rhamnus
Persica
roza
iris
brionia
convolvul
soldanel
sambuc
frangul
linum
tithimal
cucumis
agrest
gratiol
asarum
cyclam
hellebor
veratr
thimelea
manna
cassia
Tamarind
senna
colutea
aloes
cinerus
Cariza
mirobolan
cammarina
rhabarb
scammon
lapath
hermodact
mechoacanam
convv. scam
periploca
colchicum
jalapa
turpeth
laserpit
moracan
apium pive
thapsia
colocinth
ricinus
globular
chamele
opsulus

Emoll
Malva
althea
viola
pariet
mercur
senecio
beta
atriplex
alcea
spinacia
chenopod
bonushenri
verbasc
acanthus
olea
sphondil
lilium
linum
linaria
gladiolus
aquifol
populus
linum
abutilon
blitum
coron imp
ketmia
solan. hyosc
mandragora
lactuc
endivia
ramuncul
purgat
hypecacuan
psillium
viola
mercurialis
fumaria
polypodium
epithimum
genista
arum
dracunculus
digitalis
eupatorium
poligonatum
raphanus
hedera
staphisagria
helleborine
betonica
anagallis

Bechic
filicula
adiantum
Trichomanes
ruta muraria
asplenium
glycirrhiz
Borrago
buglos
echium
pulmon
hieracium
helenium
peucedan
tussilago
papaver
amygdal
ficus
elichrisum
filago
brassica
vitis apiana
vitis damas
napus sati
rapa satio
oesigmum
malus
armeniac
hedera terres
erysimum
zizipha
sebesten
dactyli
palma
pistaci
ros solis
xylon
asperugo
aster
jacobea
siliqua
jasmin
Benzoin
arund. sacchar
althaa
verbascum
symphytum
filix
ingwehis
bellis
arum
urtica
veronica

helleb
iris
betonica
lilium con
origan
salvia
sapone
majoran
tarasp

scabiosa
eryng
olibanum
aristolochia
calamintha
thees
chamaedrys
verbena
vetiver
costus arabic
curcuma
gummi lacca
acetos
apium
lupulus
sarsa
arum
anonis
sinap
nasturt
rubus
persica

Sternut
Nicotian
sinap
delphini staph
ptarmica
pulsatill
hippocast
nerion
bupleurum
Thisselin
bidens
zingiber piper
plumbago
mastich
erucago
pirethr
evonima
buphtalmum
leucanthem
capsicum
euphorb
lentiscus
saururus
molle

Hepatica
agrim
eupator can
lingua cervi
polipod
filix
conchitis
osmunda
arum macul
fumaria
dracuncul
lupulus
cannabis
chaerophill
ingerhis
lichen sive hepat
ranuncul
aparine
chrysosplen
centaur maj
cuscuta
epithim
abriath tanacet
gentian

Hister
aristoloch
artemis
chenopod
matricar
melissa
ruta
sabina
caltha
leucoium
meum
valerian
vitex
cyperus
marrubium
ballote
conyza
iris foetid
crocus
ferula
cataria
mentha
lysimachia
hieracium
alaternoides
moldavica
mollucca
staechas
acorus
saxifraga
chenopod foetid
asphodel
arundo
cytisus
calamus
amomum
ingerha
galbanum
assa foetid
sagapen
opopanax
camphor
gentian
absinthe
tanaisie
juniperus
armoise

Aperient
cichor
dens leon
acetos
lapath
fragar
asparag
alkekenj
apium
smyrnium
petroselin
ruscus
foenicul
anonis
capparis
rubia
gramen
eryngium
carduus stell
raphanus
cepa
porrum
cicer
saxifrag
crithmum
camphorat
aquilegia
nigella
cappa
xanthium
glaucium
filipend
aparine
lithosper
cytisus
genista
lacryma job
herniaria
cinara
sisarum
fraxinus
betula
alysson
androsace
oreoselinum
paliurus
alchimilla
genista spart
tamariscus
abies

Sudor
tribulus
foenicul
gengid
genistell
therebint
azederac
echinops
thoa
caucalis
paragrabava
salsa
astragal

Antsco
cochlear
sisymbr
nastur
cardam
veronic
becabun
sium
apium
nummul
menyant
eruca
lepidium
cochlea
cardami
samolus
lapath
hesperi
cakile

Febrif
gentian
centaur
chamaed
caryoph
argentin
potentill
barsapa
tertianar
cassida
luteola
absinth tanacet
cichor calcitrap
card bened
cypressus
apium

Alexit
carduus ben
ulmar
scorzon
tragopog
card. ben
scabiosa
juniper
scordium
chamaedr
imperator
petasites
nux juglans
bugula
olibanum
poliacanth
polidricum
absinthi
zedoaria
barba capr
smilax aspr

Vulner aper
veronica
virga aurea
linaria
clutine
hypericum
chamaepitys
pimpinell
buphtal
melissa
androsaem
clinopod
limonium
helianthem
lunaria
scandix
teucrium
vulneraria
thalictrum
colophonia
artemisia
serpent
absinth
chamaerops
eupator

Cordial
allium
carlina
fraxinell
asclepias
acanit salut
doronic
ilex
caryophil
oxys
citreum
limon
herba paris
scabis
cardiaca
galega
aurantium
thlaspi
solanum
grossulae
sulla
narcissus
kermes

Carmin
anisum
coriander
carvi
ammi
aneth
daucus
ligusticum
pastinaca
angelica
foenicul
ligustic
tordilium
sedum
chamaem
ocimum
oenanth
melilot
leandes
junip
aurantium

Cephal
betonica
lilium conval
tilia
paeonia
viscum
primula veri
anagallis
galium
polium
ceraus
ocimum
calamint
menta
rosmari
hyssop
serpillum
salvia
lavendula
staechas
satureia
hysopus
marum
majoran
laurus
caryophill
cassia
origan
chamaedry
digitalis
dictam
ambrosia
lychnis
clinopod
anacampsis
styrax

ophtal
chelidon
euphras
sclarea
verbena
cyanus
dipsacus
delphinium
erica
tribol

Vuln
bugula
brunella
sanicul
punica
berberis
alchimill
pyrola
pilosell
pervinca
rhus
millefol
polygon
synphit
leucanth
bellis
cupress
anacamps
polygon
quercus
plantag
coronopus
amaranth
sorbus
suber
lapath
cydonia
corylus
ulmus
mespilus
sophia chir
quinquefol
tormentil
bistort
bupleurum
geranium
cruciata
cornus
urtica
lamium
lilac
equisetum
phyllitis
vitis idea
pyrus
castanea
guajacana
rosa silves
iris lutea

Ast
trifol
auricula
bulbocasta
mespilus
alaternus
salicaria
omphalod
oxyacantha
statice
paronichia
jacea
galeopsis
viburnum
tribulus aq
acer
guiava
ilex
celtis
cotinus
draco
ephedra
cistus
acacia
styrax
tacamaha
siliquastrum

Stomach
absinth
abrotan
santolin
mentha
tanacet
ptarmica
dracuncul
gnaphalium
horminum
melianthus
eupatorium
sophia
cacao
chocolat
albium
citreum coral
santal
salvia hysop
calamus
canelle
mastic
centaur


Vuln deter
persicar
rubus
ligustr
clematit
heliotrop
capriful
ranuncul
hesperis
corona solis
hedera
kali
sisymbri
sapona
jacobea
lampsan
chrysanth
momordi
ophris
ophyoglos
melilot
hydrocotyl
emerus
zacinth
blattaria
balsami
geum
phlomis
moschatell
lotus
siderit
anemon
globul
chamaenei
becnalbum
dentaria
campanula
crambe
cotula
fagus
elemi

Refrig
Anguria
pepo
cucumis
melo
cucurbita
lactuc
sonchus
portula
endivia
cichor
sedum
milium
cotyledon
aloine
cerasus
rubus
grossula
nymphea
lenticula
valerianel
campanul
rapuncul
morus
psyllium
salix
cynoglos
tragacanth
pinus
chondrill
epimedi
indica
orisa
cyperus

Hypno
papaver
hyosciam
cicuta
mandragor
solanum
belladon
physalis
lycopersic
melongena
trainon
argemon
hypecoon
melilot

Resol
hordeum
secale
triticum
fagopyrum
faba
phaseol
ervum
vicia
mays
avena
oraba
lupinus
foenumgrec
lens
pisum
scrophul
ranuncul
circaea
galeopsis
tamnus
cirsium
carduus
convolvul
isatis
alnus
onobrychis
hedysarum
jacea
rubeola
sedum
ochrus
lotus
cerasus
lathyrus
reseda
cicuta
camomil
marrub
persica
caltha
sambucus
ebulus
bardana
lappa

sauge romarin origan canelle
mari de veria
aulne
lappa
flang de surea
tanaretum
cerdane
cubeb
piper
zylem balsam anacardium
corinthe
girofle
iris lutea
cyperus
nardus
juncus odor
santal
corall
melisse
calamus
galanga
sclarea
caryophil
cardam
balsam peru
syriac
ladanum
acacia
rhaba rapontic
coral
nummularia
borgapastor
hypocistis



herbarum flores dividuntur in
Apetalodes seu Staminei
Petalodes
Simplices
Compositos
Flosculosos
semiflosculosos
Radiatos
Monopetalodes
Polypetalodes
regulares
irregulares
regulares
irregulares
Campaniformes
campaniformes proprie dictos
Tubulatos
patentes
globosos
infundibuliformes
rotatos
infundibuliformes proprie dictos
hypocrateriformes
Anomalos
Labiatos
Personatos
Cruciformes
rosareos
umbellatos
caryophillatos
Lyliaceos
tripetalodes
exapetalodes
anomalos
Papilionaceos seu
Leguminosos

De Re herbariâ Systema Tournefortianum a Corollæ figura

Jozephus Pitton tournefort aquisextensis doctor medicus parisiensis regiæ scientiarum academiæ socius et in horto regio botanicus professor primus primam et elaboratam de cognoscendis plantis methodum absolvit primus Systema rei herbariæ incertas et distinctas classes ordines genera et species sub divisit.

Classes a corollæ figura condidit ne absolutum numerum genera frangerentur; latius enim figura quam numerus sumi potest.

ordines a situ receptaculi floris supra aut infra germen primario deduxit. titulo pistilli aut calycis in fructum abeuntis. observaverat enim olim Caesalpinus florem vel incipiis fructus vel sub fructum situm esse.

genera certa et naturalia primus ins truxit, ea vere præsertim ex fructu definivit et perfecte delineavit; eum in his proinsecuti fuere botanici omnes Species ad data genera tanto numero et ordine reduxit ut majorem copiam a condita scientia obtinuerit nunquam ullus.
varietates utinam vir summus speciebus non immiscuisset et pro speciebus non assumpsisset. attamen cum video quâ Solertiâ maxime affines, proxime ad se invicem collocaverit vix nisi numerum ad positum quæro. hanc itaque affini tatem observent omnes qui turnefortium cum fructu legere volunt.
plantæ 8846 ad genera 673 reduxit. i.

Classes plantarum

Classis 1ª De herbis et suffruticibus flore monopetalo campaniformi
2ª de h. et suf. fl. mono: infundibul. et rotato
3ª de h. et suf. fl. monop. anomalo
4ª de h. et suf. fl. mon. anomalo labiato
5ª de h. et suff. polypetalo cruciformi
6ª de h. et suff. fl. rosaceo
7ª de h. et suf. fl. poly. rosaceo umbellato
8ª de h. et suf. fl. poly. caryophylleo
9ª de h. et suf. fl. liliaceo.
10ª de h et suf. fl. poly. ~~anomalo~~ leguminoso papilionaceo
11ª de h et suf. fl. poly. anomalo
12ª de h. et suff. fl. flosculoso
13ª de h et suff. flor. semiflosculoso
14ª de h et suf. fl. radiato
15ª de h. et suf. fl. apetalo seu stamineo
16ª de h. et suf. qui floribus carent et semine d[...]
17ª de h et suf. quorum fl. et fr. vulgo desideran[...]
18ª De arboribus et frutibus flore apetalo seu stamin[...]
19ª de arb. et frut. fl. amentaceo a chatons
20ª de arb. et frut. fl. monopetalo
21ª de arb et frut. fl. rosaceo
22ª de arb et frut. fl. papilionaceo

flores monopet. regular. campaniformes vel rotiformes aut acetabuliform

2 Classis 1a

flos monopetalus Sectio 1a regularis campaniformis cujus pistillum abit in fr. mollem et carnosum

Genus. Ium

Mandragora. fl. multifido⁺ plerumque 5° partito ex calyce multifido bullif. surgit pist. qd infimam floris ptem perfodit abit in fructum mollem plerumque globosum in quo ut pluri[mum] nidulantur semina reniformia. nom. qd circa pecorum stabula γάρσπα. foliis obscure virent. subrut. foetid. rad. long. crass. quas anthropomorphas dicunt qd homines repraesentant. fl. pediculo singulari et brevi ext. magis quam int. narcotica, cortex radicis et foliis resolvunt scrophulosos tumores

2um Belladona fl. multif.⁺ 4 plerumque 5° partito ex calyce multifido dentato surgit pis. posticae pti flor. clavi adinstar fixum fr. glob. mollem septo inter medio in duo divisum semiplacenta affixis. qd ea ad fucum utatur, pulchra mulier somnifera. folia extus resolvunt emolliunt sub cineribus calefacta. fructus comestus perniciosus convulsiones creat

Sectio. 2a. flos campaniformis ... tu. pis. ab. in fr. mollem et satis exiguum

1um Lilium convallium fl. multif. brevi calyce expertem fr. globosum rubr. sem. densis caulem ... Muguet olidis vulgari omnino differt incidit discutit cephalicum est; pulvis floris in umbra dessiccata; sternutationem provocat in capitis affectibus in paralysi epilepsia vertigine

Cl. 1.[a]

sceau de salomon

2.[m] Polygonatum fl. tubuloso multifido in 6. part. calyc. exper. fr. moll. glob. plerumq. sem. 3.[bus] utplur. subroto.

πολὺ multum γονυ genu. ob radices et caules aliis[illegible] evellium forma floris disgitur

radix singularis in fluore albo intus et extus in herniis infusa in vino albo vel in conserva. tota planta in decocto scabiei et cutis maculis optima aq. distillata cosmetica vulneraria astringens

3 Ruscus trou x frelon fl. glo. calyx multifariam scinditur fr. utplur. moll. glo. 1 aut 2° semi. fœtum plerumq. durum

troux frelon. a rusicid[illegible] disgit[illegible] staminib. in tubum cylindraceum collectis flores e margine folior. quo loco cauli adhærent

aperitivus diureticus viscerum obstructiones in hydrope ictero chlorosi calculo nephritides radix jusculi aposeme ptisam hydropes desperatos sanavit folia idem præstant baccæ in ardore urinæ

S. 3.[a] flor campan. form.

pist. ab. in fr. siccum seu testam uni capsular. vel multi capsul.

1.[m] Cerinthe melinet fl. tubulato et multif. os in anullis clauditur pist. tetrago. fr. ex 2.[bus] testis subrot, in duo locula. divi. totidem semi. oblong. utplu.

κηρὸς qd ad ceram apib. serviat. foliis glaucis albid maculis ō raro notatis. distinguitur species una ex indiis orient. allata fuit. donne Cornelle

2.[m] Gentiana fl. tub. multif. fr. membrana. ovato-acuminat. bivalvem 1 caps. sem. planis orbi. margin. a gentio illyrior. rege fol. opposita. simplicia amara febrifug. aperit attenuat alexipharmac chlorosi, menstrui retentis passione hysteric hydropa radices præsertim fol. bin. opposit. nervos

Cl. 1.a 5.a partit

4 3 hydrophyllon fl. multif. fr. fere glo bivalvem sem. ejusdem pene formae ὕδωρ aqua φύλλον folium

Euphorbium a titimalo non valde diversum ab eo distinguitr caule echinato 3 angul vel 4.° a caseo differt qd lac caustic dat gum. valde purgant. ossium cariem sistit. in pilulis cum aceto et succo limonum pro sternutat. in lethargo apoplexia

purg. 4 Soldanella chou marin. fl. ut pluri. fimbriato fr. cylindra. apice dehiscentem sem. placenta fixis. fol valide purgant
folia salso acri serum potenter purgant. macerantr in aceto cum cremore tartari vitriol vel decoctu. in jure vitulino vel exhibentr in pulvere

purg. 5 convolvulus liseron fl. ora plerumq repandâ fr. subrot. mbran. calyc. plerumq involutum 1 caps. aut 3 caps. sem. utpl. angulatis a cvolvendo. folia decocta cum oleo rosaceo in cataplasmatis forma tumores resolvunt.
minor megis[illegible] major hujus succus lacteus dat resi nam scamonio similem quae purgat a gr X ad XXX

purg 6 Tithymalus grande esule, cataputia dictus, epurge fl. gl. multif. duob. foliolis cincto calycis loco prit trigon. ut plu fr. in 3.a locul. div. sem. oblong. τιτθη mamma κακος mollis quia lac fundunt.
esula lactescit sine lac linaria crescit
lacte turget caustico sale corrosivo violenter purgat
datr in hydrope ictero obstructionib
sem. cataputiae maj. familiaris vere cathartica a gr X ad XI
corrigit per coct. cum salepix. v g absinth. in febribus

7 Glaux fl. patente vel clauso multif. prit intestam glob. ut pl. apice dehiscentem sem. exig. placent. affix fl. quinque partito absq calyce. vulneraric aperitiva saponacea ut becabunga accedit ad portulacam sed acriorem in acetariis cum aceto editur ~~in acetariis~~ cum salubritate

8 Oxys [alleluya] fl. paten. mult. fr. in bra oblong in 5e locul. ut pl. div. extrorsum a basi ad apicem dehiscentia sem. huc illuc dentib. propter elasticit. calyptrae. folia 3a pedic. cordis effig. saporis acidi unde ὀξύς acidum. et ad notam propriam mihi easdem fere vires habet ac acetosa cui tn praefertur in febrib. malign. ardentib. ubi cerebr minatur inflam et delyriis laborat, sitim sedat et ardorem aperit etiam hepat renum et obstruc. levat optima etiam in morbiz acutis peste et aliis morbis contagiosis ob acidum nitrosum

hypocistis fl. multif. fr. moll. intus velut radiatim divi. et semi. fetum ἀπὸ sub κίσθος cistus
succus spissatus et coctus ad consistentiam extracti astringens est potentissimum, intus exhibetur ad evacuationes sive per os sive per anum extus in epithem. et cataplasma ad confortandum et astringendum pro herniis

S. 4a

pist. in unicum semen

4 Rhabarbarum [raponticum] fl. [6 partit] multif fr. sem triangul. capsulae per maturitatem ita affixo ut ab ipsa divelli nequeat. apud barbaros nasc. sale acido volatili parum acri cum pauco sulphure et multa terra serum bilemq purgat, absorbet, astringit stomac et intestina roborat vermes infantum enecat alvi fluxus sist. in substia et decocto. duplicata dosi rhapontici

S. 5a

flos campan. fr. om. ex basin

fr. ex vaginulis aut folliculis constantem

1 Cotyledon fl. sub et multif. fr. in capitulum collectum a basi ad apicem dehiscens sem. min. radix utplu. tuberosa, folia crassa acetabuli forma intus refrigerat extus lenit inflamaões praecipue mammarum calcinaes confert

Cl. 1a

6 radix ut pl. tuber. folia crassa acetabuli forma unde κοτύλη cavitas

gobe mouches
2 apocynum fl. multif. fr. ex 2o vagi. a basi ad api. dehisc. sem. mult. pappis instr. placentae asperae affix. in nonnullis in aliis fl. inversus multif. ejus meditullium occupat capitulum eleganss ex 5e corniculis in orbem positis fr. ex 2b. vagin. a basi ad api dehisc. sem. squammatim posito pappis instr. placent. foliaceae affixo. species succo lacteo turgent ἀπὸ κυνὸς planta canina in panes incta in cibo data canes enecat

pentortilles ou la liane
purg. 3 Periploca fl. patente ad rotae figur. fr. apocyni plane simil. περὶ circa πλοκὴ nexus quia ad vicinas se alligat
ex succo ejus fit scamonium falsum quo verum adulterant ab apocyn differt flore ad basim quinque partito

Cl. 1a

4 Asclepias dompte venin fl. petal. multif. capitulum 5fidum. fr. ex 2bus vagin. mbran. a basi ad apicem dehisc. multo sem. pappis inst. placentæ squammatim affixo apocyno et periploca differt qd lacte careat ab asclepiade medico
radix cardiaca alexiteria sudorifica in infuso et decocto febrib. malign. ejus extractum in morbis contagiosis in scrophulosis morbis

S. 6a flos campaniform
ex fundo floris tubus exurgit pist. excipiens qd in fr. multicapsularem abit

1 Malva mauve fl. pate. multif. tubus pyramidatus stamin. pler. onustus fr. planum or bilocularem ydoq acumi. calyce ntpl. obvolutum capsulis axi circumher. singulæ striæ capsulam suam sem. fœtam non raro renifor. folia non ita secta ut alcea nec villosa ut althea ua ru ζω emollio
rad. fol. caul. fl. sem. emolliunt inflammatões temperant laxant leniunt in cataplasmate aut fomento. in erysipel ppria flor. inter the quotidie mane ad duos haustus jejuno ventriculo faucium ardorem et urinæ lenit

2 Althæa guimauve differt a malva foliis lanuginosis canescentib
emollit sicut malva et althea mucilagine et acido agit potis. radicem cum nitro aut cristal. min. in pulmoni affectani faucium dolorib. febrib ardentib et abdom. inflammat. peculiariter usurpant. fol. in enemate cataplas.

Cl. 1.a

8 3 Alcea disting. à malva et altea foliis divisis iisdem pollet virtutibus

4 Malacoïdes fl. malvae. fr. rubi etiam sicco

5 Abutilon fl. malvae fr. capitellum quodam modo referente plur. vaginis membranaceis a malva differt fructu capitelli instar plano datas, subtus rotundo crenat.

6 Ketmia fl. malvae fr. in plur. locul. div. apice dehiscent. semi. pluril
vires habet malvae cum floribus efficitur conserva ad inflammationes sedandas

Bechic 7 Xylon gossypium cotton fl. pat. multif. fr. subrot. in 4a aut plura locul. divi. apice dehiscent semin. foetu obductis molli illa lanugine in fila ductili qd gossypium appellatur.
gossipium ustum vulnerum sanguinem sistit. ejus fum histericis conducit. coctione utuntur chirurgi ad detergenda ulcera. seminis medulla bechico in morbis pectoris optima spermam augent. est etiam astringens in alvi fluxu desenteria haemoptisi

§ 7 Cl. 1.a
fleurs en cloche ou bassin.

Calyx abit in fructum plerumq carnosum

1 Bryonia vigne blanche couleuvree fl. pat. multif. quem calyx ita compl. ut sejungi nequeat flores alii steriles alii fecundi insidentes embrioni qui abit in baccam glob. sem. subrot. st claviculi quibus tanquam manibus adminicula apprehendit Βρύω germino pullulo
rad. purg. hydragog. pituitosis. aperit resolvit caput renes purgat; antiepileptica est infusum radicis in passione hysterica extus serum œdematis discutit

2 Tamnus racine vierge fl. pat. multif. steril. et fecund. embry. in baccam plur. ovat. calyptra membranacea semi. subrot. claviculi desunt
optimum resolvens et vulnerarium rasa vel trita contusiones cito dissipat pulverata stercori vaccino et aceto mixta optima arthritidi in cataplasmate ex lobelio maxime aperit in decocto calculum urinas et menses pellit humorem bronchialem discutit

3 Sicyoïdes fl. pat. mult. steril. fecund. fr. amygdalæ æmulum carnosum echinato in capitulum plerumq collectum subtenui cute. unico semine Σίκυος cucumis Σικύα cucurbita

4 Momordica pomme de merveille fl. pater. ita sectis in 5 petalis ... stare videatur

Cl. 1°

10 ster. et fecund. fr. turbinat. carum carn
qui elastica vi rumpi solet et sem. fundere
calyptra obducta plana margine utplurd
denticulato differt a cucumere fr. uni capsul
vi elastica. cum balsamina solet confundi sed dittan
vires ut balsamina

Elaterion a cucumere differt fructu vi elastica donat
et sem. amaris
violentus catharticum est et hydragogus .

purg. 5 Cucumis concombre fl. pat. mult.
ster. et fecr. fr. carno. plerumq teretem in
3a vel 4a loculamenta sem. oblong.
sem. refrigerat et paululum diureticum. radix salso acri
acido vomitoria. fructus acido fixo in sulphure crasso succum
vitiosum in stomacho febres generat

6 Melo fl. pat. multif. cucumeri simil.
fr. ovat. glabr aut rugosum in 3o locul.
divi. quae bifariam secari videntur sem. oblong.
μῆλον significat pomum. a cucumere differt sapore gratiori folio rotu
lenit urinas movet. fructus immoderate sumptus
febres parit cholaram morbum ciet .

7 Pepo citrouille fl. cucumer. fr. oblong. carnos
vel rotund. cortice non nunquam duro tuberosum
caveam in 3 ptes div. sem. planis annulo

quodam veluti cinctis placenta spongiosa affixis
pulpa cocta cum jure carnium refrigerat biliosis summe prodest
semen acido volatili sulphureo aperit, urinam pellet
in emulsione decoct aperientib pectoralib et refrig

8 Melopepo (le potyron) differt a cucurbitaceis fr
subrot, carnos. striato angulato in 5 partes
plerumq secto sem. compressis placenta spon
giosae affixis

9 Anguria (le melon de eau) differt a cucurbitaceis folio
in profundas lacinias dissecto et fructu eduli
refrigerat. semina nigra in pulpa subintrab.

10 Cucurbita calebasse fl. paten. plerum
ita sect. ut 5 petal. constare vid. steriles et
fecundi fr. nunc teretem et longum nunc lage
niformem in sex locul. plerumq div. sem. plan
oblong hinc obtusis inde latiorib et quasi in
hornum emarginatis. foulle disquibus foliis odore moschi
eadem virtute pollet ac cucumis

colloquinte Cl. 1.a

purg. 12 11 Colocynthys differt a cucurbitaceis folio in profundas lacinias dissecto fr. amaro non eduli

calyx et medulla. sale acido valde volatili parum acri
fructus et semina vehementer purgant in decocto aut infuso. ex ea et aliis medicantis efficiunt trochi albandal a gr III ad IV semina sola nullomodo purgant.

S. 8 fleurs en cloche

Calyx abit in fr. siccum

1 Campanula fl. mulltf. fr. mbranaceo in 3.a locul. div. in quor commissura axes tribus placentis instructes sem. + in aliq. minoribus + rotundis vel subrotundis.. plura ovata annulo veluti cincta transpargi solent per foramen singulis locul. proprium fr. qdoq. in 5.a locul. div. a campana

omnes lactescunt. resolvunt emolliunt inflammare sedant

Medium a campanula differt fructu laterne instar 5.a p...

2 Rapunculus raiponce fl. iba patente et inciso ut stellatus videatur + 5.a partitus pistil pler. q. bicorne. calyx abit in fr. in 3.a sem. utpl. exiquis. infeundum lumen a rapa propter radicum affinitat

lactescit
radix refrigerat in acetariis et in decocto prodest incuntibus faucium inflamaoib.

~~Medium~~.

S. 9.a fleurs en godet

Calyx abit in fructum gemellum

1 Rubia garence fl. pate: multif. plerq perforato fr. baccis 2bus succulentis sem. umbilicato fol. verticillata. sem pellicul involut—
radix īquinem attenuat urinas promovet et menses in decocto. praestat in hydrope ictero obstruct. alvū aperit. tingit pannos qui prosunt podagricis

2 Apparine gratteron fl. pat. multif. stam 4 fr. sicc. cortice tenui obductum ex gemellis globulis ēstantem sem. umbilic. fol asper. villosa verticill. ad nodos 5a vel plura distiguitr a rubia fr. sicco a cruciata fol. 4is vel plu. a gallio fol asp. aut villosis attenuat et dividit ceptalica diuretica sudores megna dosi. Sabulum ex renibus et ureteribus pellit aqua distillata in pleuritide

3 Gallium caillelait fl. pat. multif. fr. ex gemellis sem. ēstantem siccis ut plur. lunatis fol. neq̄ villosa neq̄ aspera verticill. ad nodos 5o vel plu. γάλα lac coagulare existimatr
aperit urinas promovet capitis dolorem levat, anti epilepticum et in omnib. affectib soporosis in infuso praestat attenuat īquinem et menstrua pellet aut provocat

4 cruciata croisette differt a gallio et apparine fol. numero 4o tum decussatim ad nodos fl. caulium extremit
astringens et vulneraria. Trida ut utuntur rustici pro cataplasmate in herniis puerorum et decoctum ejus bibendo

fleurs en entonoir souvoupe ouvoselle

 Classis 2[a]

De h. et suf. fl. mon. infundibuliformi et rotato. 2ae species aliae parte superiori comun inversum aliae discum, utraq intubum desinit. Ille infund. proprie hic hypocrateriformis dr hypocratera est vas qd poculo inter bibendum supponitr. rotatus assimiland. rotae

§. 1a flores infundibuliformi

Pist abit in fructum

1. Quamoclit fr. subrot. sem. utpl oblongis a convolvulo differt floris formâ

purgat scandit ut convolvulus

2 Menyanthes fr. seu testam oblong (trefle d'eau) utpl. bivalvem sem. subrot. fl. pilis obduct. lympham incidit in scorbuto podagra et scorbutal magnum in germania specificum in omnib. chronicis hydropic ictero hepatitide et obstruct. acerrime amara urinam move: dolores nephriticos sedat. tussim inveteratam febribus

orbi 3 Nicotiana tabac. fr. mbrana. oblong (herbe a la reine) subrot septo inter. in 2o locul. divis. sm. placenta affixis a joanne Nicotio nemausensi, regis christ. ad regem lusitaniae qui a belga e florida in gallias. flos 5 partit invrilatere

sale acri purgente pollet folia in usu sicca et pulver naribus hausto, masticata, fumigata cerebrum purgant utilia ad avertendam paralysin apoplexiam catarrhum fluxiones migrenam et rhuma tabacum in decocto vel infuso purgat vehementissime. in enemate praecip in affectib soporosis

4 hyosciamus jusquiame fr. in ipso calyce reconditum ollæ similem operculo instructum in duo locul. septo dist. cui adhærent sem. ὕς sus Κύαμος faba
intus periculosa. cvulsiones insaniam mortem. extus emollit narcotica et resolvit, seminis fumus per infundibulum susceptus in odontalgia et paronichiis folia cineribus calidis cocta aut semen cum vino mammis applicatum lac puerperarum dissipat

5 stramonium fr. plur. subrot. aculeis pomme epineuse
sæpe donat. in 4ª locul. placent. quib adhæ. semi sæpe renifor. fol. ampl. angul fœtid obscure virentia
periculosa sicut cicuta belladonna hyoscia. paululum comesta somnolentiam induct, si paulo plus furorem convulsiones & ext. emollit lenit resolvit, anodinum pro combustionibus hæmorrhoid. erysipel. inflam

6 pervinca pervenche fl. 5° part fr. ex duab siliq constant. sem. oblong. plerumq cylind et sulcato. sarment. long. repent. et fol. glabr. ad laurum accedent. fr. raro maturescunt
sale acido in parte terræ aperit, absorbet, astringit vulneraria decoct infus. hæmophthisi pulmon. affect. et fluori alb. cum lactis ebutyrati parte aequal in esquinancia menstrua immod sistit

7 Auricula ursi fl. 5° partit emarginat fr. glob. ipso calyce partim invol. apice dehiscent sem. plu. placent. affixis fol. crass. dens. glabr. primulae veris minoribus plur. c subrot. in acumen desinentib
fol vulner. extus applicata

7 Centaurium minus pist infimum flori. ptem perfodit fr. cylyn. vel ovatum indum pter dehiscen. in 2° locul. sem ut pl. exiguis
a primula veris distingui caule longiori et foliis secundum caulem oppo et amaris
extracto sulphureo cum sale acri acida corrigit, aperit
febrifugum est et vulnerarium fol. in decocto. fl. infus. in vino
ob amaritiem vocat fel terrae unde febrifug. per excellentiam
optima etiam in morbis contagiosis. a continente extracto quat... en soucougne ... ...

§. 2

fl. hypocrateriform. pist. abit in fructum
1 Androsace pist. infim. fl. perfodit fr. glob. ipso calyce ptim invol. apice dehiscent. sem. plu. placent affixis. flore differt ab auricula ursi. non perforato in hypocrateriform
Crassula. fr. plurim vagin a basi ad apicem dehisc
vulneraria diuretic humectans nitro suo
Camphorata fl. 4 fid. absq calice. stam ... efolior alis
diureti aperi. in asthmat. humido et pulmon. hydrop. aperien. et recens camphorae odore insprisem aut vino albo infus. instar the in asthmate
2 Primula veris caly. tubul. fr. sentesta oblong. ipso calyce vel ferme recondita apice dehiscent sem. subrot. placent affix fol. rugo. aspar. tenui. ad lactucam accedit.
fl. pediculo sustinentur. sunt 5° fid. e radicib. fl. immediate
nervos roborat paralysim linguae et balbutionem curat
cephalica unde vertigines virginum non menstruatarum
sedat apoplexiae conducit, radix in decoct in for. the
aq. distill cum ... lacte vaccini mixta contra cephalalgiam
capiti applicat. ex eo fit conserva ad paralysim

3 **Plantago** fl. plerq. quadripartito pist. staminib. longior. stipat. fr: seu vtertia fere ovat. aut conic. per maturit. in duas ptes quar altera alteri incumbebat transversa dehiscent septo inter. in 2 locul. veluti dis. sem. obl. placent. affix. quasi planta prosternus vel a pedam plantâ quod terit vel represent.
ri vel fi nervia offic. astring. absorb. vulner. r nervia praestat fol in decoct. vel aq. dist. in dysent. haemopht hemorragiis om per vomitu et sputo sanguineo enter. in cataplas. aut form in herniis. fol recentia vulnerib. contusionib. imp[illegible]

4 **Coronopus** corne de cerf differt a plantagine. fol. profunde dissectis κορώνη cornix πους pes
vires habet plantaginis

5 **Psyllium** herbe aux puces a planta et coronopo diver. qd in caules assurgit foli atos et ramosos ψύλλα pulex qd semen pulici simile. coronop et plantag. fl. et fr. simplici pediculo insident
seminis mucaginem inflam. sedandis aptissi in acrimonia pro dysenteria et renum inflam. hac mucagine temperat trachea arteriae et faucium asperitas in angina, febres calidas temperat alvum laxat.

§. 3.a fleur au contraire

Calyx plerumq. abit in fructum

1 **Jalapa** belle de nuit fl. leviter incis plerumq. gemino purg
[illegible]. salso acido volatili, acri resinoso serum egregie purgat [illegible] in pituitosis, hydrope &c

calyce donatr, altero a quo involvi altero in quo insidere solet fr. subrot sem. subrot.

2 Rubeola [petite garence] fl. vel 4 partitis vel lentia incis. caly. nunc gemino nunc unico. fr. ex duob sem, quasi exigua rubia a gallio diff fl. infundibul.
anginae et oib faucium inflamaoib maxime praestat

3 Trachelium fl. multif fr. mbra. saepe trigon, in 3a divi, sem. featum utpl. exig. a trachea arteria cui auxiliari dr eodem noe campanulae speciem quamdam appellarunt
Caeterat

4 Valeriana [5 partit pleruma irregul aliquot con] fl. multif calyci insidet qui abit in sem. utpl. oblong fere plan: pappis instructum radice odorata foliis glabris ad nodos caulium [tubulat] geminis vulgo a valeo. qd viribus eximiis valere dr. flores in fasciculum specificum habetur in epilepsia ejus radix. evellanda vere antequam germinare coeperit, siccanda in umbra ac pulveranda; incidit attenuat sanguinem, liberiorem in cerebro circulatio. reddit

Cl. 2.

5 valerianella Mache fl 5 part multif. fr. 19
monospermum alius ferri lanceæ fma ex 2bus
phb ēstans una semen fovet. alius ovatus, umbilic
tricuspis 1o sem. fr. sem 1m umbilico pelvifor.
fr. ceteris longior fungo. lunatus sem. teret
fr. in 3 hamos desinit sem ō nihil incurvum
valvis bifidis fol. binis glabris venosis. a
valeo qd virib eximiis valeat
lenit refrigerat, incrassat multum nutrit febris ardorem
dolorem nephriticum superat acorem humorum et nimium
sanguinis salacitatem corrigit cōvulsionis et capitis morbos et dolores
lenit

§ IV fleurs en entonoir, bassin en molette

pist. 4or veluti embryo, stipatur in totidem sem
aben et in calyce maturescunt

1 Borrago bourache. fl. rotat. calyx 5 part. ad basim sem. viperini capit
æmula calyx longe ampliatur post florem
iisdem virtutib ac buglossum

2 Buglossum. fl. infundibul. multif. 5 part. calyx ad
basim secto sem. viper. capitis æmul. differta
borragine floris structura rotundiore Bous bos γλωσσα
lingua
sal. acido sulphure crasso intricato lenit temperat humectat
datr pro pusllos in depss fol in infusian. pectoralib et simul
refrigerantib succus expressus in pleuritide 3o salia continet
⊖ ⊕ ⊕

Cl. 2.[a]

Bechi 20 3 Asperugo fl. multif. 5 partit caly. pelleri for qui deinde sponte comprimitur sem. 4 oblong. calycis partes adeo comprimunt ut sibi mutuo adhoerescant geri folii in modum.
astringens in haemorrag. haemorph. sugg. vomit

pector 4 Echium viperino fl. ò nihil inflexo in aequaliter directo cujus margo sup. longius excurrit quam inf. caly. utrpl. ad basim secto 5 parti. posterioris capit caml. sem. Echium vipera ò d. hum ob sem. fin. sed qd demorsis a vipera auxiliari dr. stam. 5e marginem inferi floris superantis
bechica et alexiteria adversus viperae et venenosorum morsuum exter. in forma cataplasmati aut fomenti

Bechi 5 pulmonaria fl. multif 5 partit pelvim quodammodo refert caly. tubul. utrpl. pentago 5 fido differt a c generibus calycis forma fol oblong vel subrot. ò incisis mollib vel asperis et plerq maculatis pulmonis male affectis addicta
bechica in pulmonis affectib acido fixo in sulphure mucilaginea in formam syr. in sputis sanguinis hectica phthisi peripneumonia convenit

6 Echioides fl. infundib. sed isoperimetro qua nota differt ab ~~echio~~

7 Lithospermum gremil, herbe aux perles fl. multif. caly. ad basim secto sem. subrot dura expolita nitida λίθος lapis σπέρμα semen * a buglosso differt sem. tantum in usu acido volatili aperit pituitam solvit urinam et menses pellit calculo conducit, pulvis in lacte muliebri partui difficili optimo, convenit in gonorrea et inflammationi prostatarum

8 Symphytum consoude fl. oblong quasi campanif. caly ad basim secto sem. viper capit. æmul a c generib differt floris fmâ συμφύειν simul nasci - ex dioscoride. coales frusta carnium quib. cum coquuntr. a cerinthe distinguitur seminibus capsula non obductis consolida maj. off. vulneraria astringens et bechica a Pectoribus pulmon, hæmoptisi medetur succus vulnera consolidat rad. in ptisan. pro sanguinis mulierum profluviis quæ sistit astring conditur saccharo syr. tabell. in hæmoptisi

9 heliotropium herbe aux verrues fl. centro stellæ in modum corrugato et in 10^en ptes alternatim inæquales ad oram inciso sem. hinc angul inde gibba ἥλιος sol τρέπειν vertere succus corrosivus est et verrucas corrodit applicatus prius sectas utilissimus in sordidis ulceribus ad detergendum, valde detergit. decocto od m. 1. purgat

10 Cynoglossum langue de chien fl. multif. 5. part fr. 4^or capsul. asper. ut pl. sem. fere plano planta pyramid. et quadrilatera affinis κυων canis radix in infuso aut decocto acorem mitigat immo decocta mulierum profluvia sistit. pilulis de cynoglosso nomen dedit quarum basis cum opio et semine hyosciami sanguinis efferventiam temperant somnum conciliant. folia in decocto censentur vulneraria in cataplasmate emollient et resolvunt

Cl. 2a

22 11m Omphalodes fl. rotato multif. fr. ...
centrum et pyramidat tetragon
ex 4. capsul, cavis, umbil. calathum referent
sem. plano. placent pyrami et quadrilat affixis
ὀμφαλός umbilicus
vulnerarium et astringens ut borrago

S. 5a

de herbis infund. semine singulari

cert. Plumbago dentelaire. fl. multif. tuyau evase en bassin in 6. difid calyx tubul, sem. pistillum fit semen
oblon plerumq acuminat in ipso calyce maturescit
summe aperit et valde acris. radix dentem refert et
odontalgiae salso acri optima est masticando aut decocto
ejus abluendo os. folia dorso equorum inter equitandum
exulcerato applicat optime a sanat

S. 6

flore rotato cujus fructum durum siccum

1 Lysimachia cornaille fl. multif fr. seu
testam fere glo. apice dehis. sem. placent affix.
a lysimacho
astringens est et vulneraria folia in decocto disenteriam
et mulierum fluxia curant idem praestat succus
folia valent ad hemorragias

2 Anagallis mouron fl. multif. 5 partit fr.
seu test. fere glob. per maturitat. in 2as ptes al
tera alteri incumb. transversa dehisc. sem. utrpl.
angul. placent. affixis. fol conjugata flos unica pediculo Hic in foliorum alis
vulneraria extus applicata et intus suscepta in infusione
in morbis oculorum etiam praestat succo suo, resolvit
astringit, succus nasi fungosa dessiccat

3 Samolus mouron d'eau fl. multif. 5 part. calyc. pist. junctam pist. seu test. apice dehisc. sem. ut pl. exigui. differt a lysimachia fl. fine et fr. qui fit ex calyce simul et pistillo
folia primaria edula acidula confert in scorbuto et macie

4 veronica fl. multif. in 4 part. fr. mbrana. in duo locul. divi. sem. modo crassior. modo exiguus fructus et semina eadi formia
salis acri acido aperit bechica est parum astringit et vulneraria est pituitam debellat, 1° viscera detergit phthysi calculo conducat decocte cum glycirrhiza instar thé obstructiones viscerum solvit

5 Chrysosplenium saxifrage dorée fl. multif. in 4 part. calycis experte pist. in capsul mbran. bicor. bivalve sem ut pl. exig.
optima ad morbos splenis hepatis, etiam in decocti astringentib. vulneraria

6 polemonium fl. multif. 5 part. fr. seu test. subrot. trifario ut pl. dehisc. in 3 locul. divis sem. saepe oblong. quasi multa folia unicum folium componentia polo multum ζευγον solum
antiscorbuticum, tn non est in usu

Cl. 2a

247 verbascum bouillon blanc fl. monop. 5 part. fr. sentent. ovato acumin. septo intermedio in 2 divi. sem. ut pl. exig. angul. placent. affix.
barbascum a coma seu barba qua folia obduci solent. fol. altern. flor. verticaliter circumpositi
paululum vulneraria et astringens radices et folia
cum satis volatili in sulphure aperit emollit et laxat
intus in omni decocto emollienti fol. extus ad quos summi
dolores sopiendos tumores ani haemorrhoid. tentiones
dolorosas inflam. alii

8 Blattaria herbe aux mites diff. a verbasco fr. rotundiori. fol. non lanugin. quia blattas in se contrahit ex plinio. stam florum basi sua lanuginem quandam decent. fl. incisurae inequales
vulneraria, detergens vide xylon

9 Polygonoides fl. multif. ex cujus meditullio fr. striatum alatum plerumque villis hirsutum quasi ad polygonum accedens

Sa

flor. rotatus vel campanulat. cujus pist. abit in fr. mollem

1 Solanum morelle fl. rotat. 5 part. multif. fr. glob vel ovat. moll. succulentum sem planis
dolores lenit emollit leniter et solvit; anodinum
folia et fructus extus, praecipue trita vel succi
in cataplasm. aut fom. in ardoribus capitis, inflam
phrenesi repercussivus in erysipela dartres feu volage

2 Lycopersicon fl. multif. fr. carno subrotun. in varia locul. divi. sem. ut plu. planis
λύκος lupus περσικός persica. differt a solano fr. in pl. locula. div.
mandragoræ fermè vires habet resolvens et anodynum infunditur in oleo ad contusiones tumores rheumatism. ischiat. fol. extus resolutiva.

3 Alkekengi coqueret fl. multif. caly. campanif. fr. cerasifor. sem. ut plur. planis involutum pellicula mbran. + qua differt a solano est calyx longe amplior
aperiens est acido suo tartarum urinæ solvit eumq. pellit alias refrigerat, soli fructus seu baccæ in usu ischuriæ hydropi medentur. conficitur vinum alkekengi quotidie sanandum ad calculos

4 Melongena Mayenne fl. multif. differt a solano fructu solido carnoso non cavo,
fr. carno, in quo nidulantur sem. renif. ut pl. succosus
fructu est flatuosus et dispeptus sicut fungi reddit homines soporosos et furibundos et quasi insanos vires mandragoræ et lycopersici fol. et fructus in cataplasm. anodini et resolventes

5 Capsicum piment poivre d'inde ou de guinee flo. multif. fr. quasi mbran. in 2° vel pl. locul. divi. sem. compressis ut pl. reniform. κάπτω mordeo ob vim urentem. vel capsa ob fructum formam capsul. sem. acredini intolerabili sola capsula tolerabilis saccharo conditur et comeditur ad flatus discutiendos fauces ardentes reddit et dysenteriam creare potest.

6 Nymphoides fl. mf. fr. seu theam capsule oblong. compressam mollem unicapsula, sem. calyptra invol. quasi ad nymphæam accedens differt flor. fr. et sem. flos est pelvis 5° partit. calyx pariter 5 partit. ad basim. nymphææ vero flos est pluribus foliis constans et fructus nymphææ multicapsul.

murg. 7 Cyclamen pain de pourceau fl. globoso in 5 ptes sursum revolutas pl̄q sacto fr. fere glob. m̄bran. multifariam dehiscen. sem. utpl oblong angul. placent. affixa κυκλος circulus propter radices et folia orbicul vel angul. ex albo et vario pleq variegat. rad. utpl. tuberosæ flores caudæ affix.

8 Moschatellina ob odorem moschi fl. rotat. multif. fr. seu bacca succulent sem. utpl. cpressis, 4 or 4or lini semen referunt flores in capitu collecti. vulneraria, detergens resolvens

S. 8^a

flore rotato cujus calyx abit in fructum

Pimpinella pimpinelle fl. ad centrum usq pl̄q 4 partito stami. plur. vel pist fimbriato calyx abit in fr. utpl. 4 angul. utrinq acutum modo 1 modo bicapsular. sem sæpe oblongis fol. conjug. ut pl. nihil. semina in spicam ordinat sale essentiali acido, incidit aperit et simul astringens sanguinem purificat infusa frigide catuli venenum educunt in decocti aperientis et vulnerariis tam interius quam exterius hemorragias sistit

28

labiatis flos nullo odore calyx tum odore donat gravior quo a fecundatione minus removentis

Classis 3a 29

flore monop. anomali ex iis alii per sonati qd faciem seu rostrum aalium rictu et labiis referant a labiatis differunt capsula seminum a calyce omnino diversa cum labiator. capsula prius fuerit calyx florum

S. 1a

flore monope. anomal. aurito et cucullato
quorum fructus ad basim pistilli
Arum pied de veau fl. auris asini vel
cucull. tantum pistum terminatis unum opiculos
lepor. fma pist. plur. embry. stipatum qui singuli abeunt in baccam fere glob. 1 vel 2o sem subrot. fol. ō divisa vel leviter incisa,
succus sale suo corrodit, radix dissolvit lympham viscosam vesiculas pulmonum ambientem in asthmate tussi inveterata ex radice extrahitur fecula quae sale inhibitationi detergit, aperit obstructiones rasurat

2 Dracunculus serpentaire fl et fr. ari fol. vero in varias et profundas lacinias dissect et caulibus maculatis
aperit detergit, purgat bechicum est et radices in morbis cutaneis proficua

3 Arisarum ab aro et dracunculo diversum flore cucullato inferius clauso superius aperto et recurvo

S. 2a

fl. tubulato in linguam desinente
cujus fructus calyx abit in fructum
ter Aristolochia fl. ply adunco fr. mbran

Cl. 3ª

30 utpl. glob. ovat. vel cylind, in 6. local div. sem. compressi et sibi invicem incumbent
ἀπρεας optimus ΝΟΧΞΙΑ quae partum sequuntur qd puerperis opitulatur
anti hysteric acido satis volatili aperit, detergit calefacit, menstrua vocat, lochia etiam pellit vel pulveratio radix vel infus caulis et fol oxtus ad gangraenam sistendam

2 Rapuntium fl. tubul. vel sulcato in plu. partes lunguit. digitatim div, vagina munito quae post excipit fr. calyx abit in fr ~~[illegible]~~ ~~et~~ in 3ª local div sem. utpl. exiguae placent 3ª. affinis differt a campanula et rapunculo floris fma. lacteo it. a trachelio semine et floris ordine divisionum

S. 3ª

fl. anomalo utrimque patente tubulato.
cujus pistill abit in fructum

Bignonia fl. tubul. et quasi bilabiato fr. seu siliqua septo intermedio in duo divi sem. ut pl. compressis utrinque alatis ~~[illegible]~~ ut abbati bignonio singularem observantiam testificaret tournefortio

digitalis minim. gratiola dicta Cl. 3a habe a nuove chom pag 31

Digitalis fl. tubul. et quasi bilabiato fr. seu test e rotundo acuminat bifariā dehisc in duo locul. divis. sem. ut pl. exiguis, a simi litudine floris cum digitali quo mulieres uti solent in anglia huius plantae familiaris est usus in epilepsia itali vero ... ... ulcera
gratiola ab aliis digitalis speciebus distinguitur foliis oppositis

Scrophularia fl. plerumq. glob. in 2o veluti labia secto quorum superiori subsunt duo foliola fr. seu test. e rotundo acumi. bi fariam dehisc, septo intermed. in 2o divis, sem ut pl. exig. placent affinis odore foetido ad sam buc. accede. a scrophulis quas sanare di- citur ... aperit, resolvit potenter detergit radix fol sem ... fol. ... in ulceribus cancrosis haemorroid ... pedum ubi discutiendum resolvendum et maturand rad. in pulver optim. remedium scrophulis ... ...

Pinguicula grassette fl. violae fimum aemulante veluti bilabiato in caudam desinente fr. seu test. bifariam dehisc. sem. exig plaum affix. ab humore pingui quo folia aspergunt vulneraria astringens

Antirrhinum mufle deveau fl. tubulato personato

in duo labia divisto. sup. bifid. infer. 3partitum fr. seu test. calvariae sudllae aemul septo intern. in 2° div. sem. utpl. exig placent affixis. pars posterior floris tanquam mamma. qua differt a Linaria cujus pars posterior floris in caudam desinit

Linaria fl. posterius in caudam desinit ante in 2° labia divi. sup. bif. vel multipar inf. 3 fariam secatur fr. seu test. subrot septo intern. in duo div. sem. modo perforata trifor aut quadrifor compressis et marginatis modo angulatis et subrot plam affix. locul. diversi modo rumpi solent sem. effundere a lini foliorum similitudine

Esula lactescit sine lacte linaria crescit emollit resolvit aperit in hydrope ictero hepatis obstr in mixtione difficili, applicatur abdomini in stranguria aux in haemorrhoidis succus vel aq. stillat inflam. sunt convenit

Asarina antherrini floris aemul. fr seu test. subrot. septo interm. in 2° divi, sem placent affixi loculam. varie rumpi solent ut linariae fructus ad asarum accedit foliis flos cauda caret qua differt a linaria. ab anthirrino fruct calvariae sallae non aemulans

Pedicularis fl. in duo labia distus sup. galeat. inf. pleq 3 parti. fr. oblong compressa acuto bifariam dehisce. in 2° divi sem. oblong vel compressis et marginatis. ex dodoneo q^d pecori ac

jumentis pediculos gignat, ex lobel. qd pediculos enecet, ex raio qd folia rugas pediculis similia
sunt hujus generis species quorum pistill. abit in fr. vel. m compressum subrotund in duo loculam divisum apice et latere dehiscent

Melampyrum fl. in 2º labia fere juncta sup. fornicatum compressum in supremo parte galeat. inf. plerq integ. fr. seu test subrot bifar dehisc. septo int. in duo div. sem. granorum tritici æmulis πυρος triticum μελας nigeri

Euphrasia fl. in duo labia ~~[illegible]~~ sup surrectum et multi-sectum inf. in 3. ptes æ singulæ bifidæ fr. seu test. oblong in duo div sem. exiguis. fol venosis et incisis. a melampiro et pediculari differt floris forma.
acido medicari, aperit ophtalmica et pulvis vel aq. stillat in in flam et caligine oculor.

Polygala fl. post. ō perforat. ant in duo lab. sup bifid. inf. pulchre fimbriatum fr. compressum bifariam dehisc. in 2º divis et sem. oblong fr. involutr calyce ex 5 foliis constant 3. ba exigui 2. bu amplioribus quæ fr. complectunt alarum instar πολυ multum γαλα lac
succus per alvum purgat obstructa solvit antipleuritica [illegible] Seneca [illegible] hanc mirifice contulit contra [illegible] a somnte [illegible] quæ sunt eadem ac [illegible] et [illegible] revera feliciter in plenitudine [illegible]

Adhatoda in 2° labia sup. vel adun cum vel sursum ad posteriora revolutum inf. 3partitum fr. clavae-structum div. 2° lon div. bifar. dehisc. sem. utpl. compress et quasi cordifor.

Orobanche in 2 labia, sup. galeat, inf. 3partit fr. oblong unicaps. in 2a velut ca rinas dehisc. sem. utpl. minutis. ὀροβον ἄγχειν orobi angina qd orobum et vician caeteraque legumina inter quae nascitur strangulat. flos videtur unicamodo

dr caules squammosae foliis destitutae

dicunt pastores quod ubi vaccae hanc plantam comederunt statim tauros prosequuntur

ab orchide distinguitur foliis

Phelypoea fl. in 2° lab. sup. bifid. erectum. inf. 3partit. fr. subrot. bifar. dehisc. sem. utpl. exig. ab illustriss. phelipaeorum gente

Dodartia fl. in 2° lab. sup. bifid. inf. 3partit. fr. seutest. subrot. in 2° locul. dit. sem utpl. exiguis a dionisio dodart doctor medi par.

Morina fl. tubal in 2° lab. sup bifid inf 3partit caly. plery bifid insidet tenero fructui qui in alio calyce tquam in theca recondit sem utpl. subrot et angul. a lud. morin d. med. par.

Anblatum fl. lab. ut plur. indivisa fr. in calyce reconditum bifid. sem. subrot. ex ohn sine blat. folium

Elephas fl in 2° lab. dist. sup probos eidem refert elephantinam inf. multif divid fr. in 2° locul. divi. sem. utpl. oblong. a simi litudine floris cum capite elephanti

S. 5ª

fl. in annulum desinente

Acanthus fl. anterior pars 3 fariam ddividit, post. in annulum desinit staminib labii sup. locum occupantib apices q scoparum calici foliis variis formicatis ad ... superioris floris aemulos sustinentib fr. glandifo. calyce obvolut et in 2° div. sem utpl gibbis foliorum fine dignoscit adeo venusta ut columnarum capitulis insculpi soleat
sulso acri nitroso tumores discutit flatus folia in decoct ut malva emolli. et in usu in inflammat tumor

Calyx ttum odore pollet fecundationis tpore

Classis 4^a 37

De flore monop. [anomalo] labiato labiatus dr qui inferne tenuato in fistulam sup. in labium ampliatr 1 vel 2^m. huic pprium est 1° ut calycem habeat 1 folium plq tubula vel cuculat. papyraceum, 2° ut pist cui 4^or embryones adhaerescunt abeat in fr. ex 4° sem. in ipso calyce maturos. quo distinctur a flore personato cujus pist. abit in capsul. a caly. longe diversa. differt a flore rotato vel infundibul. cui succedunt 4° sem. qd floris labiati labra rictum habeant vel faciem larvae vel ludicrae cujusdam personae vel rostri avium

§. 1^a

fl. cujus labium sup. galeatum vel faliat

Phlomis fl. labium sup. qd galeatum infer. tot um incumbit tripartito et crenulat exuberanti. [ad pornum reflex] capsula seu tubus pentago. qui calyx floris fuit in quo sem. recondutr
vires sunt lamii et galeopsi succus emolliens

horminum [cormin] fl lab. sup. parvum et galeat [minus quam in sclarea et duo lateral. minor] inf. in 3 ptes div. media cochlearis instar excavata sem 4^or subrot. in calyce seu capsula recond. opus in impetu feror in vino bibitum venerem stimulans dr.
in vino ebullitum stomachum calefacit mulieris sterilib fluore albo laborantib conducit. pulvis folior. sternutatoriis et cerebrum purgat

Sclarea orvale toute bonne. lab. sup. falcatum quam inf. in 3es ptes divi, media cochlearis instar excavata sem. 4or subrot. in capsula que fuit calyx recondita
aperitiva antihysterica in partu difficili menstruis retentis fluori albo convenit antiepileptica, venerem singulariter stimulat folia in infus. extus applicata tumores resolvit furunculos solvit. sem. ophthalmic humidum oculi extrahit

Salvia sauge lab. sup, modo fornicatum modo falcatum inf. tripartitum exuberans nec cochlearis instar excavatum ut in hormino et sclarea sem. 4 subrot. in capsula recond. st stamina os hyoïdes quodam modo representant a salvando qd pluribus morbis succurrit. odore quodam graveolente aromatico fol. rugosis ... calefacit roborat spiritus excitat summum cardiacum et cephalicum in paralysi, lethargo, apoplexia epilepsia vertigine, leucophlegmatia virginum cachexia podagra in affect. ... mensium et urin. suppress. stomachi debilit. colica et ...

Cur moriatur homo cui salvia crescit in horto contra vim mortis non est medicamen in hortis

Dracocephalon. lab. sup galeatum, inf 3 partit. in fauces desinunt speciem capitis draconis praeseferunt sem. 4 oblong. et angulos. in caps. recondit. quae δράκων draco κεφαλὴ caput

Cl. 4.º 39

tubus in part. posteriori inflect. ...
Cassida *la toque*. lab. sup. galeam cum 2^bus auriculis refert. inf. plerumque bifidum
calyx bilabiatus
calycis pars sup. est cristata sem^t. oblong in caps. recond. capsul. galeâ caput muniens
vocatur etiam tertianaria quia succus ejus ad ℥iii aut iv aut fol. infus aut decoct ad m. z. febr. intermitt. effica cum amara sit et allium redoleat videtur vulnerar. detergens

Brunella lab. sup. gal. inf. 3 pti media cochlearis instar excavata sem. subrot in caps. recond.† flores dense in spicam dispositi
† quae floris calyx fit bilabiatus. superius tripartit inferius bipartit.
eor stamina ad ossis hyoidis fig. accedit ut du hormino sclarea salvia. eo quod faucium et linguae affectib. medeatur. sed potius malo castrensi germanis bräüne
vulneraria astringens fol. et rad. mira praestant decocta in haemophthisi urinis sanguinolentis mulierum profluvii, sanguinem sistunt rustici hanc tritam vulnerib. applicant sistit sanguinem et etiam sanat

S. 2^a

flos cujus labium superius cochlearis instar excavatum.
ortie morte
Lamium lab. inf. bifid. cordifor. desinunt ambo in fauces marginatus calyx tubul et 5 partito sem. triangul. in capsul. recond.
foetida
fol. ad urticam acceden. et freh^dis sed galeopsi etiam convenit. sem. ... crass. decidua. calix latus
antihisteric. et astringens fol. et fl. in fluore albo extus fol. caulis succus semen resolvunt in aceto macerata. oleum olivar. in quo flor. infunduntur balsamum vulnerariis tendinum optimum

Moldavica lab. sup. ō nihil-fornicat. bifid ac sursum reflex. infer. bifid pariter desinunt in fauces marginatus caly tubul in duo labia pleq inaequalia secto sem. oblong in caps. recond.
melissae vires praese fert

Ballote marrub. nigr lab. inf. in 3es ptes divis. media ampliori et cordifor. sem. oblong. caps. tubul pentagono 5e partita differt a marrubio flor. -alb- formâ
in oleo ebullitum censetur optimum squinancia interdum non dat ob foetum odorem et acredinem extus resolvit et anodinum est in vaporibus histericis convenit ob foetorem

Galeopsis lab. inf. in 3 ptes div. medium ampliori acuta vel obtusa sem. oblong caps. infundibulfor. et 5e partita ae fl. calyx fitt γαλῆ felis qd ejus flores felis faciem repraesentare dr. labium super. surrectum cochlearis instar excav.
capsula est tunc cum infundibuliformis et quinque partita
virtutes lamii habet
a balloti differt capsula quae infundibuliformis aut campaniformis

Stachys lab. sup. surrect. emarginat. lab. inf. in 3 partes divis. media cæteris ampliori sem. subrot. in caps. recond. folia villosa incana Στάχυς spica
Lab. sup. cochleari instar excav. spica longa
adsunt foliola duo basim foliorum munientia
grave olet inde antihisterica antiaproplectica et antiepilep
fol. in decoct menses movet secundinam expellit
una species vulneraria

Cardiaca agripaume. labium sup. imbricat. longius inferiore 3 partito calyx est tubus brevis sem. angul totam caps. occup. Καρδία cor quasi ad cordis affectus valens fol. ad ranuncul. vel aconit accedentib. subrot. profund incis. flos villosus calyx spinosus alexiteria stomachica antihisterica aperitiva in decocto fol. contusa vulnerib. et contusionib. optima

Leonurus queüe de lion lab. sup imbricat. multo longius infer. 3 partito sem oblong caps. tubul. λεον leo οὐρὰ cauda a cardiaca differt capsulae fina ꝏ tubus admodum longus est

Molucca lab sup excavatr lab. inf 3 partitum media emarginat sem. angul. caps. campaniformis a moluccis insulis unde delatum distinguitr fol rugosis
melissae vires habet

Cl. 4a

12 Pseudo dictamnus lab. sup. fornic. plex bifid. inf. 3partitum sem. oblong caps. ... infundibul. qd foliis canescentib et subrot. dictam creticum referat fol hirsut. fl. c fol. alis verticill calix decem dentatus

Pulegium pouillot non differt a mentha a pulex pulic. ejus fumo pulices fugare dicit.

Mentha lab. sup. fornic. inf. 3partitum sic tn ambo secant ut flos 4partitus p. aspectu videat sem. in caps. dentata recondit. odore quodam aromatico pp̄rio dignosci solent spiritu acido oleoso aperit incidit resolvit, stomachica antihisterica. oleum dat in oib vulnerib et contusiōib optimum lac in mammis grumescum resolvit aq. still. stomachica. syr. in haemoptysi, in fuxu pueris vermes necat fluorem album sistit

Marrubiastrum lab inf. in 3a crenas lab. sup. [illegible] excavat div. sem. subrot. est floris facies quaedam pp̄ria qua differt a galeopsi. calyx sulcatus vires ut ballote

Lycopus. fl quodam modo campaniformi vix in labium sup. disgit a partib labii infer. adeo ut flos 1ii partitus videat sem subrot λυκος lupus πους pes. fl. verticill. in fol. alis

fl. labiato cujus labium sup. erectum est
Sideritis crapaudine lab. inf. 3 ptitum
sem. oblong. fl. verticillatim dispo. in alis
folior. duo sunt foliastabulatis quae plerumque cristae modo incidunt et a foliis
caeteris differunt qui alarum differunt distinguit odore faetido sicut lamii σιδηρος ferrum qd vulnera
sanare dr. labium sup. surrectum bifidum vulner. aromat.
vulner. detergen sub forma cataplasm. in vulner. et herniis

Marrubium fl. lab. sup. surrectum
et bicorne inf. 3 ptitum modum aung... cal. lab. dentat sem. oblong.
fl. verticillat. caulis minor quam stachys in cau dentat rugos. obtus. grave olens calyx [illegible]
acido oleoso satis volatili incidit, aperit antihiit. fol
et summit praesertim in aff. hypochon. pass. hist.
levis decoct in asthmat tussi. syr. cum ferro ad menses
morandos

Melissa lab. sup. subrot. bifid. infer. 3
ptitum calyx habet bilabiat inaequaliter sem. subrot. fl. in folior. alis nasci
non omnino verticillat. μελι mel qd apes
ea maxime delectentur. fol citrum redolent, calaminth significantia majora
antihisterica stomachi. ejus aq. magistr. cum aliis
indutis optim. in apoplex. lethargo epilep. vapores
colica mensium suppressi et urinae. extus fol in
cataplasm in balneis pedum

Calamintha lab. sup subrot bifid
inf. 3 ptitum sem. subrot. flo. in folior. alis
nasci pediculis ramosis insidentes prae differt a melissa καλος pulcher
μινθη mentha calyx bilabiat. lab. sup. trifid
inf. bipart ut plerumque in fl. labiatis
cephalic et alexiter acido volatili oleoso aperit calefacit
discutit in decocto melius in infuso quia aromatica
vapores histericis morbis cerebri

inter ejus species calamintha humilior Ciarre terrestre

44 menses et urinas movet Cl. 4^a

Clinopodium lab. sup subrot. plerumque bifid. inf. 3 partitum sem. oblong. fl. verticillatim dispo. quo differt a melissa et calamintha. χλίνη lectus πους pes et cephalicum

Rosmarinus lab. sup bifid. et sursum versus posteriora revolutam cum staminib aduncis inf. 3 partitum media cochlearis instar excavata caly. bi vel tridentatus sem. subrot. flores inter folia mixt caulib altis duris frutescentib fol. atro virentib angust subtus incan oblong. camphoram olentib fl. infus in deliquium super. vin. sedatt in usu oleo essen. volatili cum acido volatili aperit cephalicus antihistericus optimus in affectibus nervorum et vertigine cor. apoplexia epilepsia paralysi colica memoriae debilitate foetorem oris et anhelitum emendat flores dicti anthos per excell in conserva - et aq. de regina de hungrie

Thymus lab. sup subrot. plerumque bifid. inf. 3 partitum caules duri, lignosi flores in capitula collecti e foliis prodi. θύω suffio vel θυμός animus qd animum addat

acido volatili in oleo ess. aperit, discutit, calefacit cephalicum et stomachicum est, venenatorum aliorum morbibus medetur in vino infusus in rabie canina laudatur in pituitosis et frigid morbis asthmat. tussi sedatis externe dolorib arthritici

Serpillum serpolet differt tum a thymo caulib. humilioribus minus duris ac lignosis ἕρπω repo
cephalicum odore solo cerebrum roborat aperit incidit sudores et urinam movet vino infus. chlorosi conducit menstrua movet, rupturas internas sanat. folia macerata melle edulcorata tussim inveter. pellit. extus in cephalalg. vertig. ol. vel aq. dist. affectib. supor. epileps. paralysi linguae.

Satureia sariete differt a thymo floribus sparsim in folior alis nascentib. non vero in capitulum collectis a calamyntha florib. pedialis non ramosis insidd. a thymbra fl. non verticillatim dispositis

cephalica stomachica aperit, phlegma pulmonum renum incidit urinas menses movet maxime venerem excitat et satyriasmum in affectib. soporosis utiliter usurpatur peratilis in gargarismate valvae in inflamatione uvulae et amygdalar

Thymbra differt a thymo satureia calamintha fl. verticillatis
easdem habet virtutes ac satureia

Lavendula lab. sup. subrot. plerq bifid. inf. 3partitum. fl. spicae in modum verticillatim summis caulib. et ramis innasci a lavando qd ex ea parentur balnea
praecipua cephalica; cerebrum et cor languor dum excitat in lethargo apoplexia paralysi et epilepsia laudatur, fol. et fl. vel sumit. in decoctis cephalicis ol. ess. in affect. cerebri vaporib. hictus epilepsia vocatur huile d'aspic vermes enecat. in vertigine manuum tremore motib. convulsivis paralysi

origanum lab. sup. subrot. bifid. inf. 3 ptitum sem. subrot. fl. in spicis squamosis brevib. in capitellum muscarii aemulis nasci ὄρος mons γάνος laetitia
aperit incidit flatus discutit, antihisterica, stomachica cephalica; fol. instar the in asthmate tussi vic lenta mensium suppress. succus melle edulcoratus in pulmonis aposthemate asthmate; ictero sudorib. eliciend morbis soporosis histericis. aq. still. ol. spi. consuma calefacit roborat alexiter

majorana marjolaine differt ab origano capitulis rotundiorib densiorib et brevioribus ex quaterno ordine squamatim positor. c. flatus calefacit cephalica, histerica bechica et sternutatoria specifica dr in catarrhis vertigine dolorib capitis morbis soporosis ab obstructionib epilepsia, apoplexia cnea extractiv per nasum hauriendo in off. cerebri

verbena verveine lab. sup. plerumq bifid. subrot. inf. 3 ptitum sic tn secantr ambo ut flos 5e ptitus 1o aspectu videatr sem. tenuia oblong totum caps. occupantia fl. spicatim" ut pl. nasci o tn verticill. quoq in capitulum dispond " sine foliolis ut in origano fol. ουγος profunde incisa
aperit detergit ophtalmica febrifuga roborat antihisterica, infusa chlorosi ictero pulverata hydropi; instar the pass. hister. decoct. gargaris amygdalar ulcera curat, extus cataplasmat semen pleuritidi itam dolorib. lienis, in nigrorum ulcus ovi albumine cap. applicatur. aq. stil. o ... sirupus

hyssopus lab. sup. subrot. bifid. inf. 3 ptit media cochlearis instar excavata bicuspide et quodammodo alata sem. oblong fol. longis angust. et odore grato. fl. in spicam nascentib. ex una et altera caulis parte inter folia aperit incidit discutit cephalic. antiepilepticum pect. H in decoct aut infus extus detergit, resolvit anodinum et

vulnerar. fol infus. melle condita optimum bechicum

Stœchas lab. sup. bifid. inf. 3partitt tu flos 5partitus videtur sem. subrot. fl. varia serie disponi in capitulis squammosis e quorum ca cumine aliquot foliola eminent visui grata quæ clusius membranacea ligulas vocat a stœchades insula nunc lerites dieres e regione telonii summitates in usu aperiunt, incidunt, affectib cerebri, apoplexia paralysi vertigini; asthmati tremoribus affectib. hypocondriacis optim. syr. fernelii in asthmate tussi

Cataria herbe aux chats lab. sup. subrot bifid. inf. 3partitum media cochlearis instar excavata cæteris tquam aliis orificium intra duo labia positum cingentib. sem. subrot odore quodam proprio acri et aromatico foliis canescentib. odore graviori quam mentha a cato seu fele qui ea delectatur antihister fol, et summit in decoct in pediluviis anti hystericis adhibetur

Betonica lab. extrorsum optlexus sup imbricat. plerq bifid inf. in 3partes div. media ampliori et bifid, sem oblong. fl. verticill. et summis spicatim caulib caulib simplicib non ramosis foliis ornatis ex plinio avetonib hispaniæ populis cephalica. calefacit attenuat roborat aperit fol in decocto instar thé leviter ebullita, morbis cerebri, vertigini migrenæ medetr

Ocimum basilic. lab. sup. subrot. crenat et amplius inferiori qd plus crispum aut leviter incisum sem. oblong. capsulath duo labia div. quor. sup. surrectum et bifidum infe. multifidam incisum. odore quodam proprio aromatico et suavi ὠκέως qd semen ejus uto satum erumpat. flor spicatim et late dispos fol. fl. sem. cephalica bechica cardiaca in infuso instar thé in capit doloril; siccata et cum aliis plantis aromaticis pulverata ponit pulverem cephal naril instar tabaci hauriendum. serum cerebri optime purgat.

S. 4.[a]

fl. unilabiato

Chamaedrys germendree stam. labii sup. locum occupant lab. inf. in 5e divi, media ampliori cochlearis instar excavata qdoq bifida caeteris in floril cervice e regione positis sem subrot. fl. in foliorum alis. calyce tubulato Χαμαὶ humi Δρ 8ῦς quercus folior. sim. praestans est febrifugum diureticum sudorificum virtutes easdem ac centaurium minus habet ambo infus febres pertinaces, vermifugum. vulnerarium

Polium stam. in locum lab. sup. inf. in 5e divi. ut in chamaedr fl. in capitul collect summis ramis et caulib πολιὸς canus ex dioscoride corymbos habet, caesariei canae similes. fol. plena y incan canat aperit cephalicum summit in infus instar the viscerum obstructi icterum curant menses movent in affectib sopor. epilepsia plurimum conducunt.

Teucrium grosse germendree sta: lab. sup loco. inf. in 3e div. mediâ ampliori excavata caeteris in flo. eade eregione positis caly 5e fidus campanif sem. subest caps campanif. à teucro nom. stomachic incidit vulnerarium est, aperiens, agit ut chamaedris extus etiam applicatr cum aceto contra morsus serpentum

Chamaepitis ivete lab. in 3 div media bifida. lab. sup. occup. dentical locum sem. oblong fl. sparsim in fol. alis o vero vertillatim χαμαὶ humi πίτυς pinus ob odorem resinosum
aperitiva vulneraria est febrifug. antihisterica cephalica antiparalytica; specifica habet pro arthritide dolore ischiatico sed praecipue ad menses ciendos

Bugula bugle lab. inf in 3e div. media bifid sup dentical. loco labii sup sem. subrot. fl. verticillat flos in fol. alis minor. sunt caules duo unus repens alter tehugon caulis vulneraria est subastringens. folia et flores in infuso pro dysenteria floribus albis. mulierum pro fluorib.
qui connoit la bugle et la sanicle
aux medecins fait la nique

Chamaelea fl. tripartito ut 3bus constare videatur fr. tricoccum seu ex 3. ossiculis tenui cute obvolutis subrot. sem. oblong
fol. fortiter purgant

Ageratum fl. personato inf. tubulato sup. in duo veluti lab. div. sup. bifidum inf 3partitum fr. oblong membran in 2. div. sem. tenui plaunt. affi:
acido volatili oleoso detergit incidit calefacit roborat fol. et flores in decoct aut infus in hepatis obstructionib

Cuscuta fl. veluti campanif. multif. fr membran subrot. angul. capsul. sem tenuiss.
acido volatili acri purgat in infuso aut decocto

Coris fl. person. post. tubul. ant. velati flabelli for. fr. fere glob. in mult partes dehisc. sem subrot in ipso calyce recondita

52. Clandestina fl. person. inf. tubul. sup. in 2° labia div. sup. fornica. inf. 3 ptitum calyx tubul. crenatoq. fr. oblong unicapsul. in 2as ptes dehiscent. vi elastica sem. subrot. pro pellentes

Melocactus fl. campanif. tubul. multif. fr. moll. olivæ æmulum carnos. sem. exiguo fr. in plur. in capitulum qddam elegans colligi solet iisdem pollet viribus ac melo ejus fructus edulis sapore subdulci granulis arenosi plenissimus

Ananas fl. veluti infundib. 3 ptitus tuber culis embryonis innascente fr. carnos turbinat. succi plenum sem. exquis renifor. calyptra obvolutis

Tithymaloides fl. anomal calceolum quendam referente fr. tithymali æmulum

Abouai fl. infundib. multif. fr. carno quodammodo pyrif. ossiculo fere trigono nu cleum condente

Acajou fl. veluti infundib. multif. pist capillamentis stipatum fr. turbinat. moll. capsu reniform. sem. etiam reniform.

Genipa fl. campani. patente fr. plerumque ovatum carnos. in 2° div. sem. ut pl. planis

Manihot <u>cassave</u> fl. campanif. plerumque patent. multif. fr. subrot. 3^{bu} capsul. simul junctis oblong. quae singulae nucleum condunt oblong.
radix recens [illegible] venenata sed contusa et [illegible] in farinam redigitur ex quâ fit panis quo indi vescuntur

54 Plumeria frangipanier fl. infund.
multif. fr. siliquos. plerq. geminum perlongi
tudin dehisce. sem. oblong. foliatis squamatis
posit. placent. affix. a plumerio botanico regio

Classis 5ª

De herbis quar. flores sunt cruciformes id est ex 4.or petalis crucis in modum positis semper pistill abit in fructum qui surgit in medio calycis quadrifolii sicut flos.

sunt tres fructuum differentiæ 1. alii una cavitate donantur 2° alii secundum longitudinem in duo loculamenta, septo intermedio membranaceo dividuntur 3° denique sunt quædam articulatæ, semen unicum in quoque articulo includunt 4° unica planta cruciform. cujus fructus solidus in quo nidulantur nonnulla semina 5 quædam in ca

omnes cruciferæ acri sapore plus minusve donantur

Classis 5.a

de flor. polypet. cruciform.

S. 1.a

pistillum abit in fruct. unicapsul. ō siliquosum

Jonthlapsi. fr. planum orbicul. clypei form. sem. orbicul. et plano

Rapistrum fr. seu test. fere glob. sem ut plur. singulari. quasi ad rapam accedens

Myagrum sem. oblongo. 2. loculamin ... ad apicem instructum ... via musca ... capto quasi glutine muccas cap. qd ... ei evenit

Isatis pastel. fr. lingulatum ad oram compressum bifariam dehisce. sem. ut pl. oblongo trita et tumoribus applicata potens est resolutivum fol in infuso variolas pellunt utuntur rustici e gallis provincia in itero
ex isati Latifolia colligitur succus exsiccatus qd dr pastel cujus ope panni color flavus conciliatur

58 Crambe fr. seu tost. bifariam dehisc. [spongiosa]
sem. utpl. oblongo

Cl. 5.[a]

S. 2[a]

fr. satis brevem bifariam divisum septo intermedio respectu valvarum ad perpendiculum oblique posito

Thlaspi. fr. subrot. plan. [flosculus nunc aequal. nunc inaequalis] ora plerq. foliata [emarginata] sem. utpl. planis, folia indivisa qua differt a nastrutio θλάω premo ob fr. planum antiscorbuticum diureticum, alexiterium venerem stimulat. acre et pungens masticatorium salivans tanta ejus vis ut venenum suceptum sudoribus aut transpiratione expellat hinc contra pestem et morsus rabid.

Nasturtium [cresson] fr. subrot. plan. sem. utpl. plan. fol. multifida qua differt a thlaspi folia trita verrucis applicata optime conducunt [sem in emuls. variolas expellit] aperit diureticum, stomachicum antiscorbuticum antihistericum; sem tam intus quam extus mirifice in herniis cresson d'eau nasturtium hortense cresson a la noix mucum venenum et pulmonum resolvit obstruct. lavat fetum mortuum expel

Thlaspidium fr. gemellum plan [herbe aux lunettes] [conspicilor in modum] sem utpl. oblon. compress. quasi ad thlaspi accedens

Cochlearia herbe aux cuillers fr. fere glob.[vasium] sem. subrot. qd ejus folia cochlearis instar quodamodo excavata. caules humiles folia subrotund. crassa succosa antiscorbuticum praecelebre sem. rad. fol. principia volatilia quibus constat in causa sunt cur in infuso potius quam decocta usurpentur sanguinem dissolutum reddit mitiorem stomachicum et bechicum propinatur phtisicis appetitum movet

Lepidium [passe rage] fr. lanceifor. sem. ut pl. oblong λεπις squama qd squamas et maculas faciei auferre dr

aperit aptim. in scabie impetig. antiscorb radix et fol. incim. sal. piperis et sinap. acore pollent in decocto pro scorbuto siccata et pulverata hydropi conferunt radix resolvit et lenit trita cum butyro sicut et folia in cataplasmate ischiatici et podagrae conferunt

Bursa pastoris tabouret fr. planum ora supremâ scissum triangul. isoceles inversum refer. sem. exigui. a fructus forma qui ad marsupium accedit

acido austero astringit, vulneraria etiam est succus in ptisanis. exhibet. utilissim in mulierum pro fluviis in gonorrea sub finem cum jam limpida sit et post panaceae usum fit epicarpium ex tota planta

Cakile fr. hastae cuspidi simil. ex 2.bus ptib constant articulat. quadam conjunctis sem. singular. plerumque oblong. differt a crambe ex 2.bus ptib constante articul. connexis

fr. septo intermedio valvis parallelo bi
fariam divisum
Alysson fr. satis exiguum compressum et gibbum
sem. subrot. non marginat. differt a thlaspi septo intermedio
fructus parallelum in thlaspi vero perpendicul. obliq.
ab alyssoïde valvis minus concavis
abstergit adversus canis rabidi morsus commendatur
unde nomen.. specificum hydropi ab antiquis

Lunaria balbonac fr. sicut siliqua omnino plan.
septo int. valvae mbranaceae adhaerescunt et
parallelae sem. atpl. renifor. et quasi margin
a luna propter siliquae formam
aperit vulneraria est astringens extus applicata
vulnerib. consolidandis herniis puerorum optima
in cataplasmate

Alyssoïdes fr. fere ellipticum tur
gidum crassum satis. sem. orbicul. plan
marginatis quasi ad alysson accedens
ab alysson differt quod fructus sit turgidus et orbicularis
et seminib. compressis et alatis

S. 4ª
Pistillum siliquosum bicapsulare
Brassica chou fr. seu silig. long. teret.
cylindr. septo intermedio cui valvae imbricatae
utrinq. adhaerescunt sem. subrot. fol. plerq.
rugos, sinuat. et caesiis Πραϐιχη olus. per excell.
brassica capitata rubra resolvit confert in pulmonum
affectibus in ptisana

Leucoium <u>giroflier ou violier</u> fr. long compress sem. plan. orbicul ut pl. marginatis λευκόν ἴον viola alba
anti histeric cephalicum fol. et flor. vino alb infus nondum menstruatis mensem ciet, decoct uteri inflam intus, extus vero fomento conducunt oleum flor. discuti in paralysi apoplexia partic difficili

hesperis <u>juliene</u> fr. seu siliq. long teret. cylindr. sem. oblong. cylindr. aut glob œ velati nitulante in scrobiculis septi intermedii differt a leucoio siliquis cylindr. sem. tumesc ō marginat
anti scorbutic et diaphor. in asthmat. tussi optima contusa cum vino gangrenae medetr, inflammationi cuivis putredini resistit externe applicata

Turritis tickon de spica differt ab hesperide siliq. plan a leucoio sem. ō marginat. a brassica tum fuco tum siliquis planis siliquae turris inmodum secundum caulem dispositae unde nomen
vires habet erysimi sed debilius

Cardamine fr. seu siliq sem. plany orbicul. valvae per maturit. helicis in modum revolv. et semina orbiculi cum impetu excutere. vocat impatiens herba

quasi ad cardamum seu nasturtium accedens gustu

Dentaria siliqua helicis in mod. revoluta sem. pler. subrot. valv. per maturit. helicis in modum revolvi et cum impetu sem. excut. rad. carnos squamm. et veluti dentibus incidi. a radicum forma quae veluti dentibus incidunt

Sisymbrium sem. ut pl. subrot. est facies quaedam speciebus huius generis propria differt a cardamine valvis vi elastica destitutis a leucoio brassica &c facie sibi propria
vocat. etiam sophia chirurgorum. est saponacea vulneraria, astringens extract flor. et folii. alvi fluxus fluori albo haemoptisi sem. infus sudores movet trita extus applicata ulcera detergit et consolidat

arab Eruca roquette sem. ut pl. subrot. sapor erucae proprius ab erodendo propter saporem acerrimum
salso acido parum volatili aperit ad venerem stimulat antiscorbutica est sem. meliora praestat ad scorbutum quam fol
excitat ad venerem tardos eruca maritos

rho Sinapi moutarde sem. utpl. subrot. septum intermedium in cornu qdam fungosum consimili semine praegnans plerq desinent. sapor acris et foetida Sinapi pprius. cal. patet embrio gaudet nectariferiis basim ejus stipantib quib distinguitur a raphanistro ante fructuum maturitatem hujus enim calyx clauditur.
calefacit aperit, venerem excitat, attenuat, incidit in hypocondriacis inflamaoib ventricul. obstructiois lienis tam interne quam externe convenit in scorbuto rachex. chlorosi affect.s soporosis stomachic antiscorb. diuret. sternutator.

tr Erysimum velar ou tortelle sen. utpl herbe au chantre bechicum
(siliqua [illegible] tereti, angulata). differt ob eruca cujus silig breviores teriores exiq. et rotund. species quaedam erysimo ppria ? salutaris
spuw pter eandem qualitates. salvum ē servo aperit pulmonum et asperae arteriae phlegma dissipat unde bechicum incisivum fol et flor. in ptisanis cum liquiritia in tussi inveterata, raucedine et pulmonis affecti phlegmatico et viscoso comendat iis qui purulentum ma expuunt et sputa viscida attenuat et expellit

tr Rapa rave sem. utpl. subrot. septum intermedium in cornu qddam fungosum ē simili semine praegnans plerq desinentem, radix carnosa tuberosa bechica est acorem asperae arteriae et bronchiarum lenit alimentum optimum et flatulentum bulbus cineribus coctus anodinus in inflammatione aurium cum butyro coctus optim. cataspl. ad tumores emolliend rad. resolu ad perniones

di Napus navet. Itum a rapa div. ppria fredi
bechicum est radix in decocto pro pectoris morbi) ejus syr pro tussi inveterata asthmate. sem salso acido volatili calefacit aperit, urinam movet. quassatum et in vino albo infusum

64 Raphanus *vuifort* Cl. 5a fr. seu siliq. cornifor. crass. spongio. duob. sem. subro. ordinibus mediastino tenui discretis ῥαφανος quia wr facile apparens seu velocis incrementi
sem. opt. ad podagram revocandam, aperit urinas movet diureticus et coctus vires habet napi, succus cum melle pro morbis renum et vesicæ, aq. stillati aperitiva radix trita, plantæ pedum applicata sudores mo in rheumatis. ischiatid.

S. 5a prst. ab. in siliq. articulos

Raphanistrum fr. seu siliq articulos columnæ fasciatæ æmulam sem. subrot in singulis articulis recondit
vires habet raphani minoris

hypecoon siliq. plan. sem. utrpl. renif in singul. arti.
vires habet papaveris albi ex galeno
duo floris folia aliis ampliora tripartito incisa leviter altera fol ad basim tripartit inci.

S. 6 siliq uni capsular

Chelidonium eclaire siliq. valvis fenestræ adhærescentib. sem. utpl. subrot. χελιδων hirundo quod adventu hirundinum erumpat et discessu marcescat
sale acri fixo corrodit, aperit ophtalmicum est aq. distillat inflam. ocul. et ulcera detergit, diaphor succus croceus verrucas ad radicem sectus sanat sicut tithymalus. fol. macerata cum sero lactis et cremore tartari icterum curat.

Sinapistrum fr. seu siliq. cylindrac
bivalvem sem. utpl. subrot. pistill. plurimis stam
coronae ad instar circumdati
iisdem pollet viribus ac sinapi

Epimedium unumquodq fol floris ex duob aliis component cucullati cochlearis instar fl. petal. tubulat. fr. seu silin
unicapsul bivalven sem subrot ἐπι supra μεδιον trifolium
quasi magnum trifolium
Disquido a chelidonio et sinapistro petalis concavis et
3 fol eodem pediculo
refrigerat

S. 7^a fr. in 3^a aut 4^a locula. divis,

Erucago fr. clavae tetrago. et cristatae
aemulum sem. utpl. subrot. et rostratis.
sunt 3^a aut 4^or loculamenta in fructu, quibus nidulatur unicum
semen in singulis

S. 8^a pist. ab. in plu^s sem. in capitulum

Potamogeton calycis exper. sem. 4^or oblong acum
in capitulum collecta ποταμὸς fluvius γείτων
vicinus. fol non incis. et sol secund caules. et deinceps in florum spica
astringit et refrigerant fol in oleo olivarum et
aceto cocto dein in lacte tepefacta podagrae dolores
paulatim levant

S. 9^a pist. ab. in fr. moll

Herba paris stam. interfloris folia angusta plerq 4^or fr. fere glob
in 4^or locul. div. sem. oblong. fol. 3. 4^a vel 5^a
semper opposita ejusdem formae et magnitudinis
rad. fol et fruc. alexiter cephalic resolvens et anodd
trita cataplas paronichio. aq. still ocul inflammat
et bubonib venereis confert

Cl. 5ª

66 Vesicaria fr. seu vesica sem. subro tundis plena dr a fructus formâ

Classis 6ª

Des herbes dont les fleurs sont composees de plusieurs feuill[es] disposees en rose, cest a dire en rond autour d'un centre co[mmun] mais le nombre des feuilles n'est pas determiné on en remarque plus ou moins non seulem^t dans les genres differents, mais dans les e[species] du meme genre. La premiere section sera des fleurs en rose dont le pistille devient un fruit qui s'ouvre en travers comme une boite

folia flori amaranthi non sunt ordinar decidua, quandoq calyce carent distinguitur a blito, flore petaloide in blito vero stamineo

Classis 6^a ^67^
tric requirit petalor in orbem dispos non vero numerus

S. 1^a

De fl. rosaceo cujus pist. abit in fructum unicapsularem bifariam transversa dehiscentem

Amaranthus fl. pluripetalis constante fr. seu test. membranace fere glob. vel ovat. sem. ut pl. subrot

ἄνθος flos μαραίνω marcesco cum ꝑticula privativa. α.. madefactus aquâ reviviscit et hibernas coronas facit flor. e foliorum alis erumpentes et squammis ceteratis cincti. fructus polyspermos bliti vero monospermos
maxime astringit. fol decoctu hæmorrhagiis medent sem ita ut plantaginis in oib alvi fluxib, menses et sguinis profluvia sistit

Portulaca pourpier. caly monophyllo et bifido mitræ faciem referens fr. plerumq ovatum sem. exiguis. duab testis in summo donat quar. ext. quae calycis fuit pars bifida inter. pistill. est ampliatum postremû inferiori seu calycis altera pte pediculo affixa
fol. crass, carnos. alternatim posi
aperit et refrigerat, suc. est ag. Still in febr. calid pleuritid intestinor inflama. bilem temperat in angina pro gargarism in cephalalgia capiti applicat in hæmorragia vermes enecat

S. 2^a

pistillum aut calyx abeunt in fr. unicapsular

Papaver pavot 4^or petal. in orbem caly. bifolins deciduus fr. seu test. ovat vel oblong capitello ornat sub quo qdoq series spiraculorum in circuitu aperitur in fructus cavitatem lamellis munitam spirat odorem somnum inducentem ob mucaginem volatilem. sem ad somnum non inducit sed lenit s̄guinem incrassat in emultione cum sem frigidis
fol cum sale contusa vel cocta mire aperiunt et dolores seda

floris folia tenuia ampla decidua. lacte acri ex flavo candent. somnifer Cl. 6.

67 + quib. squam. placentis adhaerent sem. rotund, a pappo pulli specie cui semen papaveris olim immiscebatur

papaver Rheas coquelico. bechicum flores in infus instar thé in ptisanis et pleurit. idem squinantiam tussim haemoptisim oib. pulmonum affect. extract. somnum lenem conciliat sicut et aq. stillatitia syr. et R

Argemone fr. seu test. plerumq ovatam
onagonic
veluti fenestrat. costis a basi ad apicem protentis quarum intervalla occupant valvae in summo plerumq dehisce singulis costis placentae adhaeresit sem. minuta globos.

Anapodophyllon fr. plerumq ovat
sicut urna — so inversatim ...
sem. subrot. quasi planta cujus folia ad pedem anatis accedunt flores ex follior. bifurcatione nascentes quae bifida sunt
flos polypetalus in rosam disposit. campaniform

Opuntia raquette ou cardasse fr. carnos
ficus — ossoe — carne molli oblect
umbilic. sem. saepe angulatis. circa opuntem beotiae oppidum nascitur ait theophrastus
ejus folia sata radices producunt

Cl. 6.

69

Granadilla fleur de passion calyx in 5 part. ad basin ex caly. surgit pist. corolla fimbriata ad basin; in apyce vero te[...] ... radii horisontales in modum super petal
nero fr. sub embry. instruct. cui insident clavæ tres et subsunt stami. deinde fr. fere ovatum aut glob. carnos. sem. rugo costis tquam placentæ affix. calyptra obvolut. a voce hispana granada seu mali punicæ fructu ad quem accedere videtur aliquid habet acidi quo refrigerant nutrimento optimo inservit

Murucuia caly. 5 partit ad basin multif. fl. medium occupat tubus coni trunci æmulus ex quo pist. cui insident clavæ tres subsunt stami. fr. ut pl ovat. carnos. sem. calyptra obvolut.
a granadilla differt corolla non fimbriata sed conica und. pistill exit

Mitella ranunc petala in calycis incisuris fr. rotundo acumi. bifari mitræ instar dehisce. sem. ut pl. subrot
a fructus forma qui mitram episcopi æmulatur refrigerant restringit sitim et febris ardorem sedat in decoct et julepis ex eupena affectur tincturis inservit

Alsine morgeline + petala incisa quand ry ... caly 5 folio fr membran. subrot. vel conicum apice dehiscent. sem placent. affix. sol plerumq conjugat. distinguitur a lychnide flore
+ stigmata tres fructui incumbunt quo distinguitur a myosoti et a lanychnide calyce polyphillo flore ...
ejus succus squinam increscat refrigerant lenit corrigit acre in phthysi marcore, vulneris pulmonum

70. rosaceo et calyce polyphyllo ἄλσος lucus qd opacis nemorosisq locis gaudet

Alsinastrum calyce monophyllo ab alsine differt a lychnide flore rosaceo

Myosotis oreille de souris fr. cornu bo vili æmul. apice dehisc. sem. exigu. pleru subrot. plant. affix differt ab alsine fructus fima+ μῦς mus ὦτα auris + et s.e stigmatib virec habet auriculæ

pector Ros solis caly. tubul. fr. ovat. vel aum apice dehisc sem. subrot. vel oblong folia villis aspera fistulosa e quib guttulæ emanare videntr a guttis roris quib aspergitr
bechic et cardial. pulverata infuso aut in formam syrupi in asthmate ulceribus pulmonum tussi inveterata phtysi.

Parnassia petalis 5e amplioribus aliis 5e minoribus fimbriat. fr. mbran utpl. ovat sem. 4 valvis pleru plantæ affix a monte parnasso ubi nascitur

Juncus flos 6 petal in stell absque calyce fr. seu capsul. plerūq trigonam trifariam dehiscent. sem. ut pl. subrot. separat. septis a jun gendo ad ligandum
juncus odoratus in morbis contagionis affect. crebri aperit obstruc levat alexiterium est thericam confectiones ingrediuntr flores

Kali soude fr. fere globo. in bran singulari semine fœtum cochleæ ad instar intorto et plerū petalis fl. obvolutum. fol succos flos ex flavo virescent sem nigr.
ex ejus cineribus extrahitur sal dekali cum cremore tartari fiet sel de saignette. decoctum hujus plantæ vel infusum violentissime detergit, diarrhœam hinc nocet in inflammat

Telephium caly. 5o polyphil. fr. trigon sem. ut pl. subrot. fol. alternat in caule. a telephio mysiæ rege
vulnerarium et astringens folia contrita extus applicata scissuris optima tumores resolvunt suppurationem accelerant sub cineribus mortificata valnerib et tormis radix contusa cum butyro ad hæmorrhoides

Helianthemum fleur du soleil caly. 3phill polyphil. fr. fere glob trifa. dehisce. sem. subrot. tenuib capillamentis seu placen. affix. ἥλιος sol ἄνθεμον flos. fol oppositi in caule
vulneratium demulcet in morbis feminum

Androsæmum [toute saine flos 5. pet. uhya 5] caly polyphil. fr. seu bacca fere ovat sem. utpl. exigui; placent. triplici affix. αἷμα sanguis ἀνὴρ ἀνδρὸς vir. hypericum digitis tritum sanguineum succum, qua causa dictum androsæmum
sem. tritum purgat bilem prodest ischiatidi

Leontopetalon pist. abit in vesicam sem. utpl. sphericis radix tuberosa λεον πεταλον folium leoninum

S. 3.a fr. pler. bicapsular
Geum [sanicle de montagne] pist. bicorne fr. oblong [convexe] hydricæ birostratæ æmulum sem. pler. exiguis. fl. 5 pet. anodin. diuret. ejusdem virtutis ac sedum
distin. a saxifraga calyce fructu non obvolvente

Saxifraga caly. multif [acetabuliformis 5 fid.] pist pler. bicorne fr. subrot. bicor. sem. utpl. exig. saxum frangens saxa qd in fissuris rupium vel qd calyx fructum involvit qua differt a geo. virtus ut qui aperit, diuretica urinæ tartarum frangit menses movet mucum pulmonum et asperæ arteriæ discutit viscidit. renum

calculum frangere existimet

Salicaria fl. ex incisuris calycis tubul. nascent. fr. seu test. ovat. bicapsul. sem. utpl. exig. placent. affix. ipso calyce plerumq. obvolut. a salice qd in salictis nascatur
astringit vulneraria est

Glaucium (pavot cornu) 4.or petal. plerumq. cstante caly. bifol.ᶜᵃᵈ silig. long. teret. unicapsul valvis septo intermedio adhaerescunt sem. ut plur. subrot. occurunt et hujus species capsule quadripart. dehiscent. ad papaver aut cheli donium ō referri ptior fruct. formam ideo glaucium seu papa corniculat

S. 4.ª fr. multicapsular

hypericum mille pertuis caly. polyph. fr. plerumq. trigonum tricuspider et tricapsul sem. ut pl. exig. folia bina e regione in caulis geniculis. flores flavi plurib. stam. stirat caput sucus aperit viscerum obstructiones levat arenam urinarum pellit vermes necat sanguinem de vulnere coagulatum dissolvit: in mania melancholia morbo hypochond. deliquis oleum detergens resolvit in rheumatismo ischiatico arthritide humoribus frigid. resolvendis.

Ascyrum caly. polyphill fr. pyramidal, 5 capsul. sem utpl. oblong et exig. à σκῦρος non aspera.

Pyrola pist in proboscidem desinens fru subrot striat. plerumq umbilic pentagon 5 capsul, sem utpl. exiguis a pyro ppter folior similitud.
radices fibros. et foliis stipat
fol. vulner. astring crescit in silvis et locis frigid.
in diarrhoea dysenteria inflam. pectoris. interne in decoc vel decocta in vino exter astrin. ad sanguinem sistendum vulner recentia contusiones

Damasonium trib. petalis in orbem fr. stellifor multcaps. sem. utpl oblong.

Ruta 4or pleruq petal fr. subrot. utpl. tetragon ex 4or capsul. saepe axi affixa. sem renif. aut an gulatis ad classem unu for. pertineret nisi saepe penta petalis Ῥυω fluor fol. (coningunt una in cat cui desinent) color folior. est coloris pyrid... mari
grave olet, aperit detergit discutit antihyster anti epi antispasmod antiphlegis antipestil antigangraenos
fol recentia in vino albo infus aut pulvis siccat menses movet vapores hyster, sedat in epilepsia folia naso gargaris. ad gengivas in scorbuto

Harmala fr. subrot. tricapsul. sem. oblong
folia alterno ordine in caule
vires habet rutæ

Nigella fl. corollâ donato inter petala
et stamina, quam efformant corpora corniformia
fr. mbran subrot. vel oblong superne multicor
nem multicapsul. quasi nigella a sem. nigro
colore. fol minutim incisa. fl. et fruct. ampli
aperit menstrua vocat incidit semen in usu oleum
expressum easdem habet vires in colica ventosa fit
ptisana cum camomela meliloto et sem. nigellæ lac et
sem. promovet ut et exerationem olei asthmati conducit.

Sabago fr. mbran cylindri æmulum
plerumque pentagon. crenat. 5e capsul. 5 fariam dehisce
singulis valvis munitis sem. ut pl. planis. fol
bina e regione in caulium nodis. quasi ad
fabam accedens
aperit detergit; succus subastringens et aromaticus

Corchorus fr. cylindr. æmulu 5 capsul
5e fariam dehisce sem ut pl. angulat. folia
alterno in nodis qu. [illegible] singulis geniculis.
fol. in indiis edula ut spinaciæ

Cistus fr. subrot. vel acumin. quinq. plo vel decem. multicaps. sem. utpl. exig.
cistus ladani fera vulnerarium et astringens in dysenter. alvi fluxib. externe resolvit et digestivum optim. catapl. pro herniis dupricum descabriones ingredit.

Nymphæa flos pentapetal. nenufar fr. fere globo. vel conicum. sem. oblong. foliis amplis sub rot. aquis innatantib. plurimae stamina sunt folia depr. vim habet nitrosum suavem aperientem humectantem vestig. narcoticam inflam. renum vesicæ oium viscerum in ardore urinæ febr. maligna fol. contus. instar catapl. applicata inflam. optim.

fr. in quo nidulantur semina a flos cujus pistillum a bit in

Nelumbo a nymphæa diversum fr. forma neque in loculam. dividit ut nymphæa sed in eo sparsim nidulant. sem.

Capparis flos tetrapetal. in orbem calyx quadrifid. capparis fr. utpl. pyriformem vel siliquosum carnos. in quo velut # sem. # in loculamento o varo subrot. et reniform. nidulant.
cortex radicis in usu, aperit incidit potens et diureticum fructus les capres et florum germina antequam florescant aceto condiunt et appetitum excitant tota planta in decocto menses movat.

S. 6. fr. expl. veluti capsulis ... pont

Sedum joubarbe capsulis in capitulum (capsules en bas disposees en rose)
qdam collectis sem. utpl. exig. a sedendo
quia humi sedent vel a sedando inflamoes sedant
refrigerant sedat dolores et ardores. oes hæ plantæ
aquosæ nitrosæ sub acidæ sub austeræ emolliunt
leniter astringunt. folia pellicula detracta in inflam
ventriculi intestinor. applic. et angina. contusa crassioribus
plagis pedum et nodos podagricos applic. sanant
Anacampseros R. et fr. sedi a quo
differt qd a 1a germinaoe excaulescat (in principio ungeri sicut umbella et flores)
folia sedi inglobatis oculi bovilli æmuli
congerantur ἀναχάπτειν ἔρωτα qd venefice
olim ad amorem revocandum eo utebantur
vulner. inflam. sedat. vulneraria astring. radix et fol
resolvunt. radix trita in butyro recenti cocta unguent
optim. hæmorroid inflam. pedum clavi.

ulmaria (reine des pres) fr. expl. vaginul mbran in
tortis et in capitulum congestis sem. utpl sin
gulari et exig. ab ulmo pter nescio quam simili
a filipendula distr fol. dissect in lobos latos ulmo
simil. et radicibus crassis fibratis
radix decocta sudorifica in febrib. malign. externe
contusa vulnerib. imponit ad sanguinem sistendum
et consolidandum fol. in decocto etiam astringunt
in dissenteriis diarrhoea, vomitu. hæc planta
etiam anti epileptica corroborans, astringens motum
sanguinis compescit

Cl. 6.a

78 Barba capræ barbe de chevre flo. 5 petal. rosac. calyc. monophyll. fr. ex vagi. plu. in capitul. singulæ sem. oblongo tergeminis a similitudi. barbæ capræ.
ab ulmaria distgt floriб. in spicam disposit iisdem pollet virtutib ac ulmaria

Fagonia fr. e rotundo acuminat. striatum 5 vaginis singulævaginæ sem subrotdo compresso tergeminis a Fagon achiatre

Tribulus macre fr. crucif. vel turbin. en croix de malthe ex pluб mu ricatis in capitulum collect sem. utpl. oblongis in loculis.....
fructus intus aperit astringit refrigerat in diarrhœa calculo conducit gargarit. gengivas ulceratas detergit intus emollit inflam et resolvit dolorem mitigat

Juncago fr. oblong in basi delrix. ex 3o vagihalis quæ singulæ 1m sem. obliquum

Geranium Becdegrue fr. rostrat. 5 striis per longitu. dncisum quib totidem adhærent capsulæ in long caudam desinent. per matur. a basi ad apice extror. se revolventes sem. utpl oblongo γέρανος grus in summis aliis sursum eminent. veluti gruum capitula cum suis rostris aut dentes ciconios
vulner. et astring ulcera detergit succus folior cum radiciб hitorum specierum in profluviis mulierum rustici hæc sanguinem vulner. sistunt omne geranium in diarrhea disinteria conven.

Thalictrum fl. ex medio numerosa stam. pist. cingens fr. in quo velut in capitulum colli. capsulae modo alatae modo alis carentes sem. singulari utpl. oblong fol. divisio [illegible] sunt species quar. capsula est unica orbicu[lata]
radicib utuntur artifices ad colorem flavum pannis imprimendum purgans est unde rhabarbarum rusticor vulnerarium et optim aperitivum

Butomus jonc fleuri petal. major. 3bus et minor. 3bus fr. mem corniculata bra. in quo velut in capitul. colligat vaginae ch cornu utpl. desin. secund. longi. dehisce sem. plerumq oblong fol. oblonga simplicia triangularia

Helleborus pié de griffon elleborenoir pist. plur. corniculis inter stamina et petala circa basim fr. in quo velut in capitul. collig vaginae mbran in cornu plerumq desin secud. longit. dehisce. sem. plerumq subrot. vel ovatis
Ἐλεῖν Βορᾶ folia manum referentia qd esu interimere dr
purgat vehementer vomitum excitat causticus est usurpari solet in morbis sopor. cathar[?]sis hypochon in epilepsia mania et febrib quartanis in hydrope etiam convenit radix decoct in lixivio et axungia mixta fit ung. verminae scabiei et aliis cutan morb

Cl. 6.

80
purg. **veratrum** elleboreblanc fr. in quo velut in capit. collig. tres plerumque vaginae mbran sem. oblong. grani tritici aemulis et quasi ala foliacea cinctis. differt ab helleboro qd corniculis careat fol nervis muniti in longitudinem corrugat
sem. habeat marginatum. fl. petal. 6. absque calyce corrosivum magis et nigro vehementior sursum deorsumque cum magnis torminib purgat, hinc equis magis quam hoib idoneum summum ptarmicum et sternutatorium in affectib sopor apoplexia lethargia

Populago souci deau fr. mbran in quo velut in cap. collig plu. vagi plerumque deorsum inflex sem utpl. oblong qd inter populos nascatur

Paeonia pivoine calyx polyphyl in qua pl fr. in quo plu. cornicula velut in cap. collig. deorsum inflexa lanugine plerumque pubescentia per longit. dehiscc. sem. fe glob a paeone medico qui ea curasse plutonem ab hercule vulneratum dicit homerus
radix. sem. fl. in usu decoct. aut infus viscosa stomachi corrigit et absorbet cephalica antiepileptica in convulsionib menses etiam pellit. obstruct. levat
a paeonia faemina differt latioribus lobis folior.

S. 7.

fr. ex pluribus sem. in capitulum qdam compositum
corrosi **Anemone** fr. oblong cujus axi plu. sem adhaerescant calyptra utpl. lanuginosa obvoluta fo liola quaedam caulem alias nudum cingentia plerumque terna calyce destituit
medicinae parum utilis ob acredinem
ontin d... ... ... quon. ap... ...

ἀνέμω vento qd flante vento flos ejus explicatr vel qd locis vento expositis delectr

*** Pulsatilla coquelourde pist. stami. plerq obsitum fr. capillaceum [illegible] velut in capit. colligit sem. in terna capillamentum desinentia sunt foliola eadem caulem infra florem cingentia ut in anemone a qua differt sem nudo in caudam tenuato, unicus flos in extremitate caulis fol et fl eodem modo ac ptarmicae usurpant sternutatoria sunt affect. soporosis, radix oculis lacrymas elicit ut caepa epota in vino alexiteria est. aq stillat. sudorifica cutae vulnerib. [illegible]

Ranunculus caly. deciduus multifol. plerq. fr. fere glob vel cylindr. aut spicat. cujus axi seu placentae mul. sem. adhaeres. plerq nuda. a ranis qd in locis aquosis caustica multum acrimoniae prae se fert exulcerat vesiccat radices et bulbuli recentes contusi et cuti applicati scabiem verrucas acrochorda pedum aq. tepid. prius emolli et radice incis. scabiem strumas ulcera inveter. infantum impetiginem sanat parti dolenti applicata et bis in die renovata

Filipendula flos exapetal caly. monophyl. multicuspidi fr. fere glob. sem. in capit. dolii [illegible] differt a ranunculo calyce monophyllo. foliis conjugatis et aliis foliolis intermixtis a radicib tuberis e filo quasi pendentib. fol. maxime dissecta mille folii adiutar praestans et diureticum antiepilepticum radix vino albo infusa in nephritide et renum et vesicae siccitate et arenosa materie maxime usurpata

Clematitis [herbe aux gueux] 4° petal. pleru̅ ca̅dente caly carente. fr. [concavato] in quo velut in capit colliguntur semina in tenue capill. quasi plumatum desinentia κλῆμα palmes virga vitea quasi sarmentosa
acido peracri et austero maxime caustica, ulcerib. inveter applicata detergit et carnes putridas absorbet et rodit hac fricant se mendicantes ut pustulae adnascantur quas postea verbasco curant

Caryophyllata benoite fl. petal. e [5 a 9 inter quas sunt alia totidem minora] diversis caly. monophyl. et pelvi forme.. fr. fere glob. ex sem. caudata differt a ranunculo calyce flord a quinque folio seminis fina. qd radix caryophyllum oleat. folia conjugata. distinguit a potentilla calyce adhuc multi [et foliis alternis]
cephalica et cardialis radix siccata et vino albo infusa ad tincturam rubram in cordis palpitationib optima vulneraria etiam folia et radices in decocto

Fragaria fraisier [calyx monophyll 5 fissuris ampl. et 5 min] caly. multif. fr. fere glob vel ovato acuminat. placentae modo carnosae modo siccae multa sem. adhaeres. folia terna summo pediculo a fragranti. fructus odore. [la les feuilles renes et resistent] emulcet aperit radix maximi usus in ptisanis refrigerantib et aperit fr. emollit nutrit refrigerat omne acre corrigit in asthmate et tussi inveterat.

Quinque folium caly. monophyl. multif fr. fere glob. mult. sem. in capit. ipso calyce involut fol. plura quam terna summo pediculo differt a fragar foliorum numero
vulner. astring radix tutissim. remedium in dysenteriis alvi fluxu haemoptisi haemorroidis et mensium fluxu immodico febrib intermittentib. in faucium dolorib. in gargarismate

Tormentilla 1.or petal. caly.° monophyl. octofid. pulferinal modo quinquefid modo gei multif. pelviform. fr. fere glob. in quo mult. sem. in capit. collig. calyce involuta fol. plur. quam 3.a summo pedicul.
absorbet astringit radix in usu fibris spolliata et siccata et pulverata in dysenteria sed minoris efficatiae

Pentaphylloides. argentina a 5.° folio diversam folior. situ nequaquam summo pediculo radiorum ordine sed alio modo
refrigerat, astringit, absorbet detergit febrifuga instar Kinakina in utero scorbuto hydrope commendatur juvante argentinae cancri fluviatil. ... in fluore albo mensium fluxu nimio

Christophoriana S.δ calyx abit in fr. mollem fr. moll. seu bacc. utpl. ovat. sem. gemino ordine non raro sibi adhaer. quasi s.ti Christophori

Phytolacca fr. seu bacc. fere glob. depress. moll. plur. sem. in orbem posditis φυτον planta ad laccam accedens colore
maxime anodina balsamidam tranquillam ingreditur

Cl. 6.ª

84 Aralia saage de canada fr. seu bacc. fere glob. succul. sem. pleraq oblongis
aperiens est et sudorifica in hydrope

Asparagus asperge senis petal. pleraq fr. seu bacc. fere glob. sem. utpl. duris - folia tenuia
aperiens est et sudorifica in hydrope sale acido mediocriter volatili urinam movet

S. 9.ª in fructum siccum cujus calyx abit in semen aut

Cuminoides petal. utpl. fimbri. calyx abit in sem. pleraq oblong. quasi ad cuminum accedens
flores in globulum collecti

Circæa herbe de s.t etienne ex duob. petal. calyc. bifido. fr. pyrifo in duo locul. pleraq div. sem. non utpl. oblong
resolvit lenit in cataplasmat pro hæmorrhoïs bullita in pulpam; vel pro fomento parum ejus decocto imbuendo pecti applicandum

Agrimonia aigremoine R pentapet fr. pleraq oblong velut echinat uno vel alter sem. oblon utpl. fol secun. ... ovem
parte terrestri absorbat acida detergit et astringit
hepaticum est folia semant ut the pradicate gargar in faucium doloribus decoct. viscerum obstructiones curat

Agrimonoides petal. e divisuris calycis flos et calyx altero calyce infundibulifor. veluti fimbriat fr. ovato acumin. sem plerumq singulari
flores in umbellam seu potius in corollam dispositi

herbe aux anes
Onagra 4or petal. in calycis divis calyx parte superiori fistulosa altera solida fr. cylindr in 4or partes dehiscen. in 4or locula divo sem. atpl. angulat placent. affix
flores leniendos pectorales verbasci substitui possunt

Chamænerion 4or petal. vel at plurium calyx plerumq cylindric tenuis petal ubi deciduit siliquosa tetragona 4ariam dehisc. multo sem. pappis instruct placent affix 4or alis seu dissepimentis donatæ
Χαμαὶ humi νήριον quasi nerion humile
vulnerarium astringens

Telephioides fr. subrot. in sex locul divi. in singulis unicum sem. ejusdem finere

76
D.8.d. **Smilax** fr. moll. seu bacc. subrot. sem. plerq glob vel ovato. fr. hederæ, arbores circum volvit. spinosa est. fert. et ster. fl.
alend. et sud. fol. [illegible] in inf. et decoct antidota sunt. ischiam curat intra inflam. catar. rubori et infl. ocul. optim.

D.q.d. **Garidella** petal fornicat bifid. calyx mul[t]ifolio petit abit in capit. ex mult. capsul. oblong bivalvib semine ut pl. subrot D garidel in acad aquisextiensi botan.
vires habet nigellæ

Tribuloides fr. subrot aculeat. unicapsul. sem. castaneæ aemulo fr. aculei sunt folia calycis in aculeos versa

Oxycoccus canneberge fr. sub bacc. fere globo. in 4or locul. div. sem. subrot

[illegible] **Ricinoides** medicinier pignons de barbarie calyx multifol sterili em[bryo] in aliis plantæ partib nascitr calyce obvolutus fr. in tres capsul fissilem sem. oblongo
a ricino disquitr 6 staminibus pistillum obvolventib semen unicum violenter purgat; dat oleum corrosivum ex eo paratr purpura ad luteum colorem quæ di[citur] tourne[sol]

Hermania petal tubul. et corniculatis caly. monophyl et vesicario fr. subrot. 5c farian apice dehisc. in 5c locul. div. sem. onijis. a paulo hermanno

Echinophora fl. in capit umbellatum calyci communi insidente qui abit in fr. unicapsul sem. oblongo

Sarracena caly. multifid pist. clypeo tubran instruct. fr. subrot. in 3c locul. et pl. div sem. oblong a Do sarrazin d. Med. anat. et bot.

Papaya fl. gem; alio steril. tubul. et stelliform alio rosaceo fr. meloni for. carn. sem. plurim striat calyptra obvolut.

88 Sapindus 1° [interlined: Indiae nux saponaria] plerumq. petal calyx 4-folio fr. sphaericum nucula petum sphaerica ...
quasi sapo indus propter fructum corticem qui saponis usum praebet.

Begonia fl. alio steril. ex 4° petal amplior. et angus. alio rosaceo caly foliat fr. trigon alatum in 3a locul. divis. sem exiguis a D.° Begon

Guajava calyx infundib fr. fer ovat. coronat moll. in cujus carne sem. exig.
fructus refrigerat et paululum astringit, fol. vulnera resolventia et in balneis applicantur

Cacao caly multifol. pistill. tubi multi scissi laciniis cinctum fr. cucumer. striat. sem. in 5e aut pl. acervulos collectum oblong gla. ut amygdal. fissile
basis est chocolatae

Tamarindus caly. multifid. siliqu. . . . pres. alium condunt. semine plano atque angul. intervallum inter duas siliquas pulpa haeret plerumq. nigra et acida
crescit in arabia et indiis fol. etiam adhibent in decoct. et in febrib. ardent. medulla lenissime purgat in febrib. cont. diarrhaei, nimio haemorrhoid. fluxu sanguine acriori et bilioso. stomach. quoque roborat

Tamariscus capsul. salicis fructus aemul. oblong. membranac. in 2as ptes dehisc. sem. pappo instruct.
lignum et cortex maxime aperiunt in hydrope obstruct. viscerum. extract. cortici cum vino albo potenter aperit tota planta pro fomento apostemata frigida resolvit cinis ligni, desiccat et detergit in morbis cutaneis

Molle poivrier du perou pist. ~~perpalit~~ inf. piperis grani aemulum
fol. ad oedema resolvend. aptissima

Caryophyllus aromaticus clou de gerofle f. ovat. umbilic. unicaps. sem. oblong
maximi sunt usus in apoplexia paralysi vertigine lethargia, syncope, animi deliquiis et stomachi infirmitatibus. oleum horum per descensum dentium dolori et cariei medetur

Suite des fleurs en rose savoir
des fleurs en parasol ou umbelle

elles sont presque toutes a cinq feuilles disposees en ro[se]
sur l'extremité du calyce qui devient un fruit a deux gra[ines]
si bien unies etant vertes quelles semblent n'en faire qu'une
mais elles se separent facilement etant meures.
ces fleurs sont le plus souvent soutenues chacun par un pedicu[le]
ramassees en bouquet a l'extremité d'un autre pedicule plus lo[ng]
Mr Ray croit quil suffit que ces fleurs soient a cinq feuilles
pourvu quelles laissent chacun deux semences qui se separent qu[and]
elles sont meures il ne croit pas quil soit necessaire quelles
forment toutes ensemble des bouquets disposes en parasol

umbelliferæ planeq aromaticæ quæ ratione plus minus se morè resinosæ præseferunt

Classis 7ª 91

de flore polypetalo rosaceo umbellato

S. 1ª

de fl. umbellatis circinato dispositis quor calyx abit in duo semina exigua et striata

Ammi petal.e cordifor inæqualib. fr. in extremitate calycis ex 2b. sem. exiguis hinc gibbis et striatis inde planis fol. oblong angusta costæ per conjugationes ultimo impari claudente

carminativum acido volatili oleoso discutit, aperit urinas movet sem. ingreditr theriacam.

Apium petsil petal.e æqualib fr. ex 2bi sem exig. hinc gibbis et striatis inde planis folia pinatas divisa seu costæ ramosæ nascentia ultimo claudente ab apibus qd apio seu petroselino delectenti

aperiens est tartarum urinæ frangit hanc movet, roborat rad et fol. in jusculis aperi phi apozem. succus pro gargarit in scorbuto et ulcerib. oris folia usus in antiqua vocis extinctione

Cicuta cigue petal. cordifor. inæqualib fr. disposee en fleur de lys de france fere globo sem. exig. hinc gibbis et striatis inde planis. qd internodiis sit cavis et fistulosis in ammi distinguitur ad ammi foliis incisis sicut [illegible] et odore fœtido calamisve qd est inter duos nodos cicuta appellatr.

intus sumpta spirituum solvit et venenum cujus antidot est vinum, extus potens resolutivum in inflammatione in tumorib lymphaticis quos potenter discutit

92 **Carvi**, [anis sauvage] petal. cordifor. [infleur di. lys de france] inæquali fr. extem. exi longiuscul. trinc gibb. et striat. inde plan. folia tenuiter laciniata costæ per conjugationes. a caria asiæ regione: culinis principale sem. calid. in colica ventosa et. cardialis et carminat quidam radice direpta in decocto utant.

Phellandrium [cigue d'eau] petal. cordifor. sem. exig [ovatis] trinc gibbis leviter striat. inde planis in aquis nasc fol. aquis obdut lata. extra aq. minora et laciniata vires dis cicutæ ad discutiend tumores inflam. et frigid gangrenæ resistit laudat etiam in tumorib cancros mammarum

Bulbocastanum terre noix sem. exig oblong nunc lævibus trinc striat. trinc gibb inde planis radix carnosa et tuber quasi bulbo ad castaneam accede ~~[illegible]~~ bulbus nutrit, sanguinem incrassat. fol. in lacte cocta phtysi conducunt, radix in vino epota strangurie et ictero prodest laudatur in mictu cruento [illegible] flores et infrigente venere

Daucus [carotte] petal. cordifor. inæqual. fr. subrot radii in peripheria longiores quam in centro umbellæ sem. villis ciliorum æmulis instruct. cinctum et a caucali disting. sem. minutissimis minus ciliatis rad. diuret. sem. cal. aperit. carminat. daucus creticus offic. discutit aperit sem lythontriptic urinas et menses movet colicis ventri et praecipue [illegible] doloribus sedandis maxime praestat et vaporib. [illegible]

Sium berle petal plerq. æqualib. fr. subrot sem gibbi striatis et planis folia conjugat. ultima unica antiscorbutica est, aperit. detergit urinam et menses movet dysenteriæ [illegible] laudatur ad hypocrate [illegible] in inflam. solvenda et discutienda

[Left margin, vertical:] Le sommet de la fleur du Daucus ou plutot le centre se trouve occupé par une seule fleur pourpre ou d'une couleur rouge ou vineuse ... la partie superieure ... la figure d'une ...

impari claudente

Sisarum chervi sem. angusti gibb. striat. et plan. radic. napiformes ab uno capite pendentes differt radicis fina a bulbo castano sic et tragoselino radix optima edula, aperit bechica et sem. provocat et astringit, cocta in lacte phthisicis macilentis et oib pectoris morbis iisq qui sanguinem spuunt vel mingunt laudatur contra stranguriam tenesmum alvi tormina singultus

Tragoselinum boucage petit inaequal cordiformi sem. oblongis gibbis striat et plan, τράγος hircus σέλινον selinum
aperit diuretica et diaphoretica emmenagoga convenit ubi ... faciendum et in hydrope D. Sthal. in morbis chronicis ad viscerum obstructiones solvendas

Buplevrum oreille de lievre, perce feuille vivace sem. oblong. gibb. stri. et lan folia simplicia non incisa alternat, βοῦς bos πλευρον costa, latus qd bovi ea comesta rumpi dr
vulneraria astringens decoctum vel siccata intus ... ad extravasationem sanguinis trita cum farina et vino opt. ... in mastoidibus strum. resolvit

S. 2^a
fl. circinnato disposit. quor calyx abit in duo sem. angust. oblonga et satis crassa
foeniculum fenouil folia in lacinias capillaceas divisa costae innascentia qd sativum. sem hinc gib et stri. inde plan.
aper. sudorif stomachic pector. et febrifug. sem discutit detergit aq. distill. pro collyriis ... ... et ... ... crat lac in mammis auget

94 magno cum fœnore sem. reddat vel qd quasi fœnum reponat

Meum folia tenuissime laciniata costæ innascentia quæ in re non differt a fœniculo, tenuius, hirsutum foeniculi odore medicato aperit discutit, antiiter, sem vim habet fœniculi libidinem provocat radix in vino albo infusa mense et urinas promovet, flatus discutit, stomachum roborat expectorativis aliq. sudore promovet asthm. maxime conducit

Oenanthe petal. inæqualib cordiform. sem oblong. in aliquos veluti aculeos desinent, quorum medium cœteris validior οἴνη vitis ἄνθος flos qd florent cum vite et odore colore florem vitis æmulet, vires habet bulbo castanei. folia minutim incisa radices napiformes intus alb. intus nigr lateraliter expans. locis paludosis innascent

Angelica sem. apii ~~semine~~ major fol alata in partes satis amplas divis. certa affin unica desinentia a virib. eximiis. rad. præstans alexipharmac et stomachicum acido volatili pituitam et acidum dissipat

Astrantia sanicle femelle petal. apice plerumque reflexo sem. singulum calyptra striata crispaq involutum fl. in capit collig. corona cinctum foliacea leniter bilem et melancholicam purgat usurpatur in apozemate pro lienis crassitie et schirrosis

Chærophyllum cerfeuil petal inequal sem. rostri avium æmul, non striati, nunc lævib nunc asperis, hinc gibb. indi plan. fl. dispositu accedens χαιρω gaudeo φυλλον folium quasi foliis gaudens aperit detergit vulnerarium est inguinem acuit pruriFicat folia in decocto. intus istus pro vulnerib succus diaph. et sudorif.

Myrrhis cerfeuil musqué petal inequal. sem. rostri avium æmul a myrrha qd ejus odorem spiret. vires habet chærophll et præterea bechicum est in fumo instar tabachi asthmaticis optima succus in una Sarca ex ea fit cataplas. cum mica panis in inflam ocul optim succus in linimentum pro hæmorrhoidib

Se. 3[a]

flours soutenues par des rayons
fl. circumato dispon. caly. abit in 2[o] sem. subrot ctereassiuscula

Smyrnium maceron. fr. fere glob. sem. ren ηδος lunat. a σμύρνα myrrha qd ejus odorem referat. ad angelica defert seminum crassit. et forma aperit ... diureticum emmenagogum ... urin ... in morbis renum et vesicæ conducit decoct vel inf. rad. decoct tussi asthmat prodest apio substitui potest

Cl. 7.^a

96 **Coriandrum** petal. inaeq. et ... cordifor. qdaq vero aequalib. sem. 2^ae sphaer. 2 ... nunc semisphaer. sphaeri, ... nunc sphaericis. a κόρις cimex cujus odorem aemulatr foliis[?] ... profundius ... quam superiorib. in unione hemisperorum reperitr vesicula liquore pleno quo tota planta odore ingrato donatr, stomachu[m] et carminativum et viscidos stomachi humores attenuat

S. 4^a

fl. circum. dispos. calyx abdt. in 2° sem. plana ovata satis ampla

Imperatoria petal. nunc cordif. nunc in tegris sem. leviter striat. marginat. involucrum pleraq depon. folia alata satis ampla singula dentata. quasi imperatore digna, viribus, differt ab angelica sem. alat. aperit diaphor. cephal. cardia. et febrifug unde epilep. asth. colica ventris, hydropi maxime convenit d... etiam optima contra venena volatilia

Critmum bacille sem. plani leviter striat. involucrum plerumq deponent. fol. carnos angust. bifar div.
rad. fol. et sem. decoct. intus aperiunt

Anethum sem. striat. et marginat fol. foeniculacea
discutit incidit aperit, calefacit

Peucedanum [queue de porc] sem leviter striat. et marginat. fol. alata angusta graminea bipinnam divisa
rad. inter. in decoct. aperit incidit bechica est et antihysterica, in asthmate halitu difficili ad menses et lochia expellenda succus spissatus melle commixtus in tussi inveter. cum vino laudatur in nephritide pituitam solvit obstruc. discutit exter vulnera et ulcera mundificat. flores radii perfecti

S. 3 sem. ovata plana ampla

Oreoselinum persil de montagne sem striat marginat. involucr. qdoq deponent. fol. apii vel cicutae. ὄρος mons σελινον
vires habet apii

Thysselium [persil des marais] differt ab oreoselino succo lacteo.
est acerrima radix aperit urinam et menstrua provocat extimia et salivans

Pastinaca panais sem. margin. involuc plerq deponent. fol. alata ampla a pastu vel a [illegible] pastina fol. [illegible] alii foliis [illegible] secundum costam [illegible]. [illegible]
rad. [illegible] pulpa molli bechica est et resolutiva. sem. diureticum et carminat. ad calculum stranguriam menstruationem difficilem dolorem colicum nephriticum succus est quasi balsamum leniens et consolidans et calefaciens

98 Sphondylium *berre* petal. inaequa cordiform. sem. apice introrsum emarginata striat. involucr. plerumq deponen. lituris nigris qua parte sibi adhaerescunt. a sphondyle insecto cujus odorem aemulatur. a pastinaca differt flore et semine fol. emolliunt in catapl. clysmate; radix in decocto aperit, incidit, muliarib. lienteriis prodest epilepsia morbis cerebri succus foll. in vulnerib

Tordylium petal inaequal. cordifor. fr. fere orbicul. sem. plan margine elato ut plurim denticulat. involucrum saepe deponentib.
dr. menses et urinam ciere

Ferula sem. ampl. plana ovat. saepe deponen. involucrum folia foeniculi vel apii aemula. caules medulla donantur radices nigrae a ferendo quia nulli fruticum levitas major baculorum usum se nectuti praebet. vel a feriendo qd olim pueri verberandi
invisae nimium pueris gratae magistris
clara promethea munere ligna sumus
hesiodus ait prometheum jovi sceptrum in vara ferula detulisse
ferulaeque tristes sceptra pedagogorum — cessent
est admodum succosa ex eo stillat gummi galbanum dictum qd potenter humores resolvit

Thapsia [fenoil turbit][venat] sem. ala cinctis foliaceâ utrinque introrsum plerumq emarginata. a thapso insula
folia minutim incisa aliquando
succus plantæ et radicis lacteus, oris corrosivus vesicat inspissatus purgat violenter spasmum facit et deterrima inducit symptomata externe adhibetur in unguentis pro scabie aliisq morbis cutaneis

§. 6. sem ampla profundis striis excavata

Cicutaria [cousconille] sem. gibbis [longis] et quasi lunatis fol cicutæ quodammodò æmula
venenata est ut cicuta ejus antidotum est aq. tepida cum melle

Caucalis petal. ineq. cordiform. sem per longitud. sulcatis cum alis denticulatis et veluti aculeatis inde vero plantis

Ligusticum livèche sem. cum liris veluti foliaceis. a liguria unde nomen.
vires habet apii sem. carminat. virtute angelicae

Lasérpitium [tapsie, fenoil turbit] petal. cordiform. sem. cum 4or alis foliaceis amplis interdum crispis
vehementer purgat succus in vulneribus internis et cadaveribus balsamo condiendis radix aromatica

S. 7.a sem. cortice fungoso obducta

Cachrys ãmarinte fr. cpositum ex duab ptib semi ovat fungosis nunc laevib nunc striatis et asperis sem. grani hordei aemulo. fol minutiss.

S. 8. sem. in caudam long. desinentib

Scandix flos inaequal fr. cpositum ex duab partibus acum referent. seminē ptis

vulneraria et aperiens resolvens radix trita cum mel[?] dix spiculas et corpora extrahere

S. 9.a fl. umbell. in capitulum cglobatis sine radiis

Sanicula petal. ad centrum floris plerūq reflexis. sem. cum incidar in vaga hinc gibb. echinat. inde plan. ex flor. aliquae steriles! fol lucida a sanandā

vulneraria astringens detergens specifice in oib haem. maxime in profluvio sanguin mulieb. ex decoct fiunt injecti vulnerib proficuae; contusa vulnera sanat sine suppuratione contusa cum vino vel aceto tumores discutit

Eryngium panicaut chardon roland. petal. ad centrum fl. plerūq reflex. cum incidar in vaga sem. nunc foliatis nunc plan. et ovat involucrum qdo q deponentib grani tritici aemulis. folior. corona ad basim capituli florum posita. ab aliis umbelliferis disquir. floris in caput quoddam collectis

rad. sem. aperiunt attenuant calefaciunt. aq distillata sanguinem purificat. ictera prodest.

Hydrocotyle ecuelle d'eau sem. dual planis et semi-orbiculatis ὕδωρ aqua κοτύλη cavitas. in paludib.
fol. sub-rot. simplicia umbilicata longis pediculis insident
peracris vulnerarium est et detergens.

Classis 8ª

Flos polypetal. caryophill. id est explurib. petal in orbem positis ex imo calyce tquam e tubul. emergen.

S. 1ª

Caryophillus oeillet. pistill. abit in fructum petal strict ad basim in summitat ... caly. cylindr. et membran. ad exortum squammato. fr. cylindrace apice dehisce. calyce ipso involut. sem. planis et quasi foliaceis placentae affix. ab odore caryophill aromatic.

flores in decocto cordiale praestant in febri malign. urinas sudorem ciendo; aromati. discutit aperit detergit

Lychnis flore. caryophilleo petal cordi for. plerq. 2ᵒʳ aut 3ᵒʳ foliol. donat. corollam effigientib. fr. at pl. in conum desinen. apice dehisce. calyce involutum saepe uni capsularem sem. subrot. angulatis interdum reniform. placentae affix. a caryopillo differt calyce simplici ad exortum o squammato. sem. renif. vel angul. tum et corona quae medium florem occupat. caryophillus calyce gemino et genuino foliacea sed caret corona fol. conjug.

species aes saponaceae incidunt detergunt resolvunt diuret sudorif. antihypocthon in renib expurgandis maxime confer in scabie morbis venereis, menstrua vocant prosunt in morbis cutaneis

Cucubalus calyx in fundo ... fr. moll. fere ovatum seu bacc. sem. plerq. reniform.

Linum petal. 5 ad basim fere juncta lineis teneris fr. fere glob. plerq. acumin. ex pluri. plurib. capsulis introrsum dehisc. sem. plano fere ovato hinc obtusa inde vero acuto.

Lenit, emollit, anodinum est praecipue colico dolore ... in enemate anodinum in pleuritide, peripneumonia tussi farina ... laxat; extus emollit, resolvit oleum lini cum terra sigillata et japonica ... cum farina pro haemorroid. cum ovi vitello in ...

S. 2

pist. abit in semen calyce ipso involutum

Statice gazon d'olympe fl. in capitul fere sphaeri. collect. calyx ... capitul. ... compl. florib. 5 pet. caly. communi squam. sem. oblong. calyce seu capsulâ obvolut.

astringens vulner. in decoct. ... ubi nimia laxitas nimia fluiditas

Limonium been rouge calyx infundibulif. sem. oblong caly. seu capsul involut. occurrunt limonii species fl. monopet. infundibul. multifid. ... pratum ... inlolit palud. caul. ... ramos differt a statice florum ordine qui plerq. longa serie disponuntur calyce communi carent. calyx ... squam folia exsiccata consolidant sem. in vino coctum et potum fluxus sanguin. menses et haemorragias sistit extus emollit.

Des herbes dont les fleurs aprochent
en quelque maniere de la fleur du lys

Les fleurs en lys sont d'une seule piece coupées en six pieces dans quelques genres elles sont a trois et a six dans quelques autres et leur calyce ou leur pistille forme un fruit qui est toujours divisé en trois loges

liliace odore ktum donauh tpore coniugii ult fecunditati quo tpore pulvis spargitr

flos Liliaceus **Classis 9ª** 105

Sª

Asphodelus aphrodille fl. monopetal. in 6 ptes secto regula pist. abit in fruct fr. fere glob. carnos. trigon apice dehisce, in 3ª locula. divi sem triangul differt a phalangio florum fmā. in capillu congest phalangii radix fibrata radix napiformis resolv. in catapl. ex radicib exsiccatis et in pulverem redacti conficit panis in calamitati[illegible]

Lilio asphodelus fl. monop. inferius tubul super. in 6 ptes secto et amplato fr. fere ovatum et trigon aut in 3ª divi. sem. subrot radix napifor. quasi flori lilii asphodeli radice

hyacinthus jacinte fl. quasi campanif. 6 fid lateraliter depress tubul fr. subrot fere [illegible] in 3ª div. sem. modo subrot modo plan, fol angust radices bulbsi ab hyacintho puero vel a colore ad lapid. hyacint acced. radix resolvit folia maturant rad. vino imbuta dr pilos pari et barbam juvenibus procedire, sem astring. bulbus vomendo ingentem vomitum ciet, fol et rad. maturant resolv. in catapl.

Muscari le lilas terrest[illegible] fl. velut. campan. glob. fl. regul. brevi fr. pleru 3 angular in 3ª locula div sem utpl. subrot ab odore floris moschato differt ab hyacintho flore campan globo hyacinthi vero apello

Cl. 9.[a]

106 purg. **Colchicum** tue chien fl. ab ipsa radice emergente sub tubi tenuiss. forma in 6 partes sursum ampliati pist. in capillam. tenuia desinens fr. oblong. trigon. in 3[a] div. sem. subrot. radix gemina tuberosa altera carnosa altera fibrata eodem involucro membranaceo. apud colchos in massenia flores ante folia. flor. major. [illegible]
radix siccata collo applicata anginae confert. radix recens comesta venenum est strangul, antidotum lac vaccinum cum foliis serpilli, mixta cum vias pilos equorum nigros dealbat rustici 3 aut 4 fol infus pro febri intermitt sed saepe nocet

S. 2[a] H. monopet. in 6 partes secta calyce nullo in fructum

Crocus flos regularis saffran fl. inferius tubulat. tubo in sex ampliato et pediculo insidente pistil. in 3[a] capilla capitata et cristata fr. oblong. trigon. in 3[a] div. sem subrot. radix gemina tuberosa altera minor alteri majori insidet carnosa et fibratae utraque involucro membranaceo differt a colchico radice gemina altera alteri insidente folia angusta linea alba calyci in fructum abeunte pist in capit. capitat et crist.
pistilli extremitates sunt in usu, anodinae et resolventes praestat aperit resolvi, deterg. stam in lacte infus pro pulmonariis. cum lact. et mica panis in cataplasm. resol. inflamm

Narcissus fl. in 6 partes secta membranulis tumens pars in forma liqudi globo cinctas [illegible] ejus coronae instar cingentes calyx plerumque prodit e vagina membranacea fr. oblong subrot trigon trifar dehisc. in 3[a] div. sem. subrot. a narcisso juvene vel radix sopor qd soporem indicat
radix emetica tritus detergit resolvit ulcera consolidat in herniis prodest

Iris flambe fl. ad exortum veluti infundibul lifor. in tres partes ampliato quar tres sursum tres de orsum alternat. spectant. pist. tribus petalis instructum fornicatis et partibus floris deorsum inflexis ita incumbentib ut palati speciem prae se ferunt. fr. oblong. trifurcian dehiscen. in 3a div. sem. nunc subroti nunc planis. radix carnosa oblong, repens fundis carens a coelesti arcus similitudine
radix geniculata et carnosa aperiens et hydragoga
iris alb. florentina putatur ad lienosas viscerum obstructione et ad hydropem radix pulverat pro tussi fluxiorib catharsis iridis pulverati radix astringens at vinum in quo bullit hemorragias sistit

Xiphion fl. iridis aemulo pist. 3bus petal pariter donatur calyx ped. sternitur sed radix bulbosa plu rimis tunicis constat ξί φος gladius propter folia quasi ensifor.

Sisyrinchium a b iride et xiphio div. radice gemina altera alteri insidente ut in croco et gladiolo ὗς sus ῥύγχος rostrum tum propter radicii primam tum. qd sues rostro terram fodiant ut ea radice pascuntur. radices edul

108 Cl. 9.^a

Gladiolus glayeul fl. ad exortum quasi infundibulif. in duo labia amplist sup. imbricato inf. 5^e partito. fr. oblong in 3^a div, sem subrot, calyptra involuti. radix gemina carnosa tuberosa altera alteri incumbens a foliis quae gladium repraesen. radix caustica
gladioli faetidi radix pulvis in vino albo pro asthmate affect. hypochond. anhelitu vaporib. histericis pro strumis hischuria nephritica cancri affect. menses immodicos sistit

purg Aloë fr. oblong plerq cylindrac in 3^a div profunde secti plan. quasi semicircul. ἅλς mare quod in maritimis nascatur. fol. succus aculeis armat in latere vel succo flavo amaro pleno
succus ex foliis inspissatus humores serosos et viscidos purgat sed sanguinem rarefacit et haemorrhagias creat sulphure suo copioso crasso et sale et sale fixiori irritando ideo praegnantibus non convenit

Cannacorus balisier fl. velut tubul. in 6^e parte secto quarum una ligulam promit et pistilli vice fungi videtur et quasi staminis locum teneret apice donata. calyx tubul. florem complectitur fr. oblong vel subrot. membran. in 3^a div. sem plerq sphaeric quasi ad cannam et acorum accedit

S. 3.[a] fl. liliaceo tripetalo

Ephemerum. calyx trifolio. 3 stam. fr. oblong. in 3.a div. sem. grano tritici aemulum
radix decocta pro gargarismate in dentium doloribus

S. 4.[a] fl. hexapetal. patulo dum fr. stellatim disposit.

Phalangium fr. subrot. in 3.a div. sem. angul. radice fibr. ut ab ornithogalo facile disjungatur
Φαλάγγιον aranei genus. folia sem. et flos ex vino bibanti contra scorpionem ictus phalangiorum q maxime ex dioscorid. auxiliantur. fol graminis aemula

Liliastrum lis de S.nt Bruno fr. oblong. trisulc. dehisc. in 3.a div. sem. angul. rad. napifor. ab uno capite pendentes. ad lilium accedens

Lilium stam. 6. flos excepto campaniformi oriens flex fr. oblong. utral. trigon. in 3.a div sem. quasi marginat. gemina serie sibi incumbentia.
radix bulbosa squam. carnos. constans axi affixi
lilii albi caulis cum floribus amputatus et suspensus semen profert. radices et folia maturant et resolvunt flores puerorum vermes necant. vad. in aq. contrita dat mucil. ad ophthalmi. lenit. detergit emollit digerit refrigerat sal cineri et cum oleo nucis pro combustionibus, flos contra vertigines et capitis morbos. oleum aud. intus et extus ad nephrit. dysenter. embrocationib

hue ades o formose puer tibi lilia plenis
ecce ferunt nymphæ calathis

Cl. 2ª

110 gesner assure que pour avoir de bonne graine de lys commun il faut couper la tige des que les fleurs sont passees et la suspendre au plancher d'une chambre ce qui reussit a paris quand on la suspend dans une cave. si on laisse la tige sur la racine les jeunes fruits perissent et tombent

Lilio hyacinthus fr. ex glob. acu min. plerumq. trigon in 3ª div, sem. fere glob. rad. squammata lili formâ. ad lilium et hyacinth accedit

Corona imperialis fl. in coronam dispont. supra quam eminet numerosa foliorum coma, singuli autem fl. liliacei campaniform. fr. oblong, alis per longitudinem. in 3ª div. sem. plan. multo sibi incumbunt. radix tunicata parte sesseli fibrata. rad. maturant et resolvunt oint et emollit. tota planta intus venenata

Tulipa petal. 6 urcei formâ fr. oblong trifur. dehis. in 3ª locul. div. sem. plan. bino ordine sibi incumbent. radix bulbosa, tunicata parte sesseli fibrata, flores et folia immediate e terra emergentia fl. variis color ornat. flos in caule unicus vim habet emollientem ad coxam accedit; bulbus leniter tostus orgasmum aphrodisiacum excitat

folia maturant

Fritillaria fl. pendulo fr. oblong in 3° div. sem. plan. gemino ordine sibi incumben. radix ex 2bus tubercul. constans plerumque semi glob. inter quae surgit caulis. a fritillo seu damier abaco in quo scaccorum ludus exercetur propter florum maculas folia angust. ut graminis et caules tulip. minor

Dens canis fl. pend. reflex. repand. fr. subrot. in 3a div. sem. oblong. radix carnosa ad dentis canini formam accedens

Ornithogallum fr. subrot. in 3a div. sem. subrot. radix bulbosa aut tuberosa qua differt a phalangio ὄρνις avis γάλα lac. lacteus color ut in aliis plurimum avium. folia fructu dant fibrillas. radix alb. staminulata pistillum trigentia vires habet cepae et allii sed minores

Porrum poireau fr. subrot. in 3a div. sem subrot stamin. plerumque lata plana in 3a capillament. desinent quorum medium apice donatur flores in fasciculos fere glob. radi. longae cylindr. tunicatae tunicis in folia plana plerumque carinata. sapore dulci. stomachicum extor. resolvit et discutit. bechicum est, aperit corum et radix vino albo infusa urinam et menses movet bulbus in folio brassicae sub cineribus coctus cum aceto frictus optime catarrh. [illegible] in pleurit. humores [illegible] [illegible] [illegible] cum saccharo vermes [illegible]

moly est cepæ species a qua differt tum odore tum dice plus tuberculis donatum
Cepa ognon fr. subest in 3^a diu. sem. subru[...]
fl. in fasciculo sphæricum collecti tum et folia cauli[...]
tubulatis gibbosa. intern. diuretic. ext. discutit incidit resolvit
maturat aperit. sub cinerib cocta pirti ... appli[cata]
resolvit sedat maturat serum et sanguinem collectum
sub cute dissipat. differt a moly odore tantum

Allium fr. subest in 3^a diu. sem. subest
fl. in fascicul glob. rad. tunicata ex plu. nucleis
plerumq. constanti. folia nequaquam tubulata. differt
ab ornithogallo florum situ infundibul a cepa foliorum forma, a
porro radice. fl. allii fascicul tunica obvolu. ad basim
theriaca rusticorum. diureticum; discutit aperit detergi[t]
enema allii cum lacte colico ventoso medetur, verme[s]
enecat

§ 5^a fl. petal 6. calyx abit in fructu[m]
Lilio narcissus. radix bulbosa tunicata
quam. qua differt a lilio. a narcisso flore polypetal.

Narcisso leucoium perce nege

petal nunc ~~aequal~~ 6. nunc ineq. veluti cpunc fr pendulo fr. subrot. in 3a div. sem. subrot. radix bulbosa ac tunicata

Bermudiana fr. trigon. trifurc. dehisc in tria locul. div. sem. subrot. ab insulis bermudis iridi similis facie ppria disguit fl. regul. radix non bulbosa rad. vasculi
a phalangio differt calyce in fruct abeunt; in phalangio vero fructus e pistillo

2a 5 Bulbocodium fl. monop. in 6. div sem. subrot. radix ex geminis tuberculis in rostrum abeuntib

2am Hermodactylus. fl. monop. in 6 div. ... caerul. rad. tuber. et veluti digitatu
purgat vehementer serum viscidum articulorum laudatr in podagra ischyade specificum in gutta serena

Aphyllanthes. stam 6 ex 6. petal. caly. squam tubul. fr. trigon. turbinat. trifurc. dehisc. in 3a div. sem. subrot. absq. foliis ttum flores immittens fl. caeruleus. in capite squamoso.

ion Haemanthus fl. monop. caps. fere glob. sem. oblong. flos in capitul. 6. foliolis compos.

Classis 10[a]

De flore polypetalo papilionaceo

florem leguminosum a papilionis fma papilio. appellavit Cordus. 1.or petal. dissimil. c pondr calyce unifolio cavo cucullum papyraceum referente et multif. simul cum pistillo exurgentib. petal. sup. qd signi militaris adinstar explicato vexillum audit. inferius cymbae modo concavum, carina. quae medium occupant alae ad exactum auritae. carina plerumq in duas ptes per longitudi. huic fl. proprium est ut pistil. excipiat a vagina fimbriata seu potius in stamina divisa deinde abeunt in fr. qui siliqua vocam gallice gousse siliqua vel unicapsularis vel bi capsul. vel articulosa. unicaps. in duas valvas, quas gal. cosses, dehiscere solit et sem. reniformia cylind. sphaeri. plan. rhomboid. aut quadrangul introrsum emargin. vel alterius fmae. his alimentum. ministratr a vasis per longitudinem ptis crassioris siliquae protensis quorum ramuli in placentam influunt tenero fructui adhaerescentem.

bicapsularis in se ipsam introrsum revolvitr et in duo loculamenta divis.

tandem articula expla. ptib articulatae junctis quae singulae semine turgent.

S. 1.a

fl. cujus pistill. abit in siliquam unicapsul et breve

Bechi Glycyrrhiza reglisse. sem ut pl. renifor fol. bina conjugat costae adhaerentia cui summae impar folium imnascitr γλυκυς dulcis ριζα radix Bechicum in tussi sicca affectib. pulmonum faucium et asperae arteriae. rad. recens frigide infunditr in ptisana renum et vesicae dolores lenit. succus in tussi et asper faucium ptisan edulcorat.

caulis altissim silig ampl radice dulci nigra donat scapent et pr flores pallidi caerulei aut violacei

Cicer pois chiche. siliq. vesicæ inflatæ simil. sem. caput arietinum quodammodo referen
aperit tartarum calculosorum frangit urinas movet

Lens lentille sem orbicul. utrinq convexis
decoctio levis alvum laxat exter detergit lenit utilime usurpatr in variolis cum albescunt et suppurant ad faciem abluendam. farina in catapl. resolvit emollit

Onobrychis sainfoin. siliq veluti cristata qdam echinata sem. unicum reniform. fl. in spicam densam nasci ὄνος asinus βρυχίω rudo qd ea depasta asini rudeant
resolut

vulneraria calyx tubul. turgidulo sem, subest siliqua in vesica ubram quæ calyx floris fuit recondita. a sanando vulnerum facultate dr
fol simplicia modo 3ª 4ª aut 5ª
decocta vel contusa vulneri applicata detergit suppuration inhibet et labia vulnerib conjungit

Dorychnium sem. unic subrot. fol ad exortum usq multifida in armaturam secundam caulem disposita

S. 2.a pist. abit in siliq. unicaps. long.

Faba calyx tubulat. dentat. feve, sem, plan. et quasi renifor. stipites firmi. folia bina veluti skaddendi conjugata costae in mucronem abeunti φάρω. edo. calix tubulat. pultis farinae cum lacte alvi fluxib. multum confert incrassat. astringit inflat; aq. fl. distillata cosmetica est et acido volatili calculum renum frangit

Lupinus. siliq. plan. sem. plan. aut sphaeric. folia flabellifor. seu digitatim pediculo innascentia resolvit hepatis et viscerum obstruct. levat menses urinas movet cosmeticum est pultis melli et aceto mixt. vel decocto rutae vermes necat externe pro tumor nascentib. interne astringit

Orobus. pist. membrana fimbriat. obvolut. siliq. teretem orbicul. sem plerumq. ovat. folia bina conjugata costae innascentia in mucronem abeunti ἐρέπτω edo Βοῦς bos - orobis boves saginabant antiqui sem. sale diuretico gaudet ut oia leguminosa ideo urinae et calculo pellendis convenit. hyp. hanc commendat in pleuritide, peripneumonia, nephritide tosta ut caffe lenius penetrat

Pisum pois. sem subrot. caules fistulosi ut pl. infirmi quos ita complectuntur folia ut a bullis transadigi videantur caetera folia bina costae in claviculas abeunti. basi costae adnascuntur quasi auriculae duae caulem seu costam amplectentes. farina emollit resolvit leviter, pisi decoctio lenit laxat; subtilia pisi aperit urinas movet, incrassat flatus excitat venerem ciet, pisa viridia et cortex in alvularis

Lathyrus gesse pitt. vagin. membran. fimbriat. volut. siliq. tere: vel compressam sem. cylindrac vel angul. caules compress cum costa alatu et margine foliato et folia tantum conjugata nervo ima scentia in claviculas abeunti

Nissolia a lathyro differt. fol. singul. caule claviculis carente

Clymenum fl. fr. caulib. Lathyri foliis vero multiplici conjugatione plures quam duo opposit. costae imascentib in claviculas abeunti

Ochrus siliq. atqui teretem et cylind. sem. subrot. fol. modo simplicia modo composit aliis foliis conjug in clavicul abeuntib

sem coct chylum viscidum parit ejus decoctum purgat leviter, detergit resolvit

Vicia vesse sem. subrot aut angul fol. bina quasi conjugata costae imascentia in clavicul. abeunti fol. per plures conjugationes caulib nec alatis nec compressis a vincedendo: quod capreolos habet utrobis bonum dat pabulum armentis

vicia differt a galanga costa in clavicul. abeunt. a clymeno caulib. non alatis nec gibbis

Ervum ex siliq. utrinq undulat. veluti nodosa sem. subrot. folia bina quasi conjugata farina aperit resolvit detergit

Galega siliq. teret et quasi cylind. sem. ut pl. oblong. veluti reniform. fol. bina conjugata costae affix. cui summae impar folium imminet. alexipharmac. praestans et sumit optim. remedium in peste in affectib. verbi gratia maxime in febrib. malign. variolis ad sudores movendos. in decoct. infus. aut aq. stillat

Astragaloides siliq. ejusdem aemul. sem reniform. differt ab astragalo siliqua unicapsulari astragalus vero bicapsularis

lavossa sauvaya
Aphaca. sem. subrot. folia bina. ad nodos ex quor. alis claviculae prodeunt. folia hastata oppos. abstergens et astring. seminis farina cum melle lentes et maculas cutis delet

S. 3a pist. abit in siliq. articulosam

Securidaca. siliq. recta plan. annulat. in singulis articulis semine foeta rhomboideo introrsum emarginato a securi ob seminis formam.

ornithopodium pied d'oiseau. siliq falcat. plerumq. undulatæ sem. subrot. siliq. plures simul nasc. aviumq. pedes æmulantur ὄρνις avis πους pes

ferrum equinum fer de cheval siliq. compressa articulis distincta lunatis ferri equini æmul. sem. falti ejusdem formæ
astringens hæmorragias sistit

hedysarum sainfoin despagne siliq. andulat. sem. utplur. reniform. fl. in spic. vel in capitul. collect. differt a securidaca fructus et sem. forma ab ornithopodio siliquar. dispositione
nascitur inter frumenta detergens et stomachic. gustu amaro

scorpioïdes chenille siliq cochleæ aut erucæ ad instar in se evolutam sem. utpl. ovatæ a scorpio cujus caudam æmulari dicitur
pulvis curat ulcera asinorum

S. 4.a de ~~flore~~ foliis ternis

Lotus Lotier siliq. interdum septis transversa positis velut in loculamenta divisam sem. ut pl. subrot. fol. terna sed ad pediculi exortum duabus aliis seu foliolis stipata.
aperit resolvit vulnerarium et detergens decoct. vel infus. ad emolliend. laxandum maturandum folia trita applicando

Trifolium sunt trifolii species quae flos est monopetal. multifiscus leguminos. pistil. vagin. fimbriata obvoluta. illud abit in capsul. in calyce caudat. reconditam sem. ut pl. reniform. per maturit. arcte capsul. adhaerente. raro sunt fol. quaterna aut quina nisi in quadrifolio adsunt stipulae caulem amplect.
astringit emollit detergit succus vel aq. stillat. ophtalmia ruborem oculorum dissipant et inflam. decoct. fluores alb. sistit intestinor. tormina sedat. oleum flor. infus. ad artuum tremores

Melilotus capsul. nud. non recondita ut in trifolio. sem. 1o vel 2o subrot. μελι mel quasi lotus mel olens ~~[illegible]~~ fol. terna singuli pedicul.
aperit resolvit flatus discutit optim. in colicis dolorib. abdom. inflam. pro ischuria colica nephritica ventosa hydrope tympanita et abdominis tensione in pleuritide decoct. infus. balneo cataplas. fiunt opt. vesiculis aviedin

Anonis arrete-beuf siliq. turgesc. longior aut brevior bivalvem sem. ut pl. reniform. folia 3o plerumque ydo. 9 nascuntur folia singularia boves omnes quasi cingrata
aperit urinam et menses movet in decoctis aper. cum foliis pro gargarism. in scorbut. faucium dolorib. gengivar inflam

foenugrecum siliq. nonnihil plan. incurv cornifor. sem. plerumq rhomboid. aut renif.
fol. 3° pediculo
emollit resolvit anodinum raro per os usurpat. in enemate detergit lenit ulcera intestin in dysenteria coliica confert

Medica luserne fr. cochleae aemul. sem ut pl. reniform. inter lamina a medis. ad folior. basim stipuli 2ae quoq cristati cauliculi non adhaerentib. orinal
incrassat refrigerat.

Medicago fr. plan. orbicul. quasi falcat. unob laminib. compositi
Sem. fere renifor.

Phaseolus haricot. siliq. long. sem. ut plr renif. vel ovat. quidam plantae habentur.
ob seminis formam quae phaselum (petit navir) repraesentat
fol. basi sua auriculis ornata. t. 3. foliis summo pedicul
siliquae sunt edulae, sem dat crassissimum nutrimentum hinc avadiunt hii qui violento exercitio donantur, studentib et quiescentib nocivae vires ut faba

Sect. 5a pillat ob. in siliq. bicapsular
Astragalus pisti vagina involut. sem. renif
flores a floris satis gratis red conversa

fol. bina quasi conjugat cui summae foliolum impar

Tragacantha barbe renard sem. renif. fol. bina veluti conjugata costae adhaer. in mucronem saepe abeunt τραγὸς hircus ἄκανθα spina dat gummi quod glutine suo irretit acria et lenit in morbis pectoris dissol. in aq. rosacea unde fit mucago ad incorpor. pulveres in tussi pectoris ariedine lymphia bronchiali spiritu inservit adhuc ad leniendum oculorum

Pelecinus i.e. vatean silig. bicapsula et bivalvea plan. sem. plan. ut plur. reniformi. ab astragalo differt siliquis planis dentatis

Corallodendron. vexillo longissimo ensiformi, aliis carinâ brevissi. pist. teres membrana fimbriatâ obvolut. silig. veluti nodos. bivalvem sem. renifor. κοράλλιον corallum δένδρον arbor propter floris colorem

Classis II^a

de fl. polyp. anomalo. id est multiformes ex plurimis petalis dissimilibus compositos qui singuli nomine comprehendi nequeunt

S. 1^a pist. abit in fr. unicapsularem

Balsamina vel tetrapetalos vel exapetal. inaequal. fl. tetrapetal. sup. fornicat. infer. caudatum et concavum 2^bus lateralib. [ressemblent en decoupt. comme un rabat] auritis amplioribus. fl. hexapetal. [petal. sape imbricat inter excavat] rarissimus. petal. infer. caudae expert. pist. 2^bus foliolis stipatum fr. nunc ex utraque parte turbinat. nunc siliquae aemulum ex pluribus veluti musculis constant. vi elastica huc illuc desilient sem. placent. seu axi affixa a balsamo

pro certo vulnerarium, fruct. in oleo amygdal. dulcium infus. soli vel balneo mariae balsamum est pro tendinum punctione vulneri inflammat. mammarum vimis. ustioni perniionibus

Viola violette fl. papilion. aemul. [pentapetal. les deux super. se etendent les 2 laterales comme des ailes] petal. [calyx 5 fid ad basin] infer. in caudam desinit. fr. plerumque trigon. tri fariam dehisc. sem ut plur. subrot.

sem. purgans hydrag. fol. emolliunt et laxant in decoct. in cataplasm. lenient. fom. flos pauliper purgat refrigerat anodin. demulcet antiphlogist

Fumaria fume terre. papilio. aemul. ex 2^bus petal. quasi labiat. labio sup. in caudam abeunte cum infer. ad pediculum ejunct. hoec inter labia velut in palato cujus os a ligula occupatur, pist. vagina obvolut. fr. membranae nunc longa nunc brevis sem subrot. fol. tenuiter dissecti et caesiis

aperit diuretica sudorific purgans pro varia dosi, vetustas viscerum obstructiones levat morbos saepe curat hereditos decoct. infus. longo tempore assumpta ictericos et iterum conduxit

a fumo. claritatem facit inuncti; oculis delacry mationemq cen fumus explicuit.

Capnoides fumariæ flori omnino simili siliqu. long et tere ex duab valv. fenestræ adhæ rescentibus composit. sem. subrot eidem fenestr affix

Reseda quandoque subrot petal. dissimilib. capsul. membrana pleraq trigon. aut tetragon. oblong. veluti cylindrac urn sem. subrot. a sedandis morbis. e plinio. discutit collectiones inflamatões q omnes; resolvit erucæ ferme vires habet itero confect

Luteola gaude. fr. pene glob. concavatum tricuspidem sem. subrot a luteo colore quem pannis conciliat
aperit radix urinam et sudores provocat vires habet rubiæ dexipharmacon etiam ut theriaca rusticorum ut panacea olim habebatur

S.2.a petal. abest in fr. multicapsular
Sesamoides flore resedæ fr. vero multiplici alias polyceratos in singulis corniculis sem. parve

136 renifor. alias vero multicapsularis sed stellatus

Aconitum 5^e^ petal. caput humanum galeatum vel cucullatum repraesen. petal. sup. galeam vel cuculli, infera duo eam cassidis ptem quae maxillam inferiorem tuetur, alae vero aliam quae tempora exhibere videntur. e fl. meditullio surgunt stili duo pediformes in petalo super reconditi in fructu velut in capitulum colligunt vaginae membranaceae sem angul utpl. et rugosis.
nascit in nudis cautib quas aconas nominant.
aconitum salutiferum sive anthora est antidotum praestans
folia rotund. incis

Delphinium pié dalouette petal superi. in caudam terminatr excipitq aliud petalum bifidum pariter caudatum fr. in quo velut in capitulum colligunt vaginae secundum longitud. dehiscen. sem. utpl. angulatis. a forma floris nondum explicati vel a foliis quae delphinorum effigiem repraesentant.
flores maxime in usu macerantr in aq. rosar et oculis applicantr vel liquore ipso lavantur. ad inflam
delphin. platon. fol. staphisagr. sem. causticum potenter detergit vulnerari, masticator pediculos enecat.

Aquilegia <u>ancholie</u> petala non-nulla 5ª plana caetera 5ª cucullata utraq simul alterno ordine posita pist. stam. stipatum. fr. in quo colligunt vaginae membrana incapitat. sem utpl. ovat. plani. foliis glaucis ad thalictrum accedentib. ab aquila cujus ungues petalis cucullatis et aduncis refert dicitur
flor. proven. sem nigr lucid fol in lucubrationes incis
detergit rad. pulver. in vino albo in colica nephretica ictero etiam prodest sem, tum et in scorbuto squinantia gargarisma

Fraxinella 5ª utpl. petal. ex calyce innumera staminum congeries fr. in quo collig. vaginam aduncam complectentes vi elastica brevi ferium dehisc. cornuum arietis in modum sese inflectentem sem. nigr lucid utpl. turbinat. fol. super ut fraxini flor spicat
costam conjugata unica in extremitate. odor resinosa. ejus athmosph. est inflammabilis alexipharmaca radix et antiepilept. sudores urinas menses movet vermes enecat fol et flor instar thé ad vapor hist.
cateq ad partum et lochia pellenda

Cardamindum <u>capucine</u> 5. petal: ex incisuris calycis nascentib. pist in caudam desinentis fr. in quo collig. ternae utpl. capsulae subrot sem. subrot. fol umbilicata longo pediculo insi dentia
culinae utilior quam medicinae flores tn et folia antiscorbutic

127 pimprenelle d'afrique Cl. 11.a

Melianthus 1or petal. nunc flabelli nunc coni ad instar posit. caly. inaequaliter mu[...] tusso, fr. vesicae aemul. tetragon. in 4or locul. divis. sem. subrot. μέλι mel ανθος flos cujus abundat melle
stomachic. spir. roborat et vires reficit

Corindum pois de merveille 4. petal cruciformiter opposit. totidemq minoribus pleru[...] aduncis meditullium occupantib. alque cum fol. carpo petal. ex calyce tetraphy[llo] pit. fr. vesicae aemul in 8a div. sem. fere glob. nota cordiformi donatis

S. 3.a calyx abit in fructum seminibus minutissimis plerum[que]

Orchis 6. petal. 5e super. galeam quodammodo aemul. inferior: multiform. capitato ut pl. supp[...] inferius caudato nunc hominem nudum, papilionem, fucum columb. simiam, lacertum, psittacum muscam &c repraesen. fr. seu utriculum 3.bu fenestris pervium quib adhaerese. valvae sem. minutt. ad instar scobis rad. carnos. fibrat. nunc subrot. testicul. instar nunc compressae in digitos fere desinentes ὄρχις testiculus ob radicum formam. siccatae radices incidunt et aperiunt in melancholia
alexiteria et cardiaca est in pulv ad ʒß ad ʒii
orgasmum venereum et titillationem in partib genitalib excitat radix et sem. in vino epotum venerem in sterilib ciet, conserva semen auget, uterum roborat et calefacit ad venerem

Helleborine 6. petal. quor. 5° in orbem posit. inferius in medio stat vero imbricat fr. seu utriculum trib. fenestr: pervium quib. adhaeres. valvae sem. minut. instar scobis. rad. fibratae. a similitu fol. hellebori albi. fol vulner
ab orchide distinct quia cauda caret et radicibus fibratis; ab ophride floris forma

Calceolus sabot 6. petal. quor. 4.or inaequal crucis adinstar posit. caetera medituli. tenent petalum qd bifidum petalo incumbit turgescenti cavo lignei calcei aemulo fr. seu utriculum tribus fenestr: pervium quib adhaeres. valvae sem. omin adinstar scobis. a calcei formâ

Limodorum orchidis aemulo fl. fr. 3.16 fenestr. pervium valvae. sem. adinstar scobis. differt ab orchide radicib fibratis ab helleborine fl. calcari donato ab ophride foliolis alterno ordine nascent, caulibus squamosis. rad. fibr. vivas habet hypocistis

130 **ophris** double feuille 6. petal. 5 superi-
ibu disponuntr ut galeam quodammodo aemulentr
infer. capitato et quasi antropomorpho fr. 3^{ob}
fenestr pervium valvae sem. ad instar scobis.
disquitr ab orchide ~~foliis~~ vadicib. fibratis. fol. vulnerar
trita. vulnerarium detergens, trita in oleo olivarum infus
fit balsam ulcerib detergendis aptissim

Nidus avis nid d'oiseau 6. petal. 5^e.
sup. ita dispon. ut galeam referant. infer. caput
bifido fr. seu utriculus sem. minutiss ad instar
scobis. radices fibratae nidi avis aemulae
disquitr ab orchide et limodoro ~~...~~ radicib. in ~~...~~
fasciculum collectis. caule subflavo

Des fleurs a fleurons

Les fleurs a fleurons sont composees de plusieurs
petites fleurs quon apelle fleurons. ces fleurons sont
le plus souvent des tuyaux evases sur le haut et decoup
en pointe ils portent presque dans toutes les fleurs sur
un embrion de graine chaque embrion est porte sur la
couche qui est au fond du calice qui enveloppant la partie
inferieure et moyenne des fleurons fait ordi.^{mt} prendre la fig
dune ecosse du haut de chaque embrion s'eleve un filet qui passe a
travers d'un tuyau plus grele dont chaque fleuron est garni [illegible]
[illegible] la [illegible] qui commence [illegible] filets [illegible] qui naissent de
[illegible] chaque graine est [illegible]

De flore flosculoso **Classis 12ª**

S. 1ª fl. flosculosas steriles

Xanthium petite bardane e flosculo surgit stamen
c'est un bouquet de fleurons semblables a de petites vessies
apice plerq bifido. embryones oriunt a floribus
separati fr. oblong plerq aculeatum in 2° divid.
sem. oblong ξανθος flavus. qd fructus. collectus
antequam siccescat perfecte, deinde tusus et fict. i vase
reconditus flavos facit capillos
aperit decoct, succus vel extractu in obstruct. ign. volatil dartres
aliisq morbis cutaneis ad sang. depurand. maxime confert
folia trita resolvunt ut lappa sem. vino albo infus sabulum
renum expellit

Ambrosia. ~~ambrosia~~ ambrosie a fl. separati abeunt
in fr. clavæ æmul sem. plerq oblong Βρῶμα
cibus θεὸς deus
odoratissima succis calidis et aromaticis pollens vinum
redolet, resolvit cordiaca et cephalica est dicunt veteres
sanitatem tueri

Gnaphalodes. embry. qui calycem
floris cōstituebant abeunt in fr. cristat. sem plerq
oblong

S. 2ª flos flosculosus regularis fertilis sem. pappis instructo in capitulis simplicibus collect.

Carduus chardon. flosculis multis caly.
squammato aculeato sem pappis indut
omnes cardui in genere cardiaci censentur
carduus benedict diaphoreticus est praestans alexipharm...
sudores urinas pellit potionum cordialium basis
...lutrapa seu stellat. aperit calculum frangit pellit
cortex infus dolori nephritico sem. viscosi vesicæ humores pellit

Cinara artichaut flosculi petal. multif. calyce com. squam. plerumque aculeatis comprehen. totius plantae facies qua a carduis distingui solet
acido volatili sulphureo aperit ad venerem stimulat

Jacea floscul. multif. calyx squam. non aculeatis distat a carduo calycib. non spinosis a cirsio fol. non aculeatis, a jacendo qd. plerumque supina et jaceat a scabiosa foliis alternatim positis
vulneraria astringens et ... interne conducit morbis faucium in gargarism. asthmatis et pulmonum infarctib. exter in tergendis pravis ... et abstergendis ulcerib.

Cyanus casse lunette le bluet. oeil de perdrix flosculi dissimil. qui medium floris occupant minores in lacinias aequales divis. caeteri majores ad circumferentiam. sunt veluti labiati calyc. squam. non aculeato. a jacea distinguitur flosculor. circumferent. magnitudin. pot. unicum genus constituere cum jacea. utrique flosculi embryonib. insident ophtalmicus est oculor. ulcera detergit aq. distill. ex florib. inflammati et rubedini oculor. optim. succus ... maculas paulatim ... intus vulnerarius

Cirsium *chardon hemorroidal* flosal. multif. caly: squam non aculeat. folia aculeis mollibus munita κίρσοι varices. cirsio igit proprium est ut folia gerat aculeata calicem nequaquam jacea ut aculeis careat carduus vero calicem habet spinosum
succus ejus cum axungia aut butyro recenti commixtus [illegible] ad haemorrhoid. resolvit et emollit

Centaurium majus flosul. multif. caly squam. non aculeato. floris magnitudo insignis qua differt a jacea. a centaurio chirone medico qui primus hanc ad podagram et ad alios morbos sanandos
radix in usu astringens vulneraria in decoct infus aut pulver ingredit pulver [illegible] [illegible] in asthmatic et ischiad.

Lappa bardane flosul multif. calyce squam. hamatoq. ac vestib haerente. sem pppis utpl. brevib λάβειν capere qd vestib. haereat
radix aperit detergit [illegible] et sudorifi decoct in febrib malign et variolis optim. folia potenter resolvunt et vulneraria sunt pro tumorib oedematosis. sem. praestant diuretic. succus contra morsus viperae

Petasites *herbe aux teigneux* flosul. multif caly. cylind multiciss flores prius nasc. quam folia. ob foliorum formam et amplitudinem petasus chapeau
aperit diaphoret. alexiterium antihister. radix vino albo infusa menses urinas pellit in variolis febrib malignis fol in anasarca exter appli. contusionis. discutit. pleuritid. asthmati. tussi [illegible] ut vina convenit

Cnicus flosul. multif. calyce squamoso sed amplioribus foliis capitelli instar circumvalato qua differt a carduo d. carduus benedict

flosculis in [illegible] minor

Cacalia petal. quadrifari divi, caly. veluti cylindraic dentat. differt a senecione flosculis 4or fariam scissis tum et calyce ad oram dentato. fol. subrot. ab eupatorio distinguit. petiolis minori et minus laciniato

Bech. **Elychrysum** immortelle pied de chat flosal. stellae instar divisis calyce squammoso splendido aureo, argenteo aut alterius coloris insigni, sem. pappo[sum]
bechicum est prasterus et astringit. fl: et fol in ptisanis et apozem. bechicis praescrib. et affectib. pectoris et pulmon. ut aut decoct. confert etiam haemoptisi dysenteriae menstrum fluxui immodico

Pector **Filago** herbe a cotton flosc. stellae instar div. caly. squam. sed nequaquam splendente aut neq. splendid nec argentea aut aureo specioso [illegible]. flosculi qui discum occupant sterilis stamina [illegible] donantur fertiles vero limbum
subinermia astringens bechica est fol. et fl. infus aut decoct. in profluvii sanguinis dysenteria [illegible] utuntur angli pro cataplas. in contusionib. fl. cujuvis substituitur

Conyza flosculi multif. calyx squam. plerumque cylindraci κωνωψ culex ex dioscor. bestias fugat culices abigit et pulices
aperit calefacit exsiccat

+ sonscio ejus calyx post floris maturitatem inrati solet
emolliens et leniens, resolvens aperiens [illegible] in enemate
contusa vel bullita in lact. vel butyro recenti frixa optim
catapl in mam inflam. [illegible] gramosu succus cum cerevisia melle
et pustulis mixtus intero fluori albo, vomitui et haemophthisi [illegible]

Eupatorium e flosul. multif. surgunt longa. styl.
capillam. bifid. caly. long. tenui tevet ac squam, a
rege eupatore. a conyza differt calycis forma et colore purpureo ou viridelia
hepaticum et aperiens ant. hyster [illegible] vulnerarium
viscer. obstructioib a diuturnis morbis in hydropysin ducent
maxime levat folia decocta pro cataplasmate tumores [illegible]
inguinum [illegible] dissipant.

Senecio differt a conyza et eupatorio calyc. forma v. 136
— calyx cylindr. ad basin [illegible] ubi amplicat et reflect. post semi. mat

S. 3 sem. pappus [illegible]

o. Carthamus graine de perroquet safran batard flosul multif
calyc. squam. et foliat. χαθαριζω purgo
flosculi desiccant ad colorem croceum pannis imprimendum
flores conditi aperiunt croco substituunt. sem decoctum purgat
sed quia tormina et flatus excitat corrigitur aniso et cinnamomo
tabellae diacarthami hydragogae

c Absinthium fl. exiguo. flosul multif
calyc. subrot. squam. disting. [illegible] facie quae sola ab
abrotano differt nam utriusq generis et amar. insip
incan. virese lignosae herbae. fol. in ampl vel [illegible] lacini. diss.
a. non ψίν θος voluptas. stomachicum et confert
vermib necandis et medetur ulcerib, sale aut sp fixo eius
corrigit vicida [illegible] detergit roborat aperit, folia in [illegible]
et spiritis [illegible] in morbis chronicis cachexia chlorosi

Abrotanum aurone flosb et facie. absinth
a quo sola facie differt a. non βροτὸς mortalis
qd perpetuo vireat. vel a. non βρωσκω comedo
ob saporem ingrat
acrimoniam [illegible] detergit resolvit aperit [illegible]
cum nitro specificum habetur in urina et calculo retenti.
vires habet absinthii

Artemisia armoise floscul. multif. caly squam. inter floscul. occurrunt embryones nudi in capill. bifid. desinent, sem. absinthii aemul. a b absinthio differt sola facie externa. a regina Caria foeminar. malis medeh, antihisterica sulso acri volatili, cale facit resolvit detergit, folia et flores in decocto hysteri pro balneis pedum. utilissima cum pari quantitate mercurialis ad menses ciendos, in oib. morbis capitis in convulsione

Santolina petit cypres garderobe floscul flores sunt globati multif foliolis imbricatis intermediis caly. squam sem striat long. foliola exigua inter floscul quasi haemisphaerico flores absinth. et abrotano majore splendidiores stomachica et diaphoretica, anticolica absynthii loco et eodem modo usurpatur vermifuga

Senecio referri debet ad S. 2am. pagin praecedn floscul. multif caly monophill. cylin. multicuss. postea conformi sem. pappis instr. quo tpore calyx deorsum inverti solet ὑπὸ vere γέρων senex quasi verno tpore senescens qd flores canescant

gnaphalinum flosul. multif. foliolis imbricatis intermed. caly. squam. quasi hemisphae. sem. calyptra munitum γραφαλον to
embriones abeunt in fructum spatiosum semine lucci et calyptra acuta
mentum
flor aromat paululum amaris subis gustus, mellis piperam redolet vino infusa ad iterum habet quasi specifica

Tanacetum tanasie sericeal rotund flosul multif caly squam. quasi haemisphae flores crassi in capitulum collecti. folia quasi conjugatim incisa
aperit pituitam dissipat obstructionas levat in hydrope ictero chlorosi, vermes enecat, febrifuga est. conserva florum in epilepsia vertigine laudat. decocta cum foeniculis vini et succo ebuli, optima remed. hydropis. tanaceum

Bidens. fl. plerumq flosulos. petal. multif. quandoq occurrunt semi flosul. sem. in aculeos desinens saepe tridentis informa.

S. 4 ae

flosculis in lacinias aequales div. calyci prio insident.
Echinopus. fl. globosa flosal multif sem. involucro quadrangulari squam. flori caly. fuit thalamo affix

flosculis in lacinias inæquales ut pl. div. caly: prio
Scabiosa flosul. inequal. calyci comuni
comprehensis qui medium occupant, q. aut 5e fidi
cœteri ad oram positi bilabiati singuli semor gowis
supremæ pti coronatæ insident caly. prio comprehendunt
qui deinde abit in caps. vel simpl. vel infondibul.
sem. coronato, a scabie quam sanare dic. fol. conjug.
diaph. sudorif. bechic. vulner. scabiei medetur sanguinem depur.
sanat ulcerib. et abcessib. internis optim in malis cutaneis
aq. stillat. cordial et sudorif.
il y a des especes de scabieuses dont les fleurons sont differents
dont les graines de graine sont garnis d'une gaine et la graine surmontée d'une

Dipsacus chardon a bonnetier floscul
in capitul. collecti favi æmul. capitulum componitur
plur. fol. imbricat squamar. instar posit. et axi
medio affix. e quor. alis surgunt flosc. mult.
embryonis pti supremæ insid. abeunt in sem. plerumque
striat. Διψάω sitio propter cavos sinus qua
pte bina folia ad geniculum copulant. quib. aquas
ex rore et imbribus in se colligunt.
radix abstergens masticata et deglutita sitim auget; cocta in
vino et trita ad cavas consistent. rimas ani, porros et verrucas
curat pro unguento. aq. foliis collecta oculi inflam et rubed.

purg **Globularia** flosculis unilabiatis multif.
caly. proprio, sem. in capsula a flosculi calyx format
sic dicta ob florum dispositionem in globum

Amaranthoides fl. flosc. in capitul. squam. collect. axi squamatim nascunt bina folia imbricata chelar cancror. æmul flosculum çplectantia multifidum calyce obvolutum pistil. calyptra obvol. sem. subrot. plerq adunc

Gundelia in capitul. ex communi calyce embryones in loculamentis calycis sem. ex rotund et pl. acuminata - a D. gundelio

Des fleurs a demi fleurons

ce sont des bouquets applatis au dessus composes de demi fleurons disposes en rond qui forment ordinairement par leur extremitéqui est superieure des cercles concentriques.
chaque demi fleurons est fistuleux par le bas aplati en feuille dans le reste et garni dune guaine qui commance le plus souvent par cinq petits filets et qui donne passage a un autre petit filet qui sort du fond de lembrion de la graine.
tous les demi fleurons sont soutenus par un calyce dont le fond est nommé la couche. ils portent chacun sur un embrion de graine dans quelques genres ils sont separes les uns des autres par quelques feuilles posees aplomb, on trouve des graines ornees dune couronne fort deliee et dautres dun chapiteau de feuilles, ces graines portent sur la couche qui est le fond du calyce dont les feuilles se renversent presque toujours

semiflosculosi lac praebent

Classis 13.

S. 1

de fl. semiflosculoso semine pappis instructo

Dens leonis sem pappis instr. in capitul collect thalamo affix. flores nascuntur pediculis plerumque fistulosis sed non ramosis, a foliorum figura quae leonis maxillam dentib. suis instructam aemulari dr. taraxacum officin. aperit extra astringit crudo laxat decoct. ... decoct. in aceto ... succus gonhorreae confert lienteriae dysenteriae
pilosella offi. absorbet vuln. astring. dysent. diarrhoeae extra vulnera claudit in herniis confert ... haemorrhagiis conducit

hieracium herbe à l'epervier caules ramosi et facies propria quae a scorzonera et aliis differt Ἱέραξ accipiter quoniam accipitres scalpendo eam succo oculos tingendo obscuritatem discutiunt
differt a dente leonis caulibus ramosis foliolis aliquot instruct vires habet cichoreae lac hujus plantae cum lacte muliebri ... specificum habetur in morbis oculor
pilosella differt a praecedent. foliis pilis hirsut

Lactuca in qua semina maturescunt caly: squamm. oblong tenui. ... plantae facies propria. a lactis copia qua abundat vel quam afferre nutricib. dr.
omnes emolliunt acrem humorum hebetant refrigerant urinam ... alvum laxant extra emolli. resolvunt maturant lac augent. biliosis ventriculo calido aptae. usus nimius sem. et venerem torpet et extinguit. julep. refrig. ingreditur

Sonchus laitron caules fistulosi tener caly. crasso perma... conicus fave. post floris delapsum calyx inflec... aperit humectat antiphlogisticus et lac puerperis auge... in inflam. pectoris hepatis intestin decoct convenit, succus ardores stomachi, asthmaticis stranguriae prodest. lac hujus ad vulnera opt.

Chondrilla caly. ad basim ipsius veluti tubul. ac cylindric.
Χονδρος grumus qd circa ipsos ramulos gum
mi reperitr mastiches simile fabæ magnitudin. qd
cum myrrha tritum et in linteo olivæ instar appositu
menses trahit. differt a soncho et cæteris calyci
forma teri non squam
hepatica refrigerans brassicæ vires habet

Zacintha herbe aux verrues caly. squam. qui deinde abit in
capitellum spicat. cujus singulæ partes seu capsulæ
semine turgescunt. ab insula Zacintha
vulneraria est et detergens in acetariis comeditr folia
verrucis applicata conducunt.

Scorzonera caly. oblong et squam. d'un balustre de la figure
sem. cortice seu involucro plerumque obductum a voce
catalonica escorso quæ viperam significat. differt
a lactuca tum sem. forma tum seminie pria
rad. egregie temperat urinas movet bechica est et paululum
sudorifica unde in omnib morbis malignis ubi demulcendum
in variolis pecto, febr ardent. peripneum pleuritide. succus
in morbis inflam. tinta morsui viperæ applicata confert

Tragopogon barbe de bouc caly. multif
nequaquam squama, semen membrana seu involucro
obvolutum pappis instructum thalamo affix.
Τραγος hircus πωγων barba pta semina barbata
e summo enim calyce prolyxa erumpit lanugo
vires habet scorsoneræ paulo debiliores aperit bechica diaph
oretica blande cauterit vias expedit emollit demulcet maturant
in asthmate anhelosa

S. 2[a] sem. nullis pappis inst.

Catananace [herbe au brwit] calyce squam. sem. capitulo foliato instructum in ipso calice reconditum

Hedypnois [la dormeuse] fr. quasi meloni for. * calyx fere cylindr. gemino sem. fetum aliud capitulo quodam [aut scopula] instructo medium fl. occupat aliud oram tenet velut umbilicatum [sociatum] calyci folio seu capsula obvolutum caules humifusa

Cichorium chicorée calyx contractilo et velut in capsulam abit sem. angul. quasi cuneifor. umbilic. et ad oram membran. donat. aperit amara, stomachica paululum refrigerat flores cordiales syr. cum rheo compositus ad vermes infant

Lampsana [l'herbe aux dartres] calyc. monophil et multifid. qui abit in capsul. striat. sem. utpl. tenuit et acutis, pappo destitutis unde a b. Vaillantio disjuncta, intus ut lactuca tam in oleribus quam acetariis decoctum in cataplasmate emollit catar. detergit in unguentis form. catarrh. succo strumae porrigine sanari dicitur gallos, dartres

Rhagadiolus (herbe aux gersures) semiflosculi a calyce
comprehendunt cujus folia abeunt in totidem vaginas
utpl. stellæ in modum dispo. que continent unum sem. plerq longo et curvatum
Lenit aperit diuretica in rhagadib. seu fissuris

Scolymus <u>epine jaune</u> semiflosculi
separantr ab invicem a foliolo. calyce squamo.
sem. foliolo adhæres: thalamoq affix. calyce vacondit

Des fleurs radiées

Les fleurs radiées sont des bouquets aplatis par dessus composés de deux parties celle du milieu s'apelle le disque ou le bassin on donne le nom de couronne a celle qui est autour de ce bassin.

Le disque est un amas de fleurons qui portent chacun sur un embrion de graine. la couronne est le plus souvent formée par plusieurs demi fleurons portés ord.t sur un autre embrion nous avons fort peu de fleurs dont la couronne soit composée de feuilles plates. toutes ces parties sont soutenues par le calyce.

Lorsque la fleur est passée chaque embrion devient une graine chargée d'une aigrette dans quelques especes, dans d'autres ornées d'un chapiteau de feuilles. il y en a dont les graines n'ont ni aigrettes ni chapiteaux et l'on en trouve qui sont séparées entr'elles par des feuilles ~~[illegible]~~ creuses enfin on en remarque qui sont bordées d'un petit feuillet d'autres qui sont enfermées dans une capsule

Classis 14^a

S. 1^a

De flore radiato semine pappis instructo

extr. **Aster** aulnee discus ex flosal. corona ex semiflosul. embryonib insident. caly. squam, sem. thalamo affix. ἀστὴρ stella foliolis stellæ modo radiatis

a. jacobæa distgt calyce squam a virga aurea floribus non in spicam

aster atticus refrigerat digerit exsiccat flos decoct. squinan. et inguin. epilepsiæ

enula campana incidit aperit detergit maceratu in vino albo per 3 dies [illegible] chlorosi medetur menses lochyia supp. nollit fit stomachi cum multo vit

virga aurea caly. squam. flores longa serie in summis ramulis nascentes. a florum colore et ordine nomen. qua distingt. ab aster.

[illegible] vulneraria est fol et fl. instar the aut decoct utilissim. in ischur, gravedine, nephritide viscerum obstruct vesicæ affectib, ulcerib ext. et inter opt. instar the cum melle edulcorata utilissime in ischuria gravedina nephritide obstruct ex profluvii sanguin. hæmorragii dissentariæ maxime [illegible]

ext. **Jacobæa** achillee calyce tubi for. ac multifid. sem thalamo affix. quasi flos sancti jacobi. fol circa fl. flor. fl. vulneraria detergens, emolliens eresipelati conducit dolorib faucium in gargarismate commendatur imprimis in angina ulcerib contusionib in cataplasmate

hi **Tussilago** pas dane caly. multif flores filus ante natum, flos unicus pediculo fol. subrot. incana prius quam folia nascunt. a sedanda tussi summum bechicum incisivum in pulmonum faucium et asperæ arteriæ tussi tabe pleuritide, asthmate phtisi vomicâ et ulcerib pulmon. fol. fl. rad decoct infus in eclegmatib ad expectorationem. ex ea syr ad expectora ex foliis fiunt suffumigationes

Doronicum caly: pelor for. apert multifido
differt a jacobæa calycis formâ in plures lacinias
profunde dissect
radix recens succum dat qui nauseas, sicca vero cardiaca
et calida est. radice utebatur gesnerus cum viro gentiana et
astrantia in epilepsia et vertiginib

S. 2a sem. capitulo foliato

Tagetes oeillet d'inde flosal. inaequal disci, alii dispar multif,
caly. monophyl. tubulato dentat. sem. angul. foliis termin. occurrunt
pleriqueflores ex flosculis fistulosis compositi. foliis
foetidis et ad nerum fere incedis. folia ad lanceol ...

Corona solis soleil embryones foliol
imbricatis inter se distincti caly. squam. floris
forma et colore nomen. sem. duob foliolis instructa
napposa cuneiformia et 2 vel 3 denticulis ad extremitates
differt a chrysanthem. flosculis foliolis intra distinct. et seminis
foliis stipat

S. 3a

Semine pappis et capitulis foliosis carente
Bellis paquerette caly. simplici et multif
sem. thalamo ut pl. pyramidato affix foliis subrot.
ad oram incisis dense nascentibus
a leucanthemo florib longo pediculo ex radice ipsa
nascentib. varietates dat jucundas in hortis excolit
vulneraria est, detergit, aperit. folia una cum geranio
robertiano sub cinerib calidis mortificata capitis dolores
ut la migraine levare di

Chrysanthemum caly. semi sphaer. et squam, sem. plerq angul. aut striata vel tenuia et acuta χρύσος aurum ἄνθεμον flos flores [illegible] luteï
vulnerarium ut detergens ut bellis

Leucanthemum marguerite a chrysanthemo differt solo semiflosculor. vel corona colore qui omnino candicant λευκὸς albus
vocatur pyrethrum canariensium
vulnerarium abstergens ut bellis

Matricaria caly. semisphae. squam. sem. oblong. flores quasi per fasciculos nasc et folia multifariam et quasi per conjugationes ad basin secantur et ad oras iterum secantur a matrice seu femina cui auxiliari di flores corona candid. discum luteum plerumque
sive parthenium aperit vocat menstrua reliquias secundinae molem lochia retenta a causa frigida pellit; fol flor in. biber aq. macerant, vermes enecat, extus tumores resolvit balnea partheniae menses cient cum aliis emmenagogis

Chamaemelum camomille. caly squam. folia in tenuissi. lacinias div. totiusq plantae facies χαμαὶ humi μῆλον pomum qd nonnull pomum redolent. flores sparsi hinc et inde discum luteum coron alb

Cotula fl. nunc radiat. nunc flosculoso caly. plerumq squam. sem. plan. cordiformia quasi alata ac compressa quib notis a chamaemelo distinguitr
radix cotulae americanae est pyrethrum. in affectib sopor apoplex. epilep. dolorib dentium, optimum salivam serum dissipat gingivas roborat

ent **Buphthalmum** oeil de boeuf flosul foliolo imbricato inter se distinct. caly. squam sem. plerq tenuia et angulosa. plantae facies differt a matricaria florib qui plerq singulares a bellide ~~[illegible]~~ foliis quae tanaceti modo quasi per conjugationes secantr ad basin et ad oras itidem secant. Bous bo a chamaemelo foliis minus dissectis οφθαλμος oculus. a tanaceto et millefolio disting florib majorib in fasciculum non collecti
vulneraria astringens, cephalica sicuti millefolium et tanacetum

Millefolium. caly. squam. ferme cylindr, sem. tenuia. folia tenuiter secantr flores in fasciculos densos nasc. flos ejusdem coloris in disco et corona
vulnerarium est astringens, detergens praestantiss intus et extus ad omnes haemorragias sistendas decoct infus. hit vulnerib scissis applicatr folia instar the optim. in mixtione sanguinis, sputo sanguin haemorroid. et ad sin ulcera intern. detergenda. inq. stillat epileps conducit, vinum medicatum diarrheas curat

errh **Ptarmica** herbe a sternuer caly. squam. sem. tenuia. flora in fasciul densos
fol vel denticulata vel in amplas lacinias div,
a millefolii incisuris aliena πταρμος ster
nutatio. in cacumine capitulum habet uti
anthemidis parvum rotundum acri odore ster
nutamenta ciens. fl. simplici pediculo
aperit discutit; fol pulver. naso hausta sternuta
radix masticata odontalgiam levat, phlegmate cerebrum
exonerat vulneraria astringens resolvens

e **Asteriscus** caly. stellatus florem
superans sem plan. pleraque marginatu
ἀστερίσκος exigua stella floris forma
calyce distinguit

e**Asteroides** caly. squam. sem. pleraque oblonga
ob astere tum differt semine pappis carente

S. 4 sem. in capsula reconditu

Caltha souci capsul. pleraque incurva
et marginat. sem. ut pl. oblong. foliis oblong
crassiusculis odore gravi et proprio
aperit tinctura ad icterum et omnes obstractione
viscerum, flores verrucas ungendo corrodunt.

S. 5[a] Corona ex petal. planis spont

Xeranthemum immortelle corona ex petal plan.

150 nulli embryoni sed eodem caly. cum flosculis
disci. sem. capitulo foliato instruct. ξηρος
sicuus ἄνθεμον flos hujus generis flores
diu durant et gallice vocantur immortelles
ad classem flosculosorum

Carlina caly. spinoso et amplo sem
squamulae quodam
pappis instructa folio imbricato interse discta
Carolo magno ab angelo demonst. ad pestem
rad. alexit. sudorif. cordialis acido volatili aperit
discutit vermes enecat infus aut decoct in asthmate
hydrop nascenti et febrib. vib. ex contagio
rustici hac utuntur ad praenunciandum serenum et
humidum ξηρος

on donne le nom de calice aux feuilles de la fleur lorsquelles devienent l'envelope ou la capsule des semences sans avoir egard a la couleur et on les apelles feuilles de fleurs ou petales lorsquelles ne servent pas d'envelope

Classis 15ª

Flos apetalos seu stamineus et capillaceus petal. caret ex stam. seu capillam. cstat nam q̄ petala dici possent pro calyce habenda sunt, cum abeant in seminis involucrum necessum est ut eorum post sem. evadat. cum floris. stamineis alios junxi eius demformis sed a fructu separatos

S. 1ª

flos stamineus cujus calycis poste. pars abit in fructum

Asarum cabaret oreille d'homme fl. plurib. stam. cstantib. purg. e calyce tripartito surgentib. fr. utp. angul in 6. div sem. oblong. a. non: σαίρω orno. ? hedera simil apparit incidit emeticum et purgans radix inter vomitoria infus. vino et pulverata abundantes urinas movet folia vehementius purgant quam radix febrifug. etiam est

Beta poirée caly 5.e folio. persist. fructui ad basin flores plures velut in capitul colliguntur 2 vel tres simul fr. fere glob. rugos, in quo 2 vel 3 semin. re... refrigerat laxat, fol. emolliunt t perant extus applicata. ex radice betae alb. fiunt suppoit pueris applicanda ad laxandum

S. 2ª

pist. abit in sem. calyce obvolutum

Acetosa ozeille. caly hexaphyllo pist. ornato extus 3 foliat duplici ordine sem. triang capsula obvolutum hoc cstat ex 3bus foliolis calycis ceteris marcescentib. ab acetoso folior sapore nimium sanguinis motum compescit acido suo refrigerans ... bilis acrimoniam t perat febris continuae ... ... in jusculis scorbuticor, folia extus applicata cum fermento secalino potenter resol et matura succus ... gingivas

differe de loseille par le calyce dont les trois feuilles du calyce qui restent apres que la fleur est passee ~~[illegible]~~ ne sont point appliquees contre la semence mais reflechies sur le pedicule 5.

152 **Lapathum** patience ab acetosa solo sapore diversum λαπάζω purgo decocto olere omnium specier. alvus emollitur; calycis folia subsit reflexa aperit detergit, resolvit commentator praecipue radix ad scabiem ignem silvat, etc. q morb cutan. in formam unguenti cum enula campana et butyro contritum et mixtum ad linimentum astringens in haemorragiis
Mr ray veut que les racines soient jaunes ameres, purgatives et que celles de l'oseille soient astringentes aigres et rafraichissantes,

Atriplex arroche caly. pentaphyllo sem. orbicul. plan. ipso calyce seu capsula obvolutum. alio praeterea fructu donantur a floribus sejuncto embryo enim longe amplior fit ex duobus foliolis constans angulatis aut cordiformi plan. sem. subrot. plan. arcte complectentib emollit refrigerat laxat resolvit intus et extus paululum purgat

Chenopodium pate d'oye stam 5. calyce multif. sem. orbicul plan. in capsula veluti stelliformi quae floris calyx fuit reconditum
χὴν anser πούς pes
fetidum qd vulvaria anti hysterica est in enemat decoct infus aut in conserva cum saccharo,

Blitum blete m 3 calij. tripartito, sem plerumq oblong in capsula vesicae aemula quae calyx floris fuit βλητοῖς rejiciendum quam olis insipidum monospermos est fructus bliti, amaranthi vero polyspermos
emolliens sicut atriplex fol in decoct resolvens
Tournefort avoit quel est le caractere de la blete d'avoir les fleurs couleur d'herbe les semences luisantes,

Herniaria turquette stam. 5.e herniole sem in capsula oblong striata quae calyx floris fuit, a sanandis herniis. distgtr a polygono floribus e fol. in glomerum erumpent
urinam et ejus tartarum ejicit. opt. in colica nephritica
ictero hydrops. decoct. dolores dentium gargar. curat.
extus hernias curat

Paronychia herbe aux panaris stam. 5.e calyx pelvifor. in 5 ptes plerq cuculas secto sem. orbic. in capsula quasi pentagon. quae calyx floris fuit
distgh a polygono flor. [illegible] cucullatis
emolliens vulneraria et astringens

Alchimilla stam. 4.or pie delion calyx infundi bulif. multifid. fruct. in sem. unicum vel multiplex in capsula quae calyx floris fuit recondit. floris luinicae aequales [illegible] junicu sumit calicem pro petalo
astring sguinis profluviis fluori albo haemorragiis
medetr vulneraria ejus folia in decocto

Parietaria 4.or plerq stam. calyx 1dri partito nunc campanif. nunc infund. modo rotato
fol aspera vestim. adhaerent, sem. lucid
sem. ut pl. oblong in capsula recond. qd parietibus nascatr. ad [illegible] distgh. fl. efolior alii erump
fol non urentib. et sem. minus compressis.
aperit emollit resolvit, detergit in is [illegible] et gravedine
optima. pulver et melli commixta [illegible], phthisici asthmatici
convenit; succus in tussi invetr in morbis faucium gargar
inject. in aurium [illegible] fol. [illegible] pro
[illegible] decoct. [illegible] ad obstruct. [illegible]

Persicaria stam. 5.e caly. multif. sem. plan. differt a bistorta radice fibrata. ex ovato acuminat, in capsul. oe calyx flori sub. a similitudine foliorum persicae, flores in spicam. rad fib. detergens astringens fol decoct. in diarrhoea dysenter. et oib. morbis cataneis operit etiam in hydrope ictero et viscerum obstruct. satus in fom. ad humores oedemat. dissipandos et ulcera detergenda

Polygonum venouée flos stam. 5.e caly. infundibul. et 5.e multif. sem. triangul. fl. in folior. alis a persicaria differt 5gonis et radicibus fibratis* πολυ. multum γόνυ genu *quadrigone a bistorta vulnerarium et astring. intus vino alb. pro dysenter. profluviis mulierum haemorrh. sanguinis sputo. folia contusa vulnerib. optim.

Fagopyrum ble noir sarrasin stam. 5.e caly. 5.e partito sem. triangul. in capsul. quae calyx. f. flores in muscariis aut spicis nasci et radicib. fibratis a persicaria semine a bistorta radice φηγος fagus πυρος triticum qd fagineam glandem forma triquetra et colore sordido refert. ejus farina resolvens est decocta cum aq. in crass. subs. habetur optim. habetur optim. ad combustiones internam inflam. secali et tritico substituitur.

Bistorta stam. 5.e caly. multif. sem. plerq. triangul, flores in spicam dispo, radices carnos, quasi tuberos, in se contort. et capillitio sti-pata quaedam species quib. praeter flores et sem. nascunt. tubercula exigua foliolis et radiculis donata astringit in disenteria profluviis mulier. fluor. alvi haemorrag. in gargarismis pro scorbuto, faucium dolorib

a radice bis vel ter intorta

salicornia. fol. decoct. aperiunt urinam et menses movent partum accelerant fœtum et lochia pellunt purgant in hydrope, prosunt in scabie et morbis cutaneis et fomento cineres ad saponem et vitra confic.

Salicornia. caly. carente ex tumissuris extremis folior. stam. nasc. et embryon abeunt in vesiculam unico sem.

S. 3. de cerealib. eisq. affinibus

Triticum froment. fl. per fasciculos in spicam dispos. caly. squam. interdum aristis munito pist. abit in sem. oblong. hinc convexum inde sulcatum farinaceum glumâ quae calyx floris fuit ~~obvolut~~ singuli fasciculi axi dentatae affixi spicas constituunt.

farina resolvit, emollit. tritici cortex seu furfur in enemate emollit leviter detergit in dysenteria &c.

il y a des especes de froment dont les fleurs naissent parmi des écailles terminées par un filet ce qui rend barbu tout l'epi. les graines sont dans ces écailles attachées à un ... on devroit metre en ce genre tous les gramen

Secale segle sem. oblong. tenue fari naceum glumâ ae calyx floris fuit. obvol. tamen tn facile deponit. fl. per fasciculos in spicam, singuli pluribus stami. constant ex calyce angusto. fasciculi axi dentatae affixi spica tritico magis compressa

farina potentius tritico resolvit, panis minus nutrit tritico ... laxat crusta tosta dentes depurat furfur detergit emollit conducit in diarrhœa tussi inveterata cum farina ... molle et vitello ovorum opt. cataplas. resolvit.

Hordeum. per fasci. in spic. plur. stam. sem. oblong. fari. utrinq. acutum ventre tumido glumae quae calyx fuit arcte adhaerenti φερβω nutrio

refrigerat acrimoniam demulcet, detergit resolvit urinas movet; sem. ... fit ptisana cum gramine emolliens aperiens. ex sem. fiunt etiam decoct detergentia cum melle ad injectiones pro vulnerib. et gargarism. ad fauc. in dolores

Oryza ris sem. in panicula nascent. in capsula in aristam abeunte. recondit. crassiusculis ovatis
usus est phthisicorum omniumq macilentium sguinis acrimoniam lenit temperat incrassat, in dysenteria commendatur, decoct. pro potu ordinario. sem aliqd emulsionum basis c[illegible] gelatina

Avena fl. per fasciculos calyx squam pendulos sem oblong tenue farinac. glumâ obvolut. singuli fasciculi ita disponunt in spicam ut dependentes velut parvulas locustas bipedes avena genere videant. ab aveo qd edere aveant pecudes. les fleurs des semences [illegible] resolvit et emollit intus et extus datur in ptisanis refrig in cataplas cum aceto aut vino crasso; interne inspissat sguinem acrimoniam temperat

Milium millet fl. per fasciculos in paniculam laxam disposito singuli flores plurib. stam constant ex calyce plerumq bifolio semo subrot vel ovat glumâ seu capsula obvol. fl. per fasciculos
sem. oryzae habet vires lenit refrigerat anodynum et diureticum egregie conducit in morbis pulmonum et renum ulceribus farina in catapl. resolvit anodiner

Panicum panis additio diversum florum et sem. situ quae in spicam dense congerunt. apparit dn humorum acrimonia cum lacte cochum ut oryza

Gramen chiendent fl. per faradul. dispo pla. stam. ex caly. plera squam. surgentibus sem subrot vel oblong. purum farinaceum caly: seu capsula obvolutum. a gradiendo qd geniculatis ramis serpat. radix [illegible] et apozemat [illegible] in usu venit [illegible] [illegible] [illegible] diureticum frig[illegible]
Les especes portent leurs fleurs et graines en epi en grappe en [illegible]

Arundo canne ou roseau. sola mag nitudine a gramine diversum a gramine distg. [illegible] quodam villoso in [illegible]
radix aperi[illegible] diuretica in [illegible] calidis fere vires habet Kine unde specifica habetur ad lac coagulat puerperar[illegible]
arundo saccharifera in indiis crescit ejus succus sal essential cum pauxillo sulphure mixtus

S. 4 fl. in capitulum squam. collata

Cyperus souchet in squamas alis orit[illegible] qd abit in sem. plera triangul. caules triangul κύπαρος vas ob radicis effigiem
cardiac stomachic et antihister rad. in [illegible] et [illegible]

Scirpus differt a cypero inter stamina intermixtis squamis caule non triangul. a gramine sem. triangul tum capite squam. ex locustis non contextibus. a cypero caule rotun[do]
querit nodum in scirpo pour dire quon cherche a mordre ou il ny a rien a reprendre

S. 5. fl. in eadem planta a fr. sejuncto

Cypperoides stami. ex alis squamar. prodeunt in spicam sed sterili embryones spicas inferiores occupant in vesica reconditi abeunt in sem. plerumque triang. quandoque [illegible] in capsula quae embryonis vesicula fuit maturescentia a cypero distinguitur membrana triangulari ad foliorum commissuram

Typha le glaive des filles godmichi des nones masse. fl. stam. in spicam sed sterilem embryo. inferiorem spicam occupant abeunt in sem flos cum axungia incorporatus combustioni medetur

les embrions deviennent des capsules ligneuses ovales-pointues a une ou deux loges remplies d'une matiere farineuse, ces capsules forment une tete

Sparganium rubon de eau stam. in fl sterili embry in glomerulis a flori separati abeunt in capsulas seu ossicula nunc uni capsulari nunc bicapsulari nucleo farinaceo plerumque feta in capitulum collecta thalamoque affix. σπαργάνων fasciolis quod foliis ejus latis et vitilium modo lentis pro fasciis nutrices utebantur

Mays blé de turquie embryones in capitulum desinen. a flori sejuncti in spicam foliis obvolutam vaginae instar tubalatis sem. subrot. parte angulata paleae axi affix.
intus aperit conducit in colica nephretica extus farina resolvit ut caetera frumenta nutrit ut triticum sed gravius est et stomachi validioris tantum evenit

Lacryma job embry. a flori sejuncti sem membr. obvol. in testa recondita ut plur. turbinata a sem. forma quae lacrymas repraesentat
sem aperit detergit calculos renum et vesicae convenit

Ricinus palme de christ, pignon d'inde embry. a fl. sejuncti fr. trigon purg. ex trib. capsul. composit axi affix. sem. cortice duriore obducto. ab insecto ejusdem nominis ad semen accedens. cathi liquos fructu aculeat. racematim collect. vehementer purgat serum. ex seminib. extrahitur oleum ad detergenda antiqua ulcera

S. 6.a Flores et fructus sui dives individ

de herbis fl. apetal. quar. aliae in eodem genere floribus aliae vero fructib. plerumque donantur

Equisetum prele queue de cheval fl. columnus infixi facie stam. brevissim. apice fungi formi oragoni spicato et sterili. specieb. quae flori carent grana nigra aspera et parcta. folia internodiis invicem commissis ut unum in alterum inferat tuborum modo, a folior. prim.
ἵππος equus οὐρά cauda
astringens et vulnerarium fol in decoct haemopht haemorroid et oit haemopht, succus ulcerib. tum ptobatis dysenter ad urinas ciendas in decoct. ad ulcera antiq. gonhorrgas sistit

Cynocrambe caly. bipartit. fr. plur. sphaericum, sub ejus cuticula recondit sem subrot. κυων canis κραμβη brassica

Spinacia epinars sem turbinat in aliquib. turbin. vel cornuta aut angulata. quasi olus spinosum.
laxat emollit in decoct aut cataplas. fol in decoct vel fror. succus, vel aq. distill. pulmonum pectoris et faucium asperitates lenit in inflam. intestin conducit viscerum et ventriculi ardorem sedat

Mercurialis fr. ex duab. capsul. ? sem. subrot. fl. fert. et ster. fol. emoll. capsula asper que crescit in silvis montibus venenata, ... aperit laxan emollit in enemat. phi. extus in catapl. emollit, mel merciale in puerperii et mensium suppressione. syr. simplex ad laxand. urinas et menstrua pellendo. syr. comp. ad laxand. stomach. confortand. ... purificand.

Urtica ortie embry. abeunt in capsul. ... bivalvem semine fetam in globulos ... vel abeunt in volsellam pinnatae que comprehendit semen ab urendo lanugine noxia.
fol. astringunt, vulner. in haemorrag. sem. aperit in calculis renum, ictero, ischuria pro ptisan ... specaro condit expectorationem ... pleuritid. fol. ... in arthritid. rheumati ... infusum ... in decocto febr. malig. morbillis ...

nurg. **Cannabis** chanvre embry. abeunt in capsulam semine fetam. subrot. fl. fert. et ster.
sem. fol. utrinq. secundum caulem ... aperit. ... folia cum sem. trita pro catapl. maxime resolvunt sem. in lacte ... decoct. aut vino albo infus ictero mensib. et urinis prod. ... oleum ... resolvit cum cera ...

Cannabina capsul. membranacea oblong. forme trigon. sem. oblong ad cannabin accedunt fol. bina unio eleudente. fl. in spi. ... aperientia ... vomitum excitant

Lupulus houblon fr. squam. subrot. ex plur. foliis ... axi affix. in quor. alis adsunt sem. calyptra obvoluta
... aperi. rad. in decocto aperi. turiones calide per noctem vino albo infus et sero lactis cum tinctura ℥ opt. ad obstr. viscerum affect. hypocondri et melanchol. fol. contusa ... contusione et tumoribus

Ceratoides flor. steril. in aliis ... fertilib. in eadem planta fr. ... bicapsul. cornua abeuntes κέρας cornu.

de herbis et suffr. qui flore carent et semine donantur

Filix fragare S. 1.a fructus foliis innascentes. folia ex aliis foliis componuntur utrinque adhaerescent. in pinnulas seu foliola ad nervum fermè plerumque sectis. frutices quaedam [illegible].

filicis maris fru. foliis innascuntur binis plerumque ordine pinnulis affix. clavi ope altera parte vehementi. detracta vel corrugata membrana convexa quae ferri equini formam habet se se oculis objicit numerosa congeries vesicularum fermè ovatar. anulo elastico donato cujus contractione rumpuntur seminaque fundunt minutissima.

filicis feminae fructus. seu vesiculae ovatae occurrunt in sinubus quibusdam namque autumno pinularum margo plerumque producitur incurvatur et explicatur

aperit in viscerum obstructionib urinas movet conducit in hydrope aq. distillata contra lumbricos fol. decoct affectib pectoris optim. et adianto possunt substitui etiam pro syrupo. sal filicis [illegible]

Lonchitis foliis filicis aemulis a quib tamen differt pinnulis ad ortum auritis a λογχη. lancea cujus figuram folii referunt

fol siccata in aceto epota lienis et hepatis obstructiones levat extus applicat ulcerum inflam. impedit.

Trichomanes politric folia ex foliolis componuntur plerumque subrot. ornat costae utrinque quasi per conjugationes nascuntur. fructus foliis nascuntur filicis more

unum ex 6 capillarib iisdem pollet viribus aperit. pector in decocto. infusio conducit in morbis lienis et mensibus obstructis

Polypodium; nequaquam ramosum cujus folia ad nervum pene in ptes angustas et longas secari solent. species plura. Fructus foliis innascitur capsulae sed. membrana sphaeri. in acervulos congestae anulo carentes. filtrar. chaulderai rami pendunt sem pendunt nudent. πολὺ multum πούς pes ob radicum formam
atram bilem potenter purgat radix in oib obstructivib asthmate melanchol scorbut & ictero hydropi etiam praestat capillaribus substitui potest sed nimis praestat

bechiq **Ruta muraria** saumpevie folia ad rutam hortensem quodam modo accedunt fr. fol. innascitur
mucum pulmonum incidit, aperit incredibilem habet vim ad morbos sanandos pectoris asthma curat urinam movet calculum expellit in phtysi et pleurit commendatur in ptisanis et infusione vomicam curat

pector **filicula** fol. ad filicem accedens cujus partes sunt minutissimae

pector **Adiantum** capillaire. plura species dignoscitur a, non, διαίνω madefacio, quia folia in aqua immersa non madefiunt
bechicum stomachicum, aperiens, amicum est pulmoni quor. obstruc et vitia via raserat mucum solvit urinas et menses movet, intus decoct aut in syr. form
onpourrait la distinguer par la disposition de son fruit qui vient sous les plis des extremités des feuilles qui apres setre alongees se repliant sur elles meme et couvrent plusieurs capsules qui sont collees contre ces memes plis,
les divisions des feuilles sont alternes le long de la principale cote et les feuilles sont portees sur les bords

ceterac **Asplenium** ceterac, margine pulchre sinuato a caeteris differt, folia fere ad costam incisa
Scolopendrium apricum ut adiantum in partes rotund. et quasi sinuat

Lingua cervina scolopendre distinguit foliis integris non crenati[s] folia linguae cervi figuram aemulantia nunc simplicia nunc laciniata interdum ramosa seu costae affixa
incidit aperit decoct. in obstruct. hepatis lienis et viscerum, in calculo, vulneraria detergens et resolvens extus applicata

Hemionitis folia ad basim late aurita sive simplicia sive composita. quo differt a ling. cervi
astringens vulnerari[a] pectorali da morbis splenis sputo sanguineo cum adianto decocta ex foliis sicc[is] etiam pulvis conficitur vulneribus applicanda

S. 2.a Semina foliis non nascunt sed racematim aut spicatim aut in thec[is]

Osmunda fructus in uvam colligunt pediculo sunt capsulae sphaericae quae fibrarum contractione rumpuntur semen fundunt minutis.
aperit, detergit, incidit vulneraria est in hydrope conducit colica nephritica vermibus pluribus vulneribus chlorosi calculo, morbis lienis herniis sanguinem grumosum resolvit specifica habetur in rachitide

Ophioglossum langue de serpent fr: lingulato in plures cellulas bino ordine per longitudinem divi. quib. sponte dirruptis utrinque denticulatus fit seminis loco ei tenuis quasi pollen in linguae insectionibus quib. permaneat. excidit dehiscentibus
ὄφις serpens γλῶσσα lingua
vulnerarium [illegible] resolvens est infunditur in oleo olivarum et fit [illegible] vulneribus, [illegible], herniis puerorum optimum; folia recentia vulneribus applicata mirifice curant, intus etiam vulnerarium [illegible]

Lichen. fructu quodammodo pelvisformi polline seu semine tenuissimo facto. a sanandis lichenibus seu impetiginibus
est muscus arborum veterum. bechicum optim. in asthmate et tussi inveter. astringens etiam ut ceteri musci. vinum in quo infunditur est somnifer

Acrosticum capillaris frutici. facie digit. foliis oblongis [ramentis] coriaceis et cornea ... ramulis

S.ᵃ de herbis terrestribus absque flore et f

Muscus mousse. foliis formæ singularis fructus alii calyptra obvolvuntur alii nudi sunt sub calyptra cucullata latet fr. plerumque quadrangul. pul visculo fœtus tenuissimo in aliis foliorum alarum adsunt capsulae reniformes quae sponte rumpuntur seminaque fundunt tenuissima
ões fere eadem virtute. aperiunt astringunt bechia et vulner. hinc pectori summa remedia in scorbuto gengivas deprimunt diarrhœa condaunt calculum solvant urinam movent.

Fungus champignon est capitatum pediculo insidet capitulum parte convexa planum. raro striatum aut fistulosum lamellis aut fistulis munitum
variæ sunt species alii venenosi quales in arboribus innasc alii inflatorii et narcotici; perniciosi qui in terra diu manentes coloris sunt nigricantis; cærulei aut rubei qui muscum redolent, in parte super albi infer. rubescendi compacti medullosi fragiles, odoris et saporis grati comedi possunt

Fungoides ad fungum accedens cavum pyxidis aut infundibuli figura. a fungo differt capitulo superne concavo inferne ramoso aut aut villoso

Boletus morille ad fungum accedens sed totus scrobiculis excavatus vel fenestratus

166 **Agaricus** arborum truncis plerumque innascens ad fungum accedens subtus non lamellatus sed porosus purgans est acre, hydragogum corrigitur zinzibere vel sale gemmae

Lycoperdon vesse de loup ad fungum accedens durae primum et carnosae rumpuntur postea et pulverem tenuissimum effundunt. λύκος lupus πέρδω pedo, crepitum edo quasi lupi crepitum venenum est si hauriatur sed pulvis qui in cavitate opt astringens cum ovi albumine ad haemorrhagias sedan

Coralloides est fungosum ad corallii formam quodam modo accedens.
le corps de cette plante est decoupé en branches ou en petits bran et lanieres ces plantes ressemblent a un arbrisseau depouillé de feuill

Tubera trufes nota pendet ab eorum figura venerem cient, dispepta sunt humores crassos et melancholicos generant calculis contrarii
ce n'est qu'une masse charnue cachee dans la terre et venee dans son interieur

S. 2e de herbis marinis aut fluviatil quar. flo. et semina ignorantur

Fucus in aquis nascens

Alga foliis gramineis vel in longissima capillamenta ductis

Acetabulum foliis cavis quasi pelvis in conum inversum fere desinentib.

Corallina in aquis tenuissime divisum fol. cetans articulatione quadam veluti juncta vel in ramos capillaceos divisis
vermifugum est in pulvere subtili cum conserva absinthii aut flor. aurantior. absorbens

Corallum fere lapideum ramosum nullis foraminibus conspicuis pervium κόρη puella ἅλς mare quasi filia maris
crescit in fundo maris absorbet acida astringit in dysenteria alvi fluxu

Madrepora fere lapideum coralli aemulum in ramulis plerumque divisum foraminib. pervium interdum stelliformibus, quod differt a corallo

Cl. 17[a]

168 Lithophylon ad corallum accedens figura substantiâ veluti corneâ et lapidem inter ac lignum medium cui sicut plerumque adhaerescit cortex vel fibris contextus vel tactui aemulus λίθος lapis φυτον planta

Tubularia orgue de mer fere lapideum ex pluribus tubulis constans organi musici aemulum

Spongia eponge molle foraminibus per vium attingens absorbens escarotica, usta pulverem dat ad dentes mundandos

Eschara fere lapideum telam textum suâ referens

Alcyonium on donne ce nom a certaines plantes qui viennent au fond de la mer dont on ne peut determiner le caract

Conferva est pl. cujus fl. et fr. vulgo desiderant aq. reddit inquinat, labiaque desiccat digiti foliis valde intricatis

Lymno corallina est fluviatilis cujus structura ad corallinam accedit

Lenticula <u>Lentille deau</u> aquis innatans facile
dignoscitur facie externa lentem referente radices capillari
oblonga aq suspensa obvolvuntur
humectat refrigerat aperit in hæmorroïd cum myrrha ad
dolorem leniendum

Classis Ima de Arbor.

S. 1a fl. apetalo cum fr. juncto

Fraxinus frene flores racematim stamina germino pleru apice donanti nihil pyramidatum fr. linguiferum planum mbranaceum uno semine ejusdem pene formæ. occurrit et fraxini species flore petalode æ quoniam sterilis separanda non videtur flores ante folia flores decidui sem. autumno maturescunt foliis per conjugationes cortæ
species fraxini mannam dat in calabria. cortex optim febrif censetur cortex salia acido acri aperit in chlorosi adhibetur pro sudorifico. corticis cineres caustice sunt; sem. aperit. sal fixum fraxini urinas movet. aq. ex ligno stillan dum comburitur opt in surditate gossipio imbuto auri immisso

Siliqua carrouge. stam. e divisuris calycis nascentib fr. seu siliq plan. velut carnos sem plani et subrotun. in caveas siliquæ
fructus immat. sapo ingrat. astringit. maturus edulus dulcis Carat pulpa e siliqua aperit pectorali et conducit in diarrhea in decocto tussi optima, hujus sublin dulci et viscosa ardorem ventriculi et urinarum compesat

S2a fl. apetalo in eadem planta a fructu separato

Buxus bouis ou buis calyx 3 vel 4 fol quæ coronam includunt unde stamina fl. pleru tetragon e cujus fundo stam. plu4 fr. ollæ inversæ quodam modo æmul. in tres ptes apice dehiscentes in tria locula. div. sem. in capsulæ vi elastica manita. fol semper virentia parva. grave olet lign durum luteum diaphoretic sudorif gayaco substitui potest urinas mediocriter vocat, sudores movet oleum ex ligno fetidum virosum; cum pulvere glycirhiza aut saccharo ad gutt 12 pro epilepsia vaporib dentium doloribus impetiginibus

Cl. 18.ª

172 Empetrum fl. bacis similes. 2[b] vel 3.[b] sem. osseis vel cartilagineis

§. 3ª

De arboribus et frutic. quorum alii in eodem genere floribus alii fructibus plerumque donantur

Terebinthus flores in individuo masculino habent 4 stam. apicibus donat. 4 [illegible]
flores racematim
abeunt in tertam unicapsul. vel bicaps. seu oblong.
folia per conjugationes costae cui summa impares
fol. atrovirentia Colloris sublucidi odoris ingrati
cortex et folia valde astringunt urinam movent et semen provocant

[illegible] Lentiscus a terebintho diversum foliis per conjugationes quidem sed nullo plerumque impari claudente
astringens decoctio ligni vel fol. in diarrhaea dysenteria alvi fluxu maxime convenit in scorbuto ad gingivas [illegible] et confirmandas ex ea stillat mastiche

Rhamnoides stam. calyci bifolio embryonem in aliis flo. carent. fr. seu bacca unico semine foetus subest

Casia stam. caly. plerumque trifido fr. in aliis

sunt baccæ ut pl. sphericæ ossiculo fœtæ
in quo nucleus reconditus ejusdem figuræ

Ephedra. embryons in eadem planta
vel aliis ejusdem generis fr. molles seu bacca
capsula ~~[illegible]~~ sem. ut pl. oblong. Ἐπὶ supra
ἕδρα sedes quasi planta rebus vicinis insidens

Des arbres et arbrisseaux a chatons

on apelle chatons les fleurs de certains arbres disposées sur
une queüe semblable a la queüe d'un chat. ces chatons sont
composés de fleurs a étamines dans certains arbres et de
fleurs a feuilles dans quelques autres on en trouve meme
quelques uns qui ne sont qu'un amas de plusieurs sommets
on ne connoit aucun chaton qui porte du fruit mais les uns
naissent sur les pieds qui portent le fruit les autres sur des
pieds differents

Classis 19.a flo amentaceo

S. 1 a de flore amentaceo in ead. arbor. a fructu osseo separato

c **Nux** noyer flore amentaceo plur. foli. axi squam. affix quibus singulis adsunt denso agmine apices. embry. a fl. separati abeunt in testam osseam cortice molli obvolut. in duas cavitas similem nucleo plerumq. quadripartito cum dissepimento ligneo, a nocendo a plinio juglandium umbra gravis et noxia capiti odore gravi
indigesta stomacho nocet, tussim excitat, folia flore seu inde sudorifica aq. triam nucum distillata, sudorifica aperiens, cardiaca, stomachica, antihisterica in febrib. malign. variolis vaporib. hister. colica ventosa et hydrop. oleum resolvens

Corylus noisetiers teste subrotunda ossea involucro calloso fimbriato obducta et nucleo puta καρύα nux quasi nucula

Carpinus charme fr. osseum inter foliola spicae quae longe amplior et elegantior fit fr. plerumq. umbilicatum compressum striatum nucleo factum e rotundo acuminatum.

ses chatons sont a plusieurs feuilles rangees en ecailles le long du poinçon le dessous de ces feuilles est chargé de quelques etamines mais ces chatons ne laissent aucun fruit apres eux
les fruits commencent par un embrion qui se trouvent au dessous de chacune des feuilles qui composent l'epi. cet epi. devient ensuite un fetron et chaque embrion devient un fruit garni dune couronne

S. 2a fl. pleruq separat a fruct cujus involucrum coriaceum

Quercus chêne glans capsulâ munita nucleo in duas ptes fissili folia sinuosa profunde
astringens ... [illegible] alvum ... decoct. in vino ... fluxus profluvia mulierum evacuationes nimias dysenteriam haemophthisin: fluorem album sistunt. cortex glandis seu ... capsula dicta ...

Ilex chene vert. stam. e calyce infundibulif. tenui capillamto affixo. glandes a floribus separatae capsula munitae nucleo foeta in duas ptes fissili foliae denticulata quidem sed longe minus sinuosa quam quercus
ilex cocci glandifera dat kermes seu scarlatum graine d'ecarlate ex insectorum punctione foliis: cordiaca ... confectio alkermes in syncope cordis palpitatione deliqui dato kermes praegnantib cum timetur abortus.

Suber liège a quercu et ilice differt cortice crasso fungoso levi omnibus noto
cortex astringit et detergit, pulverat. et vino infus. sanguinem sistit in cineres redactus et cum oleo ovor. aut amygdal. dulcium ... in unguent. linim. ad haemorroid. ... ab his ... in vasis ... nigr.

Fagus hetre fl. glomerato a calyce campaniform. a flore separat.
fr. callosum acuminatum quadrifarium apice folioliis tegatur dehiscentem binis pleruq semi trigonis
fructus et sem. ad lubulum et mucum renum propellendum

Castanea chateigner. calyce 5 folio capitulo munito seu affixis staminib. fr. seu echini a fl. separat in eadem arbore subrot. quadrifaria pleruq dehiscentes castaneis fetu nucleum continentibus
salsum acre fructus, t[illegible] nutrit, ingrassat sed astringit et flatus excitat pellicula quae sub cortice reperitur cum pari quantitat. ... fluor. alb. sistit, castaneae tritae cum farina hordeacea et aceto, mammar. schirros et lac grum. ... caturg.

S. 3.a fl. in ead. arb. separ. atr. squa[m]

Abies sapin embry. inter folia spicae sem foliatum reconditum sub squam. quae axi affixa constit. fructum is autem est spica quae crassior evasit folia singularia non bina ut in pinu abietis apices in duo loculamenta divisa transversa dehiscunt pulverem fundunt minutissimum saepe lucratum
folia poma decocta, siccant astringunt. extractum absorbet, detergit, antiscorbuticum est
ex picea sapin male stillat 1° resina communis 2° pix liquida 3° pix sicca poix de bourgogne 4° colop[honia]

Pinus fr. inter cujus squam. (subrot. aut pyramid) duob. scro bibus excavatas occurrunt duo ossicula saepe alata nucleo fete oblongo folia bina simul ex eadem vagina prodeuntia
cortex desiccat, astringit trita cum lithargiro et manna, ulceribus externis, combustioni confert. ejus fumus partum maturat lochiis et uteri suffocatio[ni] conducit; fol. in aq. pura aut mellita cocta refrige[rat] ex pin stillat maxime astringit. nuces anodinae refrigerant

surg **Larix** meleze inter folia fr. nascit[ur] sem. foliatum reconditum sub squam, quae axi affixae fructum constituunt folia confertim plura quam bina ab eodem exortu producentia
fol et fructus astringunt. ejus trunco adnascit[ur] agaricus purgans hydragogum ex moris stillat manna quae optime purgat cortex incisus dat resinam liquidam

Thuya arbre de vie embry. squamosi abeunt in fr. oblong. inter quam squam. occurrunt sem. veluti marginata. folia squamosa
crescit in canada, aperit calefacit summum emmenago
fol. trita vino albo infus. egregie menses movent ex iis fit pediluvium ad menstrua [illegible] ejus oleum in podagra
lignum diaphoreticum

Cupressus cipres flo. plur. folioli seu squam. in eam aliis adsunt apices pulverem tenuissimum effundentes. fruc. subrot. in plures veluti clavos dehisc. sem. plana angul.
nuces maxime astringunt. in vino infus febrifug
fol. minutim incisa et quae praeter quam articulate

Alnus aune caly. quadrifraulito glomerato axi affix. fr. squam. sem. [illegible] cupresso folia alni foliis [illegible] similia
dessicativum est cortex magis astringit, fol recentia inflamationib medentur extus applicata

Betula bouleau embryo squam. fr. cylindraceum sub cujus squamis axi affixis occurrunt semina alata
cortex folia et aq. terebratione stillans ex hac arbore, in usu sunt, folia aperiunt detergunt cosmetica sunt.

S. 4[a] flore in eadem arbor. ab [illegible] [illegible] dont les fruits sont des bayes

Cedrus cedre fr. bacca 3bus ossiculis huyent angul. sem. oblong. folia cupresso aemula.
fructus strangurix confert menses et urinas movet

Sabina savinier ad cedrum accedit differt foliis ad tamariscum accedentib
aperitiva, emenago. [illegible] dessiccat antiqua ul[illegible] urinas et mens[illegible]
movet et fetum [illegible] cortex et lignum [illegible]

Juniperus genevrier fr. seu baccæ 3 ossiculis turgent angul. sem. oblong folia simplicia et plana
Lignum sudorif, sanguinem purificat; balneum ex decocto in podagricis conducit; aq. distill ex baccis sudorif cardiac, antihister.

Taxus if bacca cava seu campanulif. succi plena et sem. fetu. quoq fr. glandiformis cupula donati semen complectunt. το ξυ venena baccæ rubræ et lignum venoso prodita dysenteriam et febrim creant; folia bobus comesta occidunt ejus antidotum idem ac cicutæ

Morus meurier calyx. quadrifolii steril. fr. compositum e glomerulis squamarum succulent. quæ semen complectunt subest μαυρος, nigra ante maturitatem astringentes et detersiva. succus in gargarismate ulceribus faucium. maturi fazant refrigerant, sitim sedant. expectorationem excitant ex moris nigris fiunt syrupi demulcentes, fol emollient

S. 6[a] fl. in ead. arb. a fr. sicco separ fructus plures unit

Platanus fl. amentaceo glomerato. tener fr. abit in majorem globum sem. foetum cum intermixta lanugine. fol amplissim
tenera hujus arboris folia in inflam. oculor. et in tumoribus cortex in vino cocta in odontalgia conf. os abluendo

S. 6.^a alii florib. alii fructib. dioi

Salix embry. iis quae floribus carent. fr. seu captul. conif.or. bifariadehisc. sem. pappis instruct. q̃d celeriter crescat ut salire videat. ##
cortex fol. et sem. refrig. astring. in sputo sanguineo clysmat. in dysenteria; extus pro semi. balneis, et pediluviis, in vigiliis et febr. addunt ab aestu sanguini nimio. cortex idem praestat veraces extrahit
flor. pro semplastris despice

Populus peuplier fr. spicati plur. foliolis c̃pos̃iti sub quib. latet campana caedam embryonem c̃plectens abit in siliq. mbran. bifar dehisc. sem. pappis instruct. p̃p̃ruid. species quae differt a salice
fol. fl. et resina astring. acini fructus in aceto epoti epilepsiae conducunt; fol. contusa ischiatidi. unguent. in haemorroid. tincturam fl. in spir. vin. diarrh. invet. ulcerib. internis

le peuplier est sterile et fertile ou male et femelle
le male ne porte que des chatons qui sont a plusieurs feuilles chargees de quelques sommets remplis de poussiere.
les jeunes fruits sont a plusieurs feuilles chacune des quelles couvre une cloche qui renferme un embrion de graine qui est comme le batant de la cloche, cet embrion devient ensuite une capsule membraneuse oblongue on le distingue du saule par la structure des chaton.

le saule est divise en male et femelle le male ne porte que des chatons qui sont des epis composes de quelques feuilles de la base des quels naissent des etamines
le femelle ne porte que des fruits qui commencent par des epis composes de quelques feuilles de chaque embrion devient une capsule membraneuse oblongue

Classis 20ª de flori monop.

S. 1ª.

De arb. fl. monopetal. cujus pistill abit in fr. moll sem. callosis fœtum.

purg. **Rhamnus** bourge epine nerprun fl. quadripartit infundibul. bacc. moll. succi plen. q.or pleruq sem. fœt. callos. hinc gibb. inde plan. ad basi fol. 2 baccæ purgant bilem pituitam serum in cachexia podagra arthritide ischiat optime in chlorosi cum tinctura martis, ex iis fit syr. domesticus purgans in hydrope abdomin tumefact. fol cathes arcajed

purg. **Thymelæa** garou bois genti fl. infundib. q. partit e fundo surgit pist. fr. ovat. moll non sicc, sem. oblong, pellicula cartilaginos Baccæ et fol vehementer purgant; corriguntur cremor tartari, aut sale aliquo fixo et lixiviali; macerat in ovi hydropi rheumatismo, vapori. histar et febr. quart

2 **Alaternus** fl. infund. 5 partit quasi stellifor. fr. seu bacc. sem. pleruq ternis hinc gibb. inde angul. quasi fol: alterno ordine quo dignoscitur a phillyrea

Phillyrea filaria fl. campanul. q partit fr. fere glob. sem fere glob. fol. bini ex adverso nascent fol astring. in decoct; masticata aut decocta ulceribus oris ablaendo

Ligustrum troëne fl. infundib. 4 partit fr. fere glob. moll. succi plen. sem. utpl. quaternis hinc gibb. inde plan, flor alb. racematim dispos baccæ nigr astringens fol et flo. aut succus præmorr. sistit gargaris in faucium doloribus; detergit ulcerat ustiones lenit.

Laurus laurier fl. pelvifor. multif.
fr. plerq ovat. seu bacc. cujus cortici subest
testa unicaps. sem. unicum ejusdem pene fig.ae
fol et baccae aperiunt discutiunt cephalicum et
lignum vires guajaci ferme habet fol intus instar
thé, extra fovent paralys. baccae exsiccatae et tritae
in musto aut melle in tussi inveter. puerperiis magni usus
conterunt et his oleum exprimunt in nervorum affectib.

Bechi **Jasminum** infundib. multif. fr.
moll seu bacc. 1o vel alteru sem.
bechicum est in tussi anhelitu externe emollit resolvit
oleum jasmini fit ex fl in oleo amygdal dulcium
infusis et expressis opt dolor uteri frigidis et nervorum

Arbutus arbousier fl. campanif. glob.
fr. subrot. in 5e locul. div. sem. placentae
affix
fructus inebriat

S. 2a pist. abit infra sem. ossei foetum

Styrax storax fl. veluti infundibul. multif
calyx infundibul dentat
fr. subrot carnos. 1o vel alteru sem, in quo
nucleus continetur
ejus gummi nervos tendines emollit, schirrhos exter
resolvit, interne vero cerebrum roborat, spiritus
excitat, asthmati et tussi inveteratae conducit

Olea olivier. fl. velut infund. plerq quinquefid
fr. ovat. moll. succi plen, ossiculo oblong in quo
nucleus continetur ejusdem formae
fol astringentes et vulneraria sunt horum succus
vel decoct. sanguinem et profluvia muliebria sistit
fructus viridis astringit sale et aq. conditus cibus appetit.
excitans oleum emolliens laxans anodin et resolvens

raisin dours
Uva ursi fl. campan. glob. fr. moll seu bacc sphaeric. 5e ossicul. hinc gibb. ind plan. rad. fol et fructus astringunt

Aquifolium houx pleu nonoppelet 4or quekto volvh fr. moll. seu bacc. ossicul flet. hin gibb inde plan. radix et cortex radicis emollit, resolvit bacca deglutr colicum dolorem sanare dicuntr. gluten ex ea emollit resolvit cum resinae et cerae pari quantitate. on en fait la glue pour la pipee

Guaiacanna fl. campanif. fr moll. subrot. multicapsul. tantundum et vix dum alteri possint qd ad guajaci vires accedere dr fructus ut mespilli astringunt. lignum ad morbum venereum loco guajaci

S. 3.a pist. abit. in fr. membranum

Ulmus orme. fl. campani. fr. foliac plan veluti cordifor. in medio capsula pyriformis membrana uno semine feta ejusd. figurae. folia pediculo muniunt ex una parte quam ex altera. semina cadunt ante fo. radix cortex et folia astringunt et humore balsamic viscoso vulnera consolidant in oib sguinis profluvii hic humor in vesicis folii adhaerentib colligitr et preciosus ut herniis et ulceribus consolidandis in luxationibus ancurismo

S. 4^a pist. ab. infr. multicapsul.

Lilac fl. infund. plerumq. q^in^que fid. fr. compressum linguifor. in duas partes hians septo medio in duas locul. div. sem. compress. marginati;
astringens abstergens et incidens maculis lentibus faciei pruritui et impetigini convenit.

Erica (bruyere). fl. campanif. fr. ut plurimum subrot. 4^ir fissura hians, in q^or locul. plerumq. distinct. sem. ut pl. exig.
aq. still. mane sumpta colico dolori multum prodest fl. in decoct. pro balneo aut oleum ex ipsis extractum vel balneum folior et flor. vapor arthritidis dolores mitigat.

Vitex (agnus castus) fl. quasi bilabiat. posterius tubul. fr. fere sphaeric. in q^or locul. div. sem. oblong.
aperit antihistericum et fol et fl. macerat menses movet, viscerum obstructiones levat, ulcera interna maxime virgae, calus resolvit libidinis et veneris aestum reprimere valet. folia cannabis simul cum flor.

Chamaerododendros fl. tubul. quasi infund. fr. oblong in 5^e locul. div. in 5^e capsul. dehisc. axi affixa semi. minutiss.
χαμαι humi ροδοδενδρος nerion

S. 5^a fr. siliquosum

Nerion laurier rose fl. infundib. 5^{fid} multif. fr. teret. cylindrace ex duab. veluti siliq. conniv. sem. pappis instruct. ad basim pedicul fol. 2^a vesiculae
vires habet apocini fol et flores venenum mortale animalib. hujus antidotum sunt acida, fol sicca violent. sternutatorium hujus decoctum pro balneo scabiem sanat.

Acacia cassie flos infundib. stam. numerosis in capitul. spheric. collect. fr. siliq. in plures veluti foveas div. sem. subrot. flores unit fascicul subrot. formam refrigerat et roborat stomachum acido stringendo.

Mimosa sensitive infundib. numerosis stam. in capitul. siliq. vel simpl. et bivalvem sem oblong. plur. vel compon. ex plur. articulis articulation transversa juncti singulae semine tayunt subrotundo folia si tangantur motu quodam subitaneo et ad tactum donant a minas cujus motus imitari videtur. folia per conjugationes secundum costam ordin

S 6.a calyx abit in baccam

purg. **Sambucus** sureau fl. rotatus multifis. cujus medium a mucrone calycis typum a clavo perforatus. bacca succi plen. sem. oblong. foliis conjugatis et fetidis. flores in umbell dispos. caules medull. plen sambu. humili seu ebulus differt stipulis quae ad basim folior utriusq. radix serum purgat cortex baccae et sem idem praestant in hydrope. succus fol. flos bacca calus discutiunt resolvunt in arthritide rheumatismo erysipelate balneo fovent aut cataplas

purg. **Opulus** obier, fl. multiplici alius ad muscarii circumferentiam rotatus q. fidus perfosus in grana succo crasso et amaro adstringunt baccae cortex purgant

medium a pistillo calyci istentis. alius vero pelviformis ē[?] a cacumine calycis in medio clitau[?] perforsus. fr. seu bacc. moll. sem. cordifor. cpresso flor in umbell dispos

viburnum viorne fl. rotato multif 5 partit medium perfodit a cacumine calycis fr. moll seu bacc, succi plen. sem. osseo cpress, striato. vulnerarium et astringens detergens fol in gargaris ad dentes gingivas roborandas fancium et uvulae dolores mitigandos fructu ante maturitat collectus siccatus et pulveris in vino infus ad alvi fluxum.

Tinus laurier tin fl. rotato multif 5 part medium perfod. a cacumin caly, fr. olivaefor. umbilic sem pleruq pyriform, membrana cartilaginea donatu[?] fructus insuper suprema acutus et corona ornatus

vitis idaea. airelle ou mirtille campan glob. fr. moll. seu bacc. umbilic, succi plen. sem pleruq exiguis
baccae sicc et pulver astringunt in diarrhaea et disenteria. vel succus expressus.

Caprifolium chevrefeuille tubul in duo labia dehisc, superius multif. inferiu pleruq linguifor. fr. moll. seu bacc. sem. cpresso subrot.
vulnera detergit in decocto aq. flor distill cum aq. naphae mulieres partu laborantes sublevat.

Periclymenum fl. in orbem posito tubae quodam modo aemulus multif. quadifidat a capitulo 5 que calyci insidet abit in fr. moll seu bacc. sem. fere cpress. et subrot

Chamaecerasus petit cerisier calyci gemino eidem pedicalo innate. tubul. in duo labi. dehisc sup. majus multif. infer plerumque linguiform. calyx abit in baccas gemellas molles sem cpresso subrot

Xylosteon flore ~~caly~~. gemino eidem pedicul tubul multif. calyx abit in baccas gemellas molles sem. cpresso et subrot. ξυλον lignum οστεον osseum. parum differt a chamaecerasso

Elaeagnus olivier de Boheme fl. tubul. in 4 or partes plerumque secto fr. ut pl. olivae fr. ossiculo fere in quo nucleus recondit ejusdem formae ἐλαια olea ἄγνος vitex quasi fol. viticis et oleae fructu

Cl. 20.[a]

S. 7.[a] flore a fructu separato

viscum qui fl. pelviform. plur. 4petalo verruc. composito tipicum apicibus pulverem effundentib. embryo a fl. separ. fr. 4or foliola stipare solet, bacca subrot. glutino plena sem. compresso et cordiform.

viscum quercinum olim preferebatur aperit epiralicum est lignum et baccae in epilepsia et morbis cerebri apoplexia paralysi lethargo convulsion in vino albo infus. febres 4o. sanare [illegible] ex baccis fit glutem molliens et resolvens extus.

Classis 21a fl. rosaceo

S. 1a pist. ab. inf. unicapsularem

Cotinus fustet inter regiones ad maturitatem non pervenit, immascitur autem flos racematim ramulis in capill. nitr. villosa desinentib.
in artibus ad coria emolliendu lignum inservit etiam ad colorem flavum pannis imprimendum
la fleur a 5 cinq feuilles disposée en rond d'ou la reinure entre le pistil et le calice le pistille devient une semence plate presque ronde

Toxicodendron fr. subrot. sicc. plerumq. striat. herbe aux gemis
το τοξον venenum Δενδρον arbor

Rhus sumac capsul. subrot. quasi compr. plan. membranac.
flores quasi racematim nascunt. ... secundum costam unico claudente
fructus refrigerat et astringit extractum fructus omnes alvi fluxus potenter sistit

Tilia tilleau vel tilleul bacca ligrosa pentagona unicapsul sem oblong
discutit excitat cephalicus antiepilepticus in tapis
aq. stillat flor. contra epilepsiam, apoplexiam, paralysiam vertiginem bacca astringunt in hæmorragiis et alvi fluxus
flos et cortex aperiunt nefras menses movent

erethi **hippocastanum** marronier d'inde fr. multif. dehisc unicapsul sem castanearum æmulis
fructus pulverat et naso haustus sternutat ad dolorem capitis la migraine

S. 2a pist. in bacc. vel singul. vel multip.

Celtis micocoulier stam. brevis. plerumq. fr. seu bacc. unico semi ossiculo subrot.
cortex media præsertim radicis recens vomitum excitat sicca vero alvum purgat vino albo infusa conducit in hydrope et in unguento pro scabie aceto macerata.

Cl. 21.ª 179

urg frangula aulne noir bourgene. petal. inter divisuras calycis monophilli fr. seu bacc. moll. 2 ba sem. plan. subrot.

hedera lierre pet. 6 bacc. fere glob. sem 4.° hinc gibb. inde plan. folia acuta viridia non decidua
vulnerarium et detersivum. fol in vino ulceri b detergend baccae vehementer purgant gummi ex hac arbore stillans in lixiviis ulcera detergit et exsiccat tumores resolvit

vitis vigne petal 5 e pist. stami. stipulum quibus flos vestiri solet bacc. moll. carnos. succi plen. 4 or pler. sem. seu gigartis veluti pyriform
folia aut capreoli absorbent et astringunt in dysenteria haemorragiis profluv. sanguinis mulier. contusa dolores capitis mitigant liquor stillans verno tempore aperit diuretic litontriptic... oculos detergit, faciei maculas et cutis pruritus curat

Berberis epine vinette fr. cylindr moll. succi plen. uno vel altero sem. oblong
vulnerarium astringens cortex et fructus in usu in dysenteria alvi fluxu succus saccharo conditus ex... syr. gelatinae roob vans ad eorundem usus et fluori albo utilissimus

Rubus ronce 5 petal calyx 5 fidus fr. fere glob. e pluribus veluti baccis placent affix succi plenis sem. uno aut pl. oblong donat
rubus ideus spinosus le framboisier refrigerat. fol in decoct astringunt in alvi fluxu et fluori albo; ulcera oris et gengivarum detergunt in gargarism. cortex bibitur morbis cutaneis et venereis ulceribus fructus immaturus astringit. matur refrig. aperit sitim sedat ... extendit syr. morbis ...

S. 3.ª pist. ab. infr. multicapsular

Acer erable petal 5 c fr. ex duab. ... 3 bus capsul in alam foliaceam sem. subrot. fol acuta plerumque trilobata
flores fructus et lignum diuretica et

Staphylodendron nez coupé
[petal. 5] caly. multif.[5o] fr. membranac. vesicae modo inflatum
in locul.[2] div. sem. fere osseis σταφυλὴ ra-
cemus δένδρος arbor quasi fructu racemoso
fructus pistachiae vires ferme habet, ex eo exprimitur
oleum resolvens
le paliure a sa fleur a 5 pet. dans la venure d'une rosette au milieu du calyce
cette rosette devient un fruit en bouclier relevé sur le milieu dans les bords [membraneum]
au milieu du fruit est un noyau osseux

Paliurus fr. clypeifor. ossiculo fereglob.
in 3a locul div. adsunt nuclei ad basin fol 2 stipul
sem aperit urinas et menses movet in hydrope convenit
maxime a ʒ ad ʒii in ptisana cum capillaribus aut vino
albo infus sabulum renum etiam pellit

Azedarach [tum sicomore] tubus pistillum condens e
fundo calycis fr. fere glob. moll. ossiculo plurij
striat. in plur[ibus] locul. div. sem. oblong.
fructus edulis

[arrb.] **Evonimus** [bonnet de prêtre] fusain fr. membran angul [tetragon aut pen]
in [5e] locul. div. sem utpl. oblong εὖς bonus ὄνομα
nomen quasi planta boni nominis ironice qd aeri
malebus nocere dic. ad basin fol. 2 stipul
animalibus nocet. sem pulvere praestant vermifugum
in decoct purgat etiam

Syringa [4 pet] fr. [subrot] calyci haerent. quadrif. plurij
dehisc. in 4or locul div. sem. exig.
flos odore grato donatur

S. 4a fr. ex siliculis in capitulum

Spiræa sem. oblong. plan pet. 6.

S. 5a fruct. in siliquam

urg. Senna sené ex 5e. ut pl. petal. siliq. plan admodum ut pl. incurv. ex 2b. mbranis cpressam quas inter nidulantr sem. gigartis similia tenuib veluti dissepimentis inter se discta. senna quasi sana quia nemini unquam nocuit
purgat acida, pituitosa purgantium valgatissi et tutissim cerebrum exonerat, viscera et sensus omnes roborat quia vero tormina parit semina foeniculi; calide melius infunditr quam decoquitr

Poinciana poincillade ex 5e ut pl. petal in orb. numerosa stam. incurvorum cgeries prit in 5e folia div. inferiori adunco et imbricato siliq plan. duro in duas ptes dehisc. sem. subrot. tenuib dissepimntis inter se discti,

urg Cassia casse ex 5e. petal. ut pl. siliq. nunc tere et cylindr. nunc cpress. in varia locul div. a dissepimntis transversa posit cerudalta quadam ut pl. nigricante obduct. sem. duris.
dulce purgat bilem acria lenit. sola ut in sero lactis ebullita; nocet melancholicis histericis et pituitosis ob flatus sed juvat nephriticos pulpa tantum in siliquae sic purgat

Cl 21 fruit a pepin

S.6. fr. carnos sem. callosis

Aurantium oranger pist. foliolis ... in stamina desinentib stipat. fr. fere glob. cortice carnoso obduct. in varia loculament. div. succi et vesicular. plen. folia ad exortum cordiformia flor. distill dant aq. naphaeam dictam cordialem antihystericam cephalicam conserva flor. in opiatis stomachicis succus acidus refrigerans incrassat cortex et aq. distill acido volatili oleoso polleat in hystericis sanguinem pracant

Citreum citronier fr. plerq oblong crassa carne donat. in varia loculam. div. succi et vesicular. plen. folia simplicia
succus acido refrigerat temperat, aperit cortex acido volatili oleoso cruda dissipat sem. acido volatili conven. nephriticis lumbricis necandis semina purgant

Limon limonier flore folio q citrei rotundiore quam citrei
fr. vero fere ovato carne tenui donato in varia locul. div. succi et vesicul plen. sem. callosi.
facies prid
ex limonii et citrei succo fit limonata cum aq et saccharo optima in febr. malignis et ubi acido refrigerandum

S.7. fr. ossiculo fetum fruit a noyau

purg **Prunus** prunier fr. oblat. vel glob. carnos moll. ossiculo utrinq plerq acumin. nucleum includente. petal 5 in incisuris calycis infundibuliform. 4 ... fruct. laxans leniens prunor siccor decoct purga in pueris praesertim lignum et fr. astringunt in decoct flor. vino albo ... sudorifica pleuritidi conferunt fructus immaturus succum dat astringens ex coct ... haemorrag. diarrhoea vomitus

pector Armeniaca abricotier fr. carnos fere glob utrinq̃ plerq̃ cpressum secundum longitudinem sulcatum ossiculo foetum cpresso nucleum includente fuedes pp̃ria fol laevia sub sit incanum. desiccantia fructus pectorali humectans expectorationem movet oleum in surditate aurium tinnitu et haemorroid lenienti

purg Persica pêcher fr. carnos. fere glob. per longitu sulcatum ossiculo profundis scrobi culis excavato nucleum includente oblong. fol angust flores purgant aperiunt vermibus inducunt. fructus pectorali. succus febribus ardentib prodest. nucleus anticolicus et antinephriticus nuclei cum amygdala quassati in vino albo infus menses movent. gummi ejus astringens est in haemophthi

Cerasus cerisier fr. carnos. subrot. et cordifor. fuedes pp̃ria. a cerasunte pontico mu cerasum vilfe dasie nicipio. folio gerifoli in morem amplificante fructus satis notus recens refrigerat laxat siccus astringit acrimoniam temperat nuclei quassati vino albo infusi pariunt.

becchi Amygdalus amandier fr. oblong osseum callo pulvinato obductum, nucleo oblong. fol gerifoli in modum amplificante
dulcis becchica oleum dolorem mitigat intus sumptum et extus applicat fr. in emulsionib, refrigerant inoxnemata leni. amygdala amara vulneribus idonea oleum mollit resolvit

194 Bech. **Ziziphus** jujubier fr. oblong olivæ
cemul. carnos. ossiculum in duo locul. div.
nucleis oblong
fructus bechicus acrimoniam superat exhibetur vulg.
in ptisanis pectoralib. cum dactylis sebestenis ficubus

Lauro cerasus laurier cerise caly.
infundib. fr. ceras. for. moll. ossiculum includent
nucleo subrot. quasi foliis lauri cerasi fructu
fol astringunt stomachicum reconfortant, error autorum
aqua limpid. e foliis distilata est venenum lethifer
ad uncias aliquot

I. 8 calyx. ab. infr. semi, callosi
fruit a pepin
Pyrus la poire est ordi. plus mince vers la queue que l'autre bout
poirier fr. carnos. pleraq. habent
qui est garni d'un nombril formé par les découpures du calyce
5. locul. div. sem. oblong. fol. nascuntur ex utraq.
parte ad nervum medium involuta. 2 stipul. ad basim
fructus refrigerat. ventriculi calidis prosunt, colicas
et calculum generant, coct. sanior est crudo, pira sicca
ventrem claudit; sine vino sunt pira virus, cruda virus
cocta antidotum, post pyra da potum; post pomum vade cacatum.
Cydonia colognassier fr. umbil. ad pyrum accedens, carnos. in locul. div.
sem. oblong et callos. a cydone cretæ oppido
fruct. astringit incrassat acrimoniam lenit, cidoniatum
cidonio condito et syr. alii flux. stomachi infirmitat.
multum conferunt; mucilago seminis incrassat et reperc.

Cratægus alisier fructus forma et
magnitudine a pyro div, bacca sem. callosi
in loculam. medium occupantib. reconditis

Sorbus sorbier a pyro et cratægo folio
frnâ diversum hæc in per cjugationi fraxini
modo
astringit refrigerat. conducit in diarrhæa alvi fluxu
profluviis sang. mulier; hæmorroïd. hæmophtisi
idem præstat conserva quæ ex fructu fit
Sorbo suavius molles nimium durantia ventres
aptius hæc puero quam tibi poma dabis. mat.

Malus pommier fr. carnos fere glob.
plerq utrinq umbilic in locul. div. sem. callos
et oblong. fol. sibi mutuo incumbunt dum nascunt
2 stipul ad basim
humectant refrigerant ventrem emolliunt aperiunt
pectoralia sunt. pommes de renette præsertim sana
matura et hibernata ex hac syr. et gelatina fiunt
ad raucedinem et faucium asperitate

Punica grenadier calyx campan fr. multi
fr. fere glob. coronat in plura locul. div. acinis
succi plenis farta. placentæ affix mbrana tenuiss
distict sem. utpl. oblong. fol. gerifoli in modum amplia
flores dicti balaustia, cortex fructus malicorium
succus et petro in usu. astringunt in profluviis mulierum
dyssenteria, alvi fluxib ex succo fit syr. acido jucundo
bilem et acrimon. lenicus in febrib continuis, ardore

urs **Rosa** rosier caly. foliatus fr. subrot. carnos
unicapsul sem. utpl. angul et villosis
quinque sumus fratres quorum duo sunt sine barba
sunt duo barbati sum semi barbatus ego
rosa rubra pallida purgat aq. stil suelb
rosa rubra off. astringit. rosa sicestri astringit purgat
ex fructu conficitur conserva astringens Kinosrhodon in oib
hæmor profluviis
posses de forma rosam, non de pudore reginam
virgineo posses sentire fuisse pudicam

Grossularia grosel(l)ers petal. in imo calycis monophylli et pelvifor. nascentib. bacc glob. vel ovat moll. sem. plen exig.
grossul. silvestris fructus maturus humectat refrigerat immaturus astringit, in dysenteria diarrhœa hæmoptisi, fol. extus inflam. prosunt.
grossul. hortens rubra astringit refrig. urinam movet sitim sedat grossul fructu nigro. ... diuret contra ... optim in ...

Myrtus mirte calyx abit in bacc. olivæ formem coronat in 3a loat div. sem plur. ut plur. renifor. fol opposita non decidua hyeme ovata et foramini instar hyperici perfor.
fol. bacc. vel siccus intus et extus astringunt. syr. in julep refrig astring. optim in profluvii umbricum hæmorragiis disenteria alvi fluxu. folia calefacta vel decocta optima in luxationib. et contusionib. fractur foment et catapl sem. ante potum ebrietatem impedit

S. 9. calyx ab. infr. ossicul plen

Cornus cornouillier flores fert ei frx. olivæfor. vel glob. moll. carnos ossicul contentu in 2o div nucleis fet. fol opposit(a) ... decidua hyeme. flores in ...
fructu acido austero astringit, sitim sedat, easdem optinet vires ac berberis in alvi fluxu et dysenteria

Mespilus neflier caly. foliat fr. fere glob. coronat. carnos. moll. unicapsul. 4 vel 5 ossicula condentem nucleo plena oblongo
fructus immaturus astringit siccus et senescen.
maturus laxat. ptisana ex ligno astringit in fluxu lienteri-
mespilus apii folio spina 3lanche. fructus subruber incid astringit fluxus et menses sistit. nucleus pulverat in vin ad calculum. radix trita et carni applicata, spinas et spicula educit- utero applicata abortum ciet.

Classis 22.a de florib. papilion, leguminos

S. 1.a

de flore papilionaceo foliis singul. alterno aut verticillato ordine dispositis

Genista genet. pist. qd surgit e calyce abit in siliq. plan. in 2as dehisc. semi quasi reniform. folia verticil. aut alterno ordine
ex caulib et foliis combustis extrahitr sal in hydrope anazarca aperit diureticum est. optima haec planta in catharris, hydrope urina movenda et mezenterii obstructiõi sem. decoct aut infus purgat flores etiam in lacte calido infus morbis cutaneis scrophulis. genistae cineres in vino albo infus. hydrop

Crotalaria. a genista differt siliq. fruct. quae turgent anonidis more. ab anonide differt foliis singularib. in anonide trifol summo pediculo

Spartium genet blanc d'espagne siliq. brev. subrot. turgidul semin. ut pl. reniformi. caules turgore junco similes vires habet genistae

Genista spartium a genista et spartio aculeis directo secundum costam disposit tuniones diuretic. aqu. ient in [illegible] vires habet genistae

Erinacea siliq plan a genista spartia diversum qd aculeis densis erinaceum herisson seu hystricem porcepic refert

Cl. 22.°

Genistella a genista diversum foliis quadam veluti articulatione sibi invicem innascentib 199
vires habet genistæ

siliquæ fol lateralia superant folium centri et fol inferius a duob aliis foliis separati, ɛ̄ponit, siliq plan. fol alterna

Siliquastrum guainiers fl. papilio alis tamen vexillo supereminentib carinâ q ex 2.° petalis ɛ̄posita pist. stam. obvolut abit in siliq plan. mbranaceam sem. quasi renifor folia alterno ordine

Albagi siliq. ex multis ptib quasi arti culatione ɛ̄junctis quar. singula sem. hugosunt renifor. folia alterna.

S. 2.

de flore leguminoso folio terno singulis pediculis innascente

Anagyris bois puant vexillum cæteris longe brevius. pist. in siliq faseoli æmulam sem. ut pl. renifor fol. terna singulis pediculis innascentia
odore assæ fetidæ in passione hysterica a veterib comendat

Cytisus citise siliq plan. in 2.as dehisc, sem plan. oblong. folia terna singul. pedicul fœni græci aut loti trifoliæ æmula. differt a genista foliis ternis ab anonide siliquis planis
folia trita resolvunt decocta aperiunt

Cytiso genista genet a balay a cytiso et genista differt foliis potius singularib. q[ua]m ternis. siliq. plan. flores cum siliquis tenuioribus in aceto condiuntur et mensibus apponuntur. sem. purgat vomitum excitat. aqu. decoct. aut infus. cin. vin. alb. infus. a Sydenh. hydrop. utiliter

S. 3a.

fl. papilionaceo fol. per conjugation. costae plerumq. nascentes des arbrisseaux qui portent des cotes feuillées

Bech **Pseudo acacia** pist. mbrana fimbriata obvol. siliq. plan. in 2o dehisc. sem. reniform. fol. veluti per conjugat. costae affixa cui summa impar differt a liquiritia magnitudine aq. distill. in vaporib. utiliter usurpatur radices sapore dulci et grato unde glycirrhizae substitui potest in omnibus pectoris affectib. fol. cocta et expressa purgant roborant et refrigerant

purg **Colutea** faux sené baguenaudier capsul. membrana vesicae admitar inflat. sem. reniformi. fol. secundum costam disposita quasi conjugata unico claudente quidam duplici dosi sic fol. sennae.

Emerus faux sené siliq. tenu. sem. fere cylindraceo singulis articulis. flores bini vel tres pediculo insidentes in coronam non dispositi differt a galega tantum magnitudine

Coronilla siliq. tenuis ex ptib. articulatis. junctis sem. oblong. differt floribus in coronam dispositis et fol. in annulum differt ab ornithopodio tantum eo quod sit arbor

Barba jovis siliq. brev. plerumq. ovat. sem. subrot. differt a dorycnio foliorum forma modo simplicibus modo binis ternis 4 costae dispositis pediculo nascentib.

Cl 22.[a] 201

Becchi **Ficus** figuier floribus in ipsius fructus cavitate. capillamentis tenuib. ex involucro quodam prodeuntib. qd sem. complectitr utpl. subrot. fr. plerumq. turbinatus vel glob. quandoq. ovatus sessilis carnosus et mollis,
caricæ off. in ptisanis pro tussi asthmate raucedine variolis in gargarismate pro faucium et uvulæ fluxionib extus applicat lenient emolliunt maturant resolvunt nimius usus pediculos generare dr.
lac ficus corrosivus fol. ulcera detergunt

Index Gallicus

De Re Naturali

Caroli Linæi. regnum Minerale

Regnum Lapideum

I Petræ

Sunt lapides simplices qui metallurgis dntr Bergarter cstant pticulis ttum modo similaribus

Primus Ordo

Apyri

in igne docimastico vix destructibiles

Asbestus

constat fibris papposis intertextis

asbesti species	natans solido flexili		suber montanum
	natans fibroso coriaceus		aluta montana
	ponderosus fissilis		caro fossilis

Amianthus

Constat fibris paralellis

fibris capillaceis flexilib. tenaci		linum incombustibil
fibr. capill. flexil. fragilibus		alumen plumos. offic
fibris setosis rigidis		amiantus immaturus
f. bris angulosis rigidis		pseudo amiantus

Ollaris

cstat fibris sparsis

fibris acerosis friabilibus		lebetum lapis
fibr. acerosis rigidis		acerosus lapis
fib. a centro radiatis		radians lapis
fibr. fasciculatim inflexis		torosus lapis

Mica

mbranis squamosis æqualis superficiei

spe-cies
- pticulis impalpabilibus . . . sterile nigrum
- pticulis squamosis . . . . mica vulgaris
- pticulis mbranaceis fissilib . . . vitrum moschoti
- pticulis squam et mbran mixtis
- pticulis prismaticis immixtis

Talcum

mbranis ~~squa~~ lamosis inæqualis superficiei

spe-cies
- Durum crassum cortice nitido.. corneus lapis
- durum coriaceum . . . . tunicatus lapis
- friabile molliusculum . . . talcum offic..
- friabile fragile mbranaceum.. talcum aureum

Secundus ordo Calcarii

ignе docimastico usti et aquâ rigati in farinam reducuntur

Schistus

fragmentis fissilibus

- cinereus . . . . . . fissilis inutilis
- nigricans friabilis . . . . . fissilis vulgaris
- niger duriusculus . . . . fissilis lapis
- niger durus clangosus . . . ardesia tegularis

Spatum

cstat fragmentis rhomboidalibus

- fissile lamellis dehiscentib.. spatum lamellatum
- cpactum opacum nitidum.. spatum vulgare
- compactum pellucidum . . . cristallus islandica

Marmor

c̄stat fragmentis incertis

§. rudia sunt quæ polituram vix ullam admittunt

marmor rude - - - . calcarius lapis

marmor rude quartzosū... vena hæmatica rubris

§ nitida sunt quæ polituram admittunt arte

nitidum album - - - marmor album

nitidum rubrum - - - - . rubrum

nitidum atrum - - . Lydius lapis

nitid. coloribus mixtis - . . variegatum

nitid colorib. alternis - - - polysonias

nit. colorib picturam referent.. florentinum

nit. virescens maculis nigris.. serpentinus lapis

nitid. cæruleum maculis albican.. lazulus lapis

§ fugacia sunt quæ pticulis nitidis ~~albicantibus~~ interlucentibus gaudent

fugax opacum - - - . . gypsum

fugax subdiaphanum . . . . alabastrum

Tertius ordo
Vitrescentes

igne docimastico usti in vitrum liquescunt

Cos

c̄stat fragmentis grumelatis opacis

pticulis inæqualib. rigidis . . arenarius lapis

pticulis æqualib. friabilibus . . cotiaula

aquam filtrans - . . . filtrum

Silex

c̄stat fragmentis c̄vexis et c̄cavis subdiaphanis

hujus generis differentias vel varietates reales licet e colore desumptas addat qui potest . ego non .	Pyromachus calcedonius jaspis carneolus malachites turchesia sardius achates

Quartzum

c̄stat fragmentis angulatis acutis pellucidis

aqueo album	quartzum
luteum	pseudo topasius
rubrum	pseudo rubinus
purpureum	pseudo amethistus
cæruleum	pseudo saphyrus
viride	pseudo smaragdus
viride cæruleum	pseudo beryllus

obser. silicis sub nomine quidam quartzum quidam vero pyromachum ut veteres intelligu[nt] et nos
a quibusdam ad calcareos ab aliis autem ad vitrescentes refertur nos cum bromelio hunc retulimus

II Minerae

sunt lapides c̄positi qui metallurgis succis dicuntur, mal mater, constant p̄ticulis peregrinis impraegnata

Primus ordo

Salia

in aqua solubilia et sapida sunt simpliciter composita saepe occurrunt.

Nitrum

in igne fremens figura prismatica hexaedra
acidum essentiale

⦶ humosum - - - - - . .	terra nitrosa
⦶ quartzosum album - - - -	cristallus montana
⦶ quartz. luteum - - - - -	topasius
* ⦶ quartz purpureum - - . .	amethistus
⦶ quartz caeruleum - - - -	saphirus
⦶ quartz viride - - - - - - -	smaragdus
⦶ qu. viride caeruleum - - - -	berillus
⦶ siliceum (unde)	Adamas
⦶ spatosum acutum utrinq. - -	spatum cristallinum
⦶ spatosum truncatum utrinq - -	cristallus plumbifer
⦶ spat. fragmentor. anguli oppposit. -	Selenites
⦶ marmoreum foetidum - ...	Suillus lapis
* ⦶ quartz. rubrum - - -	rubinus

Muria

in igne crepitans figura testulata hexaëdra
alcalino acidum

⊖ aquae marinae - - -	sal marinum
aquae fontanae - - -	sal fontanum
solidum fossile - - - -	sal gemmae

Alumen

in igne spumans metallo destitutum figura tessulata octaëdra [alkalino acidum

○ nudum . . . . . alumen plumosum

○ schisoti . . . . . fissilis aluminaris

Vitriolum

In igne spumans metallo impraegnatum figura rhomboïdea dodecaëdra

acidum purum

⊕ ferri viride . . . vitriolum martii

⊕ cupri caeruleum . . . vitriolum cuprinum

Secundus Ordo

Sulphura

in igne fumantia et odorata sunt saepe decomposita occurrunt.

Electrum

fumus odore suavi colore fusco

Electrum solidum . . . succinum vari. colori

electrum tenax . . . . . ambra grisaea

Bitumen

fumus odore tristi colore atro

fluidum album ignem attrahens . . . Naphta

liquidum fuscum nigr. . . . Naphtaoleum

liquido tenax nudum . . . Moltha

solido tenax nudum . asphaltus

solidum nudum . . . . . . gaga

solidum in schisto . . . . . . Carbo fossilis

Pyrites

fumus odore acutissimo colore luteo sapore salso: principio acido

Nudus . . . . sulphur nativum
micaceus . . . . auri pigmentum
ferri flavus figura varia . . . pyri. ♂ varia figura
cupri fulvus . . . . . . pyrites ♀
cupri vitrescens . . . . . minera ♀ dura
cupri quartzosus . . . . . minera ♀ quartzosa
cupri cotaceus . . . . . . minera ♀ arenacea
cupri saturatiss. petram tegens . . . mine. ♀ mollis
cupri particulis impalpabilib . . min. ♀ calybeata
cupri fulvo fuscus . . . . . min. ♀ hepatica
cupri in gypso . . . . . . min ♀ tenax
cupri in ollari acerosa rigido . . min ♀ acerosa

Arsenicum

fumus odore alliaceo colore albo sapore dulci principia alcalino

argentei coloris . . . pyrites arsenicalis
vitro cæruleo . . . . . cobaltum
vitro rubro . . . . . saffera
ollaris acerosi rigidi . . cobaltum rubrum

Tertius Ordo
Mercurialia

igne fusa depurata et nitida evadunt
supra decomposita communiter occurrunt
igne fusa dicuntur metalla

hydrargyrum

in igne mox volatile metallo fluido ▽ ▽ ...
☿ petra varia vestitum .. minera ☿ii
☿ rubro tinctorium - - - cinnabaris nativ...

Stibium

in △.e ssim avolans metallo fragili vitro fal...
♄ striato fibrosum . . . . minera antimoni...
♄ lamellato squammosum .. refusius
♄ micæ squamosæ et membranaceæ mixtu...

Zincum

in △.e flagrans, metallo molli ▽ ▽ ca...
cineribus albis tenaci. flamma viridi
♁ fertile petrosum violaceum... Minera Zinci
♁ fert. petros. vitriolaceum .. lapis atramentari...
♁ sterile terreum . . . . . . calaminari...
♁ sterile micaceum. an hujus loci? molybdæn...

Vismutum

in △.e facile liquescens, metallo tessulato fragidin...
♂. arsenici colore fugaci .. cobaltum vismuti

Stannum

in △.e facile liquescens metallo tenaci vitro albo
♃. petra vestitum . . . . . . minera stanni ...
♃ polyedron irregulare nigrum. min. stam. polye...
♃ poly. regulare purpurascens .. granatus (scepi...

Plumbum

in △^c facile liquescens metallo tenaci vitro flavo

♄ p̄ticulis tessulatis c̄tiguis... galena tessullata

♄ p̄ticulis tessulatis granulatis sparsis... minera ♄ granulata

♄ p̄ticulis pulverulentis sparsis nitidis... minera ♄ punctata

♄ p̄ti. pulverulentis sparsis fugacibus... min ♄ colorefugaci

♄ ~~p̄ti~~. vitri spatosi utrinq̄ truncati viride... min ♄ crystallina

ferrum

in △^c. difficillime liquescens metallo duriss.

∇ ═ ♂• vitro nigro ♂.^{co}

♂ sulphure ō adulteratum...

♂ arsenico impraegnatum... minera ♂. optima

♂ pyrite improegnatum...

♂ petrae vitrescentis pauperrimum...

♂ petrae vitrescentis dives...

♂ nudum octaëdron... ferrum purum (vere)

♂ tessulatum fere nudum... ♂ sub purum

♂ fracturis nitidum... minera ♂ speculati

♂ et mundi polos respiciens.. magnes

♂ ollaris e centro radiati..

zinci extus puculati... Magnezia

♂ ~~a~~mi~~anti~~anti angulosi rigidi... hematites

♂ amianti rigidi extus puculati... nucleus hematitidis

Cuprum

in △ᵉ difficulter liquescens metallo duro ▽ ⚌

♀ nudum tessulatum . . . ♀ nativum
♀ nudum informe præcipitatum . . ♀ præcipitatum
♀ cœruleum . . . . ♀ lazureum
♀ violaceum . . . . ♀ vitrei coloris

Argentum

in △ᵉ commode liquescens metallo firmo
indestructibile tenaci albo ▽ ⚌ ♀ᵉ. ⊖

☽ nudum forma varia . . . ☽ nativum
☽ malleabile incanum . . . min. ☽ vitri coloris
☽ subdiaph. rubesc. ad can-
delam liquescens . . . . . in. ☽ cornu coloris
☽ rubescens . . . . . . ☽ minera rubra
☽ fragile albidum . . . . min. ☽. alba

Aurum

in △ᵉ commode liquescens. metallo firmo
indestructibile tenaci etiam ♁ᵒ luteo ▽ ⚌ ⊖ ☐ ☿

☉ nudum . . . . ☉ nativum
☉ marmoris nitidi cœrulei . . ☉ ~~nativum~~
maculis albicantibus . . . min ☉ lazureo
☉ in mercuriali alio
parasiticum . . . . . min. ☉ mixto

III Fossilia

sunt lapides aggregati qui a succis dicunt Grusarter, c̄stant p̄ticulis petrosis vel mineralicis mixtis

Primus Ordo

Terrae

p̄ticulis pulverulentis constant

Glarea

c̄stat p̄ticulis scabris fragile distinctis

tenuissimo flatu aëris volitans.. Glarea mobilis
farinacea apyra. . . . . arena sterilis
argillacea apyra, mixta . . . terra adamica

Argilla

c̄stat p̄ticulis lubricis tenaciter cohaerentibus

apyra. . . . . argilla gallica
Calcarea nivea arg. nivea
vitrescens vitro subdiaphano.. arg porcellana
vitrescens tessulata. . . . . . arg. figulina
vitrescens rudis . . . . arg vulgaris
vitrescens impalpabilis .. bolus terra sigillata

humus

c̄stat a vegetabili vel animali destructo

animalis conchae laevis oblongae...h. conchacea.
vegetabilis communis. . . h. atra
vegetabilis palustris pura... lutum
vegetabilis paludosa radicibus mixta- - - - . . Turfa

Arena

Constat lapidis cujuscumque pulvere

Quartzosa - - - - - - Are. riparia
petrosa vix palpabilis aequalis... arenaria
mixta et inaequalis - - - - sabulum
micacea squamosa - - - - - - aurea sive ar[illegible]
ferrea atra - - - - - - - - - - atra fluviati[illegible]
aurea rubra - - - - - - - - - - arena aurifera

Ochra

[illegible]stat mercuriali quodam a vitriolo suo soluto

ferri lutea - - - - - - - - oc. flava
ferri lutea argentea - - - oc argentea
cupri caerulea - - - - Chrisoc. S. Caerul. mon[illegible]
cupri viridis - - - - - - - viride montanum

Marga

terra aliqua (argillacea saepius) indurata

rubra solidiuscula - - - - rubrica
alba solido friabilis - - - - creta alba
luteo alba solido friabilis - - terra tripolitian[illegible]
cinerea solida - - - - - - - lithomarga
nivea friabilissima - - - - agaricus miner[illegible]

Secundus ordo
Concreta

particulis terrestribus coalita sunt

Pumex

generatur in elemento igneo

vegetabilium atēr... fuligo
pivitæ cinereus- - - - Pumex
terræ cinereus: - - -
cupri ruber
argillæ cinereus

Stalactites

generatur in elemento aëreo

argillæ calcareæ... incrustatio
calcis nitrosa - - - - ..nitrum calcareum
quartzi- - - —

Tophus

Generatur in elemento aqueo

Glareæ farinaceæ. - - - -. lusus argilaceus
arenæ mixtæ ferro impraegnatæ... min. ♂ arena flu
humi palustris ochracco ferreæ.. mi. ♂ paludosa
humi. lacustis ochraceo ferreæ.. min ♂ lacustris

Saxum

Generatur in elemento terreo

micaceum puculatum granulosum... molaris lapis
micaceū. longitudinaliter fissile. porphyrius dalK
Quartz. mica. impalp. granis spataceis saxum alandicum
spatosum rubrum. - - - saxum angermanica
quartzosum album mica nigra macul.
micaceo corneum granulis nigris.. sax. alpino laponicum
lotaceum compactum albicans (maculatum)... sax. alpino dalekarl

Ætites

generatur intra naturale lapideum

Embryone lapiluloso libero.. aëtites
embryone lapiluloso adnato.... pseudo aetites
embryone terrestri libero ... geodes

Tartarus

generatur intra naturale vegetabile

vini . . . . Tartarus
Cerevisiæ fermentum

Calculus

Generatur intra naturale animale

salivæ dentium . . . . tartarus dentium
gastrici animalium pecorum.. ægagropila
bilis cistidis. . . . . . . calculus felleus
urinæ humanæ . . . . . calc. nephreticus
urinæ simiarum caprorum.. Bezoardicus lapis
insecti astaci . . . . . . oculi cancrorum
vermis conchæ . . . . margarita

Tertius Ordo

Petrificata

Simulacrum vegetabilis aut animalis impressum ostendunt

Graptolithus

Petrificatum picturam assimilans

lineis mappam geographicam referens. . . lapis geographicus

Prælia urbes rudera vel similia referens ... lapis ruderatus
nemora arbores plantasve referens - . . . Dentrites
plantam fucum referens - - Phycites
stellas et puncta radiata referens - - - pseudo astroites
circulos intra circulos referens .. concha anomia
puncta informia referens .. stignites punctularia

Phytolithus
Petrificatum vegetabilis

ligni - - - - - - Lithoxylon
folii . . . . phytobiblion
seminis - . . . . . pisolithus
rami . . . . ——— ——— pseudo corallium

helmintolithus
petrificatum vermis

lumbrici - . . . . . Entrochus
medusæ . - - - - . asteria columnaris
echini - - - - - - - . echinites
echini spinæ . . . . . belemnites. lap. lyncis off.
echini articuli spiniferi .. judaicus lapis
Patellæ - - - - - - . nummus brattinburgensis stoba
patellæ aut conchæ hinc planæ inde gibbæ - . hystero lithus
conchæ subrotundæ - .. conchites
conchæ hinc planæ inde gibbæ - .. pectinites

conchae lamellatae . . . ostracites
conchae oblongae . . . musculites
conchae spira laterali . . . cochlites
cochleae spira centrali . . . Nerites
nautili recti . . . . . orthoceratites
nautili rotundati . . . . nautilites
nautili compressi . . . . cornu ammonis

Entomolithus

Petrificatum insecti

Cancri . . . . astacus petrificatus

Icthyolithus

petrificatum piscis

Dentis carchariae . . . . glossopetra
incertae vel certae totalis vel particularis
speciei . . . . . . icthyolithus
ovorum . . . . oolithus
ossis palatini . . . . . . bufonites

Amphibiolithus

petrificatum amphibii

anguis . . . . serpens petrificatus
Lacertae . . . . . .
ranae . . .
testudinis . .

Ornitholithus

petrificatum avis

totalis certi vel incerti generis . . avis petrificat
partialis . . . .

Zoolithus

petrificatum quadrupedis

totalis certi vel incerti animalis .. quadrupes petrificatus

ossium - - - - . . ossa fossilia

Regnum animale

I Quadrupedia

Corpus hirsutum pedes quatuor, feminæ viviparæ lactiferæ

Primus ordo

Antropomorpha

Dentes primores quatuor utrinq vel nulli

homo

nosce te ipsum

Europeus albescens

americanus rubescens

Asiaticus fuscus

africanus niger

Simia

Digiti 5.e anteriores 5.e posteriores posteriores anterioribus similes

Cauda carens

Papio Satyrus

Cerco phithecus

cynocephalus

Bradypus

digiti anteriores 2 vel 3. posteriores 3

ai ignavus

Tardigradus

Secundus ordo
Feræ

dentes primores sex utrinq intermedii longiores omnes acuti, pedes multifidi unguiculati

Vrsus ours

digiti 5e anter, post. 5e mammæ 4or (ald) calcaneis insistit pollex extus positus. scandens

Vrsus
Coati mrg
Wickhead angl

Leo

digiti ant. 5e post. 4or scandens est mammæ 2o ventrales lingua aculeata

Leo

Tigris

Digiti 5e ant. 4or post scandens est mam 4or umbilicales lingua aculeata

Tigris
Panthera

Felis

digiti 5e anter. 4or post scandens est mam. 8 4or scil. pectorales et 4or abdominales lingua aculeata

felis
catus
Lynx

Mustella

digiti 5^e anter. post. 5^e scandens, dentes molares 4.^or utrinque

Martes

Zibellina

viverra

Mustella

putorius

Didelphis

digiti ant. 5^e. post 3^e mam. 8 intra bursulam abdominis

Philander

Porsum

Lutra

digit ant 5^e. post 5^e palmipes

Lutra

Odobænus

digit ant 5^e post 5^e palmipes dentes inter medii superiores longissimi

Ross

morsus

Phoca

digiti 5^e ant. 5^e post palmipes mam. 2^æ umbilicales

Canis marinus.

Hiæna

digit. 5^e ant post 4^or collum superne jubatum cauda brevis

hyæna veterum

vivant londini nuper vidit et descripsit arted

Canis

digit. ant. 5^{e} post 4^{or} mam. 10. 4^{or} scil. pectorales 6. abdominales

Canis
lupus
squillachi
vulpes

Meles

dig. ant 5° post 5^{e} ungues medii digitis ipsis longiores corpus superne albicat inferne nigricat

Taxus
Zibetha

Talpa

digit ant. 5^{e} post 5^{e}. anteriores maximi

Talpa

Erinaceus

digit ant. 5° post 5^{e} spinis vel lorica squamosâ munitus

Echinus terrestris
armadillo

Vespertilio

dig. ant 5^{e} post 5^{e}. pes anticus in alam expansus mammæ duæ pectorales

vespertilio
felis volans
canis volans
glis volans

Tertius Ordo

Blives

Dentes primores duo utrinq pedes multifidi

hystrix

aures humanæ corpus spinosum

hystrix

Sciurus

dig. ant. 4or. post. 5e cauda longissima lanige

Sciurus
sciurus volans

Castor

dig. 5e ant. 5e post palmites postice cauda horizontalis plana nuda

fiber

Mus

digit ant. 4. post 5e cauda teres squamosa hirsuta

Rattus
mus domesticus
mus brachiurus
mus macrourus
Lemures
marmota

Lepus

dig. ant. 5e post. 4 cauda brevissima villosa

Lepus
Cuniculus

Sorex

dig. ant. 5^e post 5^e dentes canini adsunt

Sorex

quartus ordo

Jumenta

dentes primores incerti obtusi canini exerti validi

Equus

mammæ 2° inguinales pedes integri

Equus
asinus
onager
Zebra

hippotamus

mam. 2° inguinales (arist) pedes quadrifidi

equus marinus

Elephas

mam. 2^æ pectorales pedes 5^e calli instructi

Elephas
Rhinoceros

Sus

mam. 10^æ abdominales pedes biungulati raro simplices

Sus
Aper
Porcus
Barbyroussa
Tajacu

Quintus ordo
Pecora

Dentes primores inferiores tantum. sup. nulli pedes ungulati

Camelus

Cornua nulla

Dromedarius
Bactrianus
Glama
Pacos

Cervus

Cornua annua primum pilosa, solida ab apice crescentia plurimis ramosa foeminis rara

Camelopardalis
Caprea
Axis
Cervus
Platyceros
Rheno
Rangifer
Alces

Capra

Cornua sursum versa erecta scabra

hircus
Ibex
Rupicapra
Strepsiceros
Gazella
Tragelaphus

Ovis

Cornua retrorsum flexa intorta rugosa

ovis vulgaris

arabica

affricana

Angolensis

Bos

Cornua antrorsum versa lunulata

Caevia

Bos

urus

Bison

Bubalus

II Aves

Corpus plumosum alæ duæ pedes duo rostrum osseum fœminæ oviparæ

Primus Ordo

Accipitres

Rostrum acuminatum

Psittacus perroquet

digiti pedis antici duo postici duo

Psittacus

Strix

digiti pedis antici tres, posticus unus quorum extimus retrorsum flexilis

Bubo

Noctua

otus

ulula

Falco

Digiti pedes antici tres posticus unus

Aquila
Buteo
Cyanopus
Lanius
Nisus
Vultur
falco
Milvus
Pygardus
Tinnunculus

Secundus Ordo

Picæ

Rostrum superne c̄pressum c̄vexum

Paradisæa

Pennæ duæ longissimæ singulares
nec alis nec uropygio infixæ

Manucadiata
avis paradisiaca

Coracias

pes 4 dacti. rectrices exteriores gra
datim breviores

Pica

Corvus

pes 4 dact. rectrices æquales

Corvus

Monedula
glandaria
Cornix
Lupus
Caryocactes

Cuculus

digiti pedis antici duo. post. 2° rostrum

Coeve
Cucullus
Torquilla S. junx

Picus

Digiti pedis antici 2 rostrum angulatum

Niger
viridis
varius

Certhia

pes 4 dact rostrum gracile incurvum

Certhia

Sitta

pes 4 dact. rostrum triangulare

picus Cinereus

Upupa

pes 4 dact. caput plumis cristatum

Upupa

Ispida

pes 4 dact. cujus digitus extimus medio annectitur tribus articulis

Ispida
Merops

Macrorhynchra

Rostrum longissimum acutum

Grus

Caput cristatum

Grus

Ciconia

ungues plani subrotundi

Ardea

unguis medius inferne serratus

Quartus ordo

Anseres

rostrum dentato serratum

Platelea

Rostrum depresso planum apice subrotundo

Pelicanus

Rostrum depressum apice unguiculato inferne bursa instructum

Onocrotalus

Cygnus

Rostrum conico convexum

Olor
anser
Elder
anser bernicla

Anas

Rostrum conico depressum

Anas fera
Boschas

Penelope
Glaucium
anas domestica
querquedula

Mergus

Rostrum cylindriforme, apice adunco
Mergus
Merganser

Graculus

Rostrum conicum apice adunco
Gerba aquat
graculus aquati

Colymbus

Rostrum subulatum pedes infra equilibrium
Colymbus
Podiceps
Colymbus minor
Arctica

Larus

Rostrum subulatum pedes inequilibr
Cataracta
Larus
Sterna
Piscator

5us Ordo

Scolopaces becasses

Rostrum cylindraceum teretiusculum

Haematopus

pes 3 dact rostri apex compressus

Pica marina

Charadrius

pes 3 dact rostri apex teres

Pluvialis

Hyaticula

Vanellus

pes 4 dact. rostrum digitis brevius

caput pennato cristatum

Capella

Tringa

Pes 4 dact. rostrum digiti brevius

caput simplex

Tringa

Pugnax

Gallinula

Ochrophus

Numenius

pes 4 dact rostrum digitis longius

Gallinago

Arquata

Limosa

Recurvi rostra

Fulica foulque möuette poule deau

Pes 4 dact digiti m̄branis aucti caput cupenoso cristatum

Gallinulà aquatica

6.us Ordo

Gallinæ

Rostrum conico incurvum

Struthio

Pedes 2° dact. absq̄ postico

Struthio camelus . . . . Autruche

Casuarius

Pes 3 dact absq̄ postico caput galea et palearibus ornatum.

Emeu

Otis . . outarde

Pes 3 dact. absq̄ postico caput simplex

Tarda

Pavo

Pes 4 dact. corollà pennacea ornatum

Pavo . . . . paon

Meleagris pintarde poule din

Pes 4 dact. frons papilla gulæ m̄branô unica longitudinali instructa.

Gallo Pavo

Gallina

Pes 4 dact frons ~~papilla~~ mbranâ seum
gula m̄brana duplici longitudinali instructa

Tetrao

Pes 4 dact supercilia papillosa nuda

Phasianus - - - - faisan
urogallus
Bonasia
Perdix - - - - -
Tetrao
Lagopus
Coturnix - - - Caille

7us Ordo

Passeres

Rostrum conico attenuatum

Columba

Rostrum rectum ad basin furfuraceum
nares oblongæ m̄branula superne instructæ

Columba
Palumbus - - - - pigeon ramier
Turtur
Oenas

Turdus grive

Rostrum parvum convexum plumæ
rostri basim tegunt

Turdus
Merula - - - - Merle

Sturnus *etourneau sansonnet*

Rostrum rectum subteres lingua bifida cornea

Alauda

unguis digiti postici digitis ipsis longior

Motacilla *hoche queüe*

Rostrum gracile fauces nigricant linguæ apex bifidus

Motacilla
oenanthe
merula aquatica

Luscinia *rossignol*

Rostrum gracile rectum linguæ apex bifidus laceratus

Luscinia
ficedula . . . becfigue
Erithacus
Troglodytes
Carolina rad6

Parus

Rostrum gracile linguæ apex truncatus quatuor setis instructus

Parus
Caudatus
Cristatus

hirundo

Rostrum gracile ad basim depressum minimum rictu amplissimum

hirundo

Caprimulgus . . . fresaie

Loxia

Rostrum crassa magnum breve curvum
undique convexum

Coccothraustes

Loxia

Pyrrula

Ampelis

Rostrum crassum rectum remigum
apices non nulli membranacei

Garrulus Bohem

fringilla Pinson

Rostrum crassum: maxilla utraq alteram
sinu quodam ad basim recipit

fringilla

Carduelis . . . Chardonneret

Emberiza

Spinus

Passer

III Amphybia

Corpus nudum vel squamnosum dentes Molares nulli, reliqui semper; pinnae nullae

Primus ordo

Serpentia

Testudo

Corpus quadrupedium caudatum testa munitum

Test. tessulata
terrestris
marina
Lutaria

Rana

Corpus quadrupedium cauda destituta squamnis carens

ran. arborea
aquatica
carolina

Lacerta

Corpus quadrupedium squamosum caudatum

Crocodilus
Allegator
Cordylus
Draco volans
Scincus
salamandra aquat.

Salamandra terrest
Mamelco
Seps
Senembi mog

Anguis

Corpus apodum teres squamosum

vipera
Cœcilia
Aspis
Caudisona
cobra de cobelo
anguis æsculapii
canchris
Natrix
hydrus

IIII Pisces

Corpus apodum pinnis veris instructum
nudum vel squammosum

1us ordo

Plagiuri

Cauda horisontalis

Trichechus

Dentes in utraq maxilla dorsum impenne
Manatus seu vacca marina

Catodon

Dentes in inferiore maxilla dorsum impennē
Cat. fistula in rostro arti
Cete clusii

Monodon

Dens in superiore maxilla I dorsum impenne
Monoceros - - unicornu

Balœna

Dentes in superiore maxilla cornei
dorsum sæpius impennè
Balœna groenlandica B. fix fisch
B. l. maxil. inf. latiore articul

Delphinus

dentes in utraq maxilla dorsum pinnatum

orca Delphinus
Phocœna

2us Ordo
Chondropterygii
pinnæ Cartilagineæ

Raja raie

foramina branch. utrinq 5o corpus depressum

Raia clavata aspera lævis

Squatino raia

pastinaca marina

Torpedo

Altavela

Bosvet

Aquila

Squalus chien de mer

foramina branch. utrinq 5e corpus oblongum

Lamia
Catulus
Zigæna
Centrine
Galeus
Vulpes mar.
Squatina
Pristis

Accipenser

foram. branch utrinq I os edentul tubulatum
Strio
huso . . icthyocolla.

Petromyzon

foram. branch utrinq septem ~~[illegible]~~
caput bipenne

Ermeophthalmus
Lampetra
Mustella

Tertius ordo
Branchiostegi

pinnae ossiculis carentes branch. oss: et membranae

Lophius

Caput magnitudine corporis appendices horisontales latera piscis ambiunt

Rana piscatrix
Guajacucuia

Cyclopterus

Pinnae ventrales in unicam circularem concretae

Lumpus ... lepus marin.

Ostrantion

pinnae ventrales nullae cutis dura saepe aculeata

orbis div. spi.
piscis triangulari
Attinga
ostracion.
Lagocephalus
hystrix

Balistes

Dentes contigui maximi aculei aliquot robusti in dorsa

Guaperva

hystrix.
Capriscus.. caper

4us ordo
Acanthopterygii

pinnæ osseæ quarum quædam aculeatæ

Gasterosteus

membranas branchiar ossiculis 3b ventrem
lamellis osseis instructus
Aculeatus
pungitius
spinachia

Zeus

corpus compressum squam. subasperæ
Aper
faber .. gallus marinus

Cottus

M bran. branch ossicul 6 caput
aculeatum corpore latius
Cataphractus
Scorpio marin.
Cottus .. fabio flav capill

Trigla

appendices ad pinnas corporis articulatæ
2 vel 3
Lyra
Cuculus
hyrundo
gurnardus

Lucerna
milvus
mullus barbatus et imberbis

Trachinus

opercula branchiarum aculeata oculi vicini in vertice
Draco
uranoscopus
araneus marinus

Perca

Membranæ brachiarum ossiculis septem pinnae dorsalis I vel II
Perca
Cernua
lucioperca
Schraitz

Sparus

opercula brachiar. squamosa labia dentes tegunt. dentes molares obtinet
Salpa
Sparus
chromis
Mœna
Boops
Erythrinus
Aurata
Melanurus
Sargus
Mormyrus
Smaris
Dentex

Pagrus
Cantharus

Labrus

labia crassa dentes tegunt color speciosus

Iulis
sachetus
turdus diversar. specier.

Mugil

Membranæ branch. ossiculis 6 caputtotum
squamosum
Cephalus

Scomber

Mbranæ branchiar. ossiculis 7 pinnæ
dorsi 2 vel plures

Glaucus
scomber
amis
Thynnus
Hachurus ... saurus

Xyphias

rostrum apice ensiformi pinnæ ventrales
nullæ
Gladius

Gobius

Pinnæ ventrales in prima simplici conco
squam. asperæ.
Gobius niger
Iozo
Paganellus aphica

5us ordo
Malacopterygii

Pinnæ osseæ quæ omnes molles

G: **Gymnotus**

Membranæ ossiculis branchiar. 5^e^
pinna dorsalis nulla
Carapo

Muræna

Membr. branch ossicul. 10 tubuli
in apice rostri 2
Anguilla
fluta
Conger
Serpens marinus

Blennus

pinnæ ventrales constant ossiculis 2
caput admodum declive
Alauda non cristata et galerit
Blennus
Gattorugine

Gadus

Membr branchiar ossicul 7 pinnæ dorsi
2 vel 3.
Asellus divers. species
Merlucius
Anthias 2us
mustalla
Egrefinus

Pleuronectes

Mbranœ branchiar. ossiculis 6 oculi ambo in eodem latere

Rhombus diversar. specier

Passer

Limanda

hyppoglossus

Solea buglossolea

Ammodytes

Membr. banchiar. ossicul 7 pinnœ ventrales nullœ

AMmodytes tobianus

Coryphœna

Membr. branch. ossiculis 5° penna dorsi a capite ad caudam

hyppurus

pompylus

novacula. pecten

Echeneis

striœ transversœ asperœ in suprema capitis p[illegible]

Remora

Esox

Mbran branch. ossicul 14

Lucius

Belone

acus maxima -squamosa

Salmo

Membr. branch. ossicul 10 — 12 corpus maculosum

Salmo
Trutta
umbla
carpio locustris

Osmerus

M bran. branch. ossicul 7 – 8 dentes in maxi ling pala
Eperlanus .. spirinchus
Saurus

Coregonus

M bra. branch, ossicul 8 – 10 appendix pinniformis
Albula ladarchus
Thymallus
oxyrhinchus

Clupea

Membr. branch. ossicul 8 venter acutus serratus
harengus
sprattus
Enchrasicholus
alosa

Cyprinus

Membr. brach. ossicul 3 dentes ad orificium ventriculi tantum
Erythophtal
Mugil fluviat
Brama
Ballerus

Capito
Nasus A. M.
Carassius
Cyprinus nobilis
Tinca
Barbus
Rutilus
Alburnus
Leuciscus
Phoxinus
Gobius fluv

Cobitus

Caput compressum pinna dorsi et ventr eadem a rostro distantia
Cobitus
Barbatula
Misgum

Syngnathus

Opercula branch. ex lamina una maxillae a lateribus clausae
Acus lumbri
Acus aristotel
hyppocampus

V Insecta

Corpus crista ossea cutis loco tectum
caput antennis instructum

Primus ordo
Coleoptera

Alae elytris duobus tectae
facie externa facile distinguuntur

Blatta

Elytra concreta alae nullae antennae
truncatae
Scarabeus tardipes
Blatta foetida

Dysticus

pedes postici remorum formâ et usu
antennae setaceae sterni apex bifurcus
hydrocantharus
scarabeus aquaticus

Meloë

Elytra mollia, flexilia corpore breviora
antennae moliniformes ex articulis
oleum fundans
Scarabeus majalis
~~auricularia~~ scarabeus unctuosus

Forficula

Elytra brevissima rigida cauda bifurca
staphylinus
Auricularia

Notopeda

Positum in dorso exsilit antennæ capil
laceæ
Scarabeus elasticus

Mordella

Cauda aculeo rigido simplici armata
antennæ setaceæ breves, negatur ab aristotele

Curculio

Rostrum productum teres simplex antennæ
clavatæ in medio rostri positæ

Buceros

Cornu simplex rigidum fixum antennæ
capitatæ foliaceæ
Rhinoceros
scarabeus monoceros

Lucanus

Cornua 2 ramosa rigida mobilia
antennæ capitatæ foliaceæ
Cervus volans

Antennæ truncatæ

Scarabeus

Antennæ clavatæ foliaceæ cornua nulla
scarabeus pillularis
melolontha
Dermestes

Dermestes

Antennæ clavatæ horisontaliter perfoliatæ
clypeus planiusculus emarginatus

Cantharus fasciatus

Cassida

Antennæ clavatæ subulatæ clypeus planus antice rotondatus

Scarabeus clypeatus

Chrysomela

Antennæ simplices clypeo longiores corpus subrotundum

Canthारellus

Coccionella

Antennæ simplices brevissimæ corpus hæmisphæricum

cochinella vulgaris

Gyrinus

Antennæ simplices corpus breve pedibus posticis saliens

Pulex aquaticus

pulex plantarum

Necydalis

Antennæ clavatæ productæ clypeus rotundatus angustus

Attabalus

Antennæ simplices constructæ articulis orbicularibus præter ultimum globosum

scarabeus pratensis

Antennæ Setaceæ

Cantharis

Clypeus planus margine undique prominent
Elytra flexilia

Carabus

Clypeus fere planus margine promi
nente elytra fragilia
Cantharus fœtidus
Cantharellus auratus

Cicindela

Clypeus cylindraceus vel teres forceps
oris prominens
Cantharus marinus

Leptura

Clypeus subrotundus pedes longi corpus
tenue acuminatum
Scarabeus tenuis

Cerambyx

Clypeus ad latera mucrone prominet
antennæ corpus longitudinem æquant
vel superant
Capricornus

Buprestis

Clypeus superne 2 punctis elevatis
notatus
Scarabæus silvaticus

2us Ordo
Angioptera
Alæ omnibus datæ elytris destitutæ
Papilio
rostrum spirale alæ quatuor
Alis erectis
Psyche.. alis planis
Phalena compressis
Libellula
Cauda foliosa alæ quatuor expansæ
Perla
virguncula
Ephemera
Cauda setosa alæ quatuor erectæ
musca ephemera
Hemerobius
Cauda setosa alæ 4 compressæ
Phryganea
Panorpa
Cauda cheliformis alæ 4 rostrum cornutum
musca scorpiurus
Raphidia
Cauda spinoso setacea alæ 4 caput cornutum. non depicta
Apis
Cauda aculeo simplici alæ 4

Crabro
vespa
rombylius
Apis

Ichneumon

Cauda aculeo partito alæ 4^or
Ichneumon
musca, div. speci
Tabanus

Musca

Stylus sub alis capitatus alæ 2
oestrum veterum
oestrum lapponum
culex
tipula
teredo navium
formica leo

3us ordo
hemiptera

Alæ elytris destitutæ quibusdam tantu[m]
individuis concessæ

Grillus

Pedes 6 alæ 4^or superiores crassiore[s]
Grillus domesticus
Grillo talpa
Locusta
Mantis

Lampyris

Pedes 6 clypeus planus alæ 4^or
Cicindela

Formica

Pedes 6 alæ 4 cauda aculeum condit

Cymex

Pedes 6 alæ 4or cruciferæ rostrum stiliforme rectum

Cimex lectularius

orsodacbne

Tipula aquatica

Bruchus

Notonecta

pedes 6 quorum postici remorum forma et usu alæ 4or cruciferæ

notonecta aquatica

Nepa

pedes 4 frons chelifera alæ 4or cruciferæ

scorpio aquatic

Scorpio

pedes 8 frons chelifera aculeata alæ 4 laxæ

scorpio terrestris

4us ordo

Aptera

Alæ Nullæ

Pediculus

Pedes 6 antennæ capite breviores

pediculus humanus
Pediculus avium
pediculus piscium
pedic. pulsatorius

Pulex

Pedes sex saltatrices

pulex vulgaris
pulex arbores.

Monoculus

pes I. antennæ bifidæ

Pulex arboresc. Swam. monoculus brad.
apus frischs

Acarus

Pedes 8 articulis 8 constantes oculi 2.
antennæ minimæ
Ricinus
Scorpio araneus
pediculus inguinalis
pedic scarabei
pedic scabiei
araneus coccineus

Cancer

pedes 12 priores cheliformes

Cancer
Pagurus

Majus
Gammarus
Astacus
Squilla
Eremita

Araneus

pedes 8 oculi communiter 8
araneus
Tarentula
Phalangium

Oniscus

Pedes 14
Asellus offic
asellus aquat

Scolopendria

pedes 20 et ultra
scolopendria terrestris
scol marina
Julus

VI Vermes

corporis musculi ab una parte basi
cuidam solidæ affixi

Reptilia

nuda artubus destituta

Gordius

corpus filiforme teres simplex
Seta aquatica
vena medina

Tænia

corpus fasciatum planum articulatum
lumbricus longus

Lumbricus

Corpus teres annulo prominenti cinctum
intestinum terræ
lumbricus latus
Ascaris

hirudo

corpus informe planum superne convexum
tentaculis destitutum
Sanguisuga

Limax

corpus inferne planum superne convexum
tentaculis instructum
Limax

Secundus Ordo

Testacea

habitaculo lapideo instructa

Cochlea

Testa univalvis spiralis unilocularis

Helix
Labyrinthus
voluta
Cochlea varia
Buccinum
Lyra
Turbo
Cassida
Strombus
Fistula
Terebellum
Murex
Purpura
Aporrhais
Nerita
Trochus

Nautilus

Testa univalvis spiralis multilocularis

Nautilus
Orthoceros
Lituus

Cyprea

Testa univalvis convoluta rima longitudinali

Concha veneris
Porcellana

Haliotis

Testa univalvis patula leviter concava perforata ad angulum spiralis

auris marina

Patella

Testa univalvis concava simplex

Dentalium

Testa univalvis teres simplex

Dentalium

Entalium

Tubus vermicularis

Concha

Testa bivalvis

Mytulus

vulva marina

Pholus

Bucardium

Perna

Chama

Solenes

Tellina

Pinna

Ostrea

Pecten

Mitella ... vomer

Lepas

Testa multivalvis valvae duabus plure.

Concha anatifera
Verruca testitudinum
Bolanus marinus

3us Ordo
Zoophita
Artubus donata
Tethys
Corpus forma variabile molle nudum

Tethya
holothurium
penna marina

Echinus
Cpus subrotund. testa tectum aculeis armatum
Echinus marinus

Asterias
Cpus radiatum corio tectum scabrum
Stella marina
stella aligantis
stella pentactionides
stella polypectinoïdes

Medusa
Corpus orbiculatum gelatinosum subtus
filamentosum
Vrtica marina
urtica vermiformis
urtica crinita
urtica astrophita.

Sepia
Corpus oblongum interne osseum anterius
oct.s artubus donatum

Gale larbre de cire
Alhuberqua curedents
Gengidium
Ben des indes
Glans unguentaria
Glaucoïdes
Grevvia
Guanabanus
l'herbe de [illegible]
Guayabara
l'orme d'amerique
Guazuma
Guydonia

Halleria
le bois de campeche
Hæmatoxilon
Helianthemoïdes
Heliocarpus
l'arbre petty
Hura larbre du diable
hydre deau
Hydrocerato phillon

Janraya
la dame de nuit
Jasminoïdes
Icao
Inga le pois doux ou sucrin
Indigo

Karatas citron de terre
Kempheria
Kleinia

Lavatera
Lemna
Lenticula 169
l'amourette de St christophle
Ligustroïdes
Lilianthos
Liquidambar.
Lupuloïdes
Lychnidea
Lycopersicoïdes
Lycium
Lymno corallina . . 168
Lymno peuce [illegible]
Lymno spongia

Malva viscus
cerisier d'amerique
Malpygia bois de [illegible]
abricot de st domingue
Mammea
lherbe [illegible]
Marantha
Martinia

Menispermon

Mentzelia

Milleria

Molugo

Morsus ranae (salade de [illegible])

Musa (figuier d'adam)

Mutellina

Myosuros

Myriophillon (volant d'eau)

Nandiroba

Narthecioides

Obeliscotheca

Palma (dattier)

Parkinsonia (genest epineux)

Parthaniastrum

Pavvia

Pennea (bois d'amitie)

Pereskia (groseiller d'amerique)

Persea (avocat)

Petiveria (l'herbe puante)

Pitonia

Phaseoloides

Polygonastrum

Polygonatoides

Porophyllum (la [illegible])

Portulacastrum

Ptelea

Rhovolphia (bois [illegible])

Rivina

Royoc

Ruellia (la [illegible])

Ruischiana

Rusco-asparagus

Ruscoides (laurier alexandrin)

Sabina

Sagitta

Santalum

Sapota

Saururus (queue de lezard)

Scilla

Scirpo cyperus

Scirpoides

Sergania

Simpla nobla

Sistricapnos (fumeterre [illegible])

Sphaeranthos (la boulette)

Stellaria

bois laiteux
Taberne montana
Tarchomanthus
Ternatea
Tettagonocarpos
Thalictroïdes
Tribulastrum
Triosteospermon
Triumphetta
Tulipifera
Turnera

l'arbre aux sardines
Verburnoides
Vrena
Vruca bracteor

Ximenia

Yucca

Zantoxilon
Zedoaria
Zinziber

2 Medicamenta
quæ in formulis vocabulo generali præscribi solent

herbæ 4 emollientes Malva, Althea, viola, merc
branchu ursina seu acanthus. quibus adduntur sæpe
beta, parietaria, atriplex senecio

rad. 5 aper. maj. apii, foeniculi, aspar, petrosel, seu api

rad ap. min. graminis, rubiæ, capparis, ononidis
aliæ q ut fragariæ oxalis seu acetosæ, cichorii silv
filicis maris, taraxaci seu dentis leonis, pareyræbrav

5 capillares Capillus veneris sive adiantum, phylli
seu filicula, politricum aut trichomanes, ruta
muraria, asplenium sive ceterach

semina 4 calida majora anisi, carvi, foeniculi, cumi
minora ammi, amomi, apii, dauci.

Sem. 4 frigid majora, cucumeris, cucurbitæ, citrul
sive peponis melonum
minora cichorii, endiviæ, lactucæ, portulacæ

flores 4 cardiales borraginis, buglossi rosarum
violarum. his adde flores tunicæ, thymi
roris marini, lavendulæ, lilii conval. tiliæ &c

flores 4 calidi carminativi camomeli, melliloti anethi

aquæ 4 cordiales scabiosæ, cardui benedicti, bugl
melissæ; quibus adde aq. scorson
oxitriphilli cerasorum nigrorum

aq. 4 pleuriticæ cardui benedicti, scabiosæ papaveris
ulmariæ

olea 3 stomachica absinthii cidoniorum mastiche
quibus adde ol. moschatæ nucis, caryophil ind. lauri

unguenta 4 calida agrippæ althææ martiatum
dialthææ

unguent 4 frigid album rhasis, populeum, rosatum
ceratum seu refrigerans galeni

farinæ 4 resolventes orobi, hordei, fabarum lupi
quibus add. farina lini foenugræci lentium aven

Lapides pretiosi. granati hyacinthi, saphiri
carneoli smaragdi sarda

3° radices temperatae graminis aspar. rusci
4° Capillares cap. l. vener. lingua cervina polytri
ruta muraria seu salvia vitae, scolopendrium
seu ceterac

On a relié à
la suite un manuscrit
sur le même sujet
d'environ 280 pages

Brétinic



